

63.43
H. Correvon
JARDINS CORREVON

LIBRARY,
U.S. Department of Agriculture
Washington, D.C.
„FLORAIRE“

CHÊNE-BOURG (GENÈVE)

(Ancien jardin alpin d'acclimatation.)



Switzerland

CATALOGUE ET PRIX-COURANT

Plantes alpines, saxatiles, vivaces d'ornement, aquatiques, paludéennes, bulbeuses, grimpantes,
Plantes rares, mi-rustiques, cactées, Fougères et Orchidées rustiques,
Arbustes d'ornements, etc.

En vente au Jardin alpin d'acclimatation CHÊNE-BOURG-GENÈVE



Terrestria sidera, flores

XI^{ME} CATALOGUE DE PLANTES

1903



L'établissement, situé depuis 20 ans à Plainpalais, est transféré à Chêne-Bourg, à un quart d'heure de tramway de la Ville (voir l'Itinéraire à la 4^{me} page de la couverture). Il se transforme en un établissement horticole qui s'occupera de la culture en grand des plantes de montagnes et de rochers, de celle des plantes vivaces, aquatiques, grimpantes, des arbustes rares et nouveaux, des Conifères, des plantes méditerranéennes et orientales, des Fougères, des Cactées et des Orchidées rustiques, etc.

Adresse télégraphique : **FLORAIRE — GENÈVE**

Notre liste de plantes.

Nous rendons les lecteurs attentifs au fait que ce catalogue renferme, à côté de la presque totalité des plantes des montagnes qui sont cultivées dans les jardins du monde entier et que nous avons acclimatées à Genève par semis, greffe, bouturage, etc., une grande quantité de plantes rares, rustiques ou demi-rustiques sous le climat du Centre européen, qui ne se rencontrent dans aucun établissement d'horticulture. Cette collection, qui était originairement celle des frères Paris dont nous avons repris l'établissement justement réputé dès 1850 — s'est considérablement augmentée depuis 1884, époque où nous l'avons acquise.

Nos plantes sont, pour la plupart, cultivées en pots ou godets et toutes sont acclimatées. Il ne s'agit donc pas d'exemplaires arrachés dans la nature et mis en jauge en attendant leur vente. C'est sur ce point surtout que nous attirons l'attention des amateurs qui ont subi des insuccès avec des plantes expédiées par des fournisseurs qui pratiquent ce mode de faire.

Notre étiquetage est aussi correct qu'il est possible de l'établir en horticulture. L'Index Kewensis est le guide d'après lequel nos plantes sont classées ; quant aux variétés horticoles elles sont dénommées d'après le Dictionnaire de Nicholson, autant que faire se peut. Les synonymes, ou les noms vulgaires des plantes, sont en italiques.

Ce catalogue est destiné aux clients du jardin ou aux amateurs qui désirent acheter. Les personnes qui désirent y puiser des renseignements sont priées de le payer au prix de Fr. 1.50.

La plupart des clichés du présent catalogue nous ont été obligeamment prêtés par la Maison VILMORIN-ANDRIEUX, de Paris.

Des Plantes alpines.

Depuis quelques années, la culture des plantes de montagnes a pris un développement considérable dans le monde de l'horticulture. Il n'est plus guère de beau jardin qui n'ait son « alpinum » ou sa petite rocaille. On a abandonné le style guindé qui nous a valu les corbeilles plates ou les « mosaïcultures » pour s'adonner de plus en plus aux cultures des plantes vivaces et rustiques ; au *jardin-tapis* on commence à préférer un arrangement pittoresque et naturel, les rochers, les gazons fleuris et émaillés de fleurs variées, les sous-bois tout rayonnant de corolles harmonisant leur teintes et répandant leur délicieux parfum dans l'air. Le *jardin alpin* a désormais sa place acquise dans tout parc ou dans toute propriété de goût.

Le Jardin alpin d'acclimatation à Genève, qui fut créé en 1884 dans le but d'aider à ce mouvement qui commençait alors à se produire, a le mérite d'avoir été l'un des premiers qui se sont occupés de l'acclimatation des plantes alpines. Ces cultures furent établies déjà en 1876 dans ma propriété d'Yverdon (Vaud), et le catalogue de ces plantes fut publié en 1877. Depuis lors, grâce à une expérience de tous les jours, j'en suis arrivé à élever presque toutes ces plantes par le moyen du semis, le seul moyen propice à leur développement. De nombreux témoignages parus dans les journaux anglais, américains, suédois, autrichiens, allemands, français, italiens, danois, hollandais, belges et suisses, prouvent que les plantes que nous acclimatons à Genève réussissent bien dans les jardins de ces différents pays. D'innombrables attestations de nos clients, dans tous les pays de l'Europe, nous démontrent que nous avons eu raison d'entrer dans cette voie, et il est certain que, dans le monde horticole notre *jardin alpin d'acclimatation* a sa place marquée. Nous avons obtenu 68 médailles d'or, de vermeil et d'argent dans autant d'Expositions différentes, tant en Suisse qu'à l'étranger.

C'est donc avec la plus entière confiance que nous nous adressons à nos clients comme aux personnes qui ne nous ont pas encore honoré de leurs ordres, pour leur recommander notre jardin qui, pour poursuivre le but phytophyte qu'il s'est proposé, a besoin de l'appui de tous.

La plupart de nos Plantes alpines peuvent s'expédier durant toute l'année, grâce à la culture en pots ; les Plantes vivaces, par contre, ne s'expédient que de Février en Juin, et de Septembre en Novembre.

Un catalogue de graines, qui paraît en Novembre, donne la liste de toutes les espèces récoltées par nous, soit ici à Genève, soit dans les montagnes et de celles que nous recevons de nos différents correspondants.

Des volumes sur la description, sur le mode de culture ou d'utilisation des diverses plantes contenues dans cette liste, sont annoncés à la p. 131 du présent catalogue.

H. CORREVEON.

Plantes alpines, montagnardes et saxatiles.

Nous donnons peu de descriptions des pl. énumérées, nos clients possédant très généralement la « Flore colorée de poche » et seulement de rares indications sur la culture ou l'origine des plantes indiquées, tous ces renseignements étant fournis par le petit volume « Les plantes alpines et leur culture » annoncé à la fin du présent catalogue.

	fr. c.
Acæna adscendens (Vahl) (1)	0.50
» argentea (R. et P.)	0.50
» Buchanani (Hook.), jolie verdure bleuâtre	0.50
* » cylindrostachia (R. et P.)	0.50
» glabra (Buch.)	0.50
» glaucæ (Cockayne)	0.50
» lævigata (Ait.)	1.—
* » macrostemon (Hook.)	0.50
» microphylla (Hook.)	0.50
» montana (Hook.)	1.50
* » myriophylla (Lindl.)	0.50
» Novæ Zelandiæ (Kirk.)	0.50
* » ovalifolia (R. et P.)	0.50
* » ovina (Cunn.)	0.50
» pinnatifida (R. et P.)	0.50
* » Sanguisorbæ (Vahl.)	0.50
» sarmentosa (Cunn.)	0.50
» sericea (Jacq.)	0.50
* » splendens (Hook.), beau feuillage argenté	2.50
» trifida (R. et P.)	0.50

Plantes curieuses, naines et rampantes ; forment merveilleux gazons dans les sous-bois ou les lieux ombragés ; réussissent aussi en pl. sol. ; feuill. parfois aussi délicats que frondes Fougères. Les espèces marquées d'un * ne sont pas entièrement rustiques sous le climat de Genève.

Acantholimon acerosum (Boiss.)	2.50
» androsaceum (Boiss.) (2)	2.50
» Armenum (Boiss.)	1.—
» glumaceum (Boiss.)	1.50
» Libanoticum (Boiss.)	1.—

1 Nous avons adopté et suivons autant que faire se peut la nomenclature de l'Index Kewensis d'après laquelle toutes nos collections sont étiquetées. Les variétés non reconnues par les autorités de Kew, ou celles qui sont purement horticoles, sont étiquetées d'après le Dictionnaire de Nicholson et les meilleurs auteurs horticoles.

2 L'Ac. *Ararati*, que quelques catalogues allemands attribuent à Boissier — et qui est d'ailleurs identique à *Androsaceum* — est inconnu à l'herbier Boissier et n'a été publié nulle part.

	fr. c.
A. ulicinum (Boiss.)	2.50
» venustum (Boiss.)	2.50
Grand soleil ; rocher.	
Aceranthus diphyllus (Morr.), <i>Epime-</i> <i>dium diph.</i>	2.50
Achillea	

I. ESP. RAMPANTES, A FLEURS BLANCHES, A FEUILLAGE ARGENTÉ :

» ageratifolia (Benth. et Hook.)	0.50
» aizoon (Boiss.)	1.50
» argentea (Vis.)	0.50



Achillea tomentosa.

» Clavennæ (L.)	0.50
» lanata (Sprgl.)	0.50
» umbellata (Sibt. et Sm.)	0.50

II. ACHILLÉES ALPINES, DES HAUTES RÉGIONS, A FLEURS BLANCHES, A FEUILLAGE PLUS OU MOINS AROMATIQUE :

» alpina (L.)	0.50
» atrata (L.)	1.—
» Clusiana (Tausch)	1.—
» crustata (Schur.)	1.—

fr. c.

A. Graya (hybride très rare des Alpes Grayes)	5. —
» Herba-Rota (All.)	1. —
» hybrida (Gaud)	2. 50
» Impatiens (L.)	0. 50
» inpunctata (Hoppe)	2. 50
» Jaborneggi (Hal.)	2. 50
» Krættliana (Brüg.)	2. 50
» Ligustica (All.)	0. 50
» lingulata (W. et K.)	0. 50
» macrophylla (L.)	0. 50
» moschata (Wulf.), faux <i>Génipi</i>	0. 50
» nania (L.), camomille des glaciers	1. —
» odorata (L.)	1. —
» Portæ (Kern)	2. 50
» pyrenaica (Sibt.)	0. 50
» Reichardiana (Beck)	2. 50
» rupestris (Hut.)	0. 50
» Schurii (Schulze)	2. 50
» serbica (Panc.)	2. 50
» Thomasiana (Hall. f.)	2. 50
» transylvanica	2. 50

III. ACHILLÉES RAMPANTES OU BASSES, A FLEURS JAUNE VIF :

» Ageratum (L.)	0. 50
» Clypeolata (Sibth. et Sm.)	1. —
» coronopifolia (Willd.)	1. —
» Chrytmifolia (Waldst. et Kit.)	0. 50
» Eupatorium (Bieb.)	0. 50
» falcata (L.)	0. 50
» Gerberi (Bieb.)	0. 50
» micrantha (Bieb.)	0. 50
» Taygetaca (Boiss.)	1. —
» tomentosa (L.) Excellente pour tapisser et former des bordures; très solide et florifère; jaune vif	0. 50
» vermicularis (Trin.)	1. 50

Pour les espèces plus élevées et plus fortes voir plantes vivaces.

Aconitum anthora (L.), fl. jaunes	0. 50
» autumnale (Reich.), <i>A. tauricum</i>	0. 50
» cernuum , Baumg.	0. 50
» Columbianum (Nutt.)	1. —
» ferox (Wall.)	1. —
» Fischeri (Reich.)	0. 50
» Japonicum (Decsne)	1. 50
» Lycotonum (L.), fl. jaunes	0. 50
» moldavicum (Reich.)	0. 50
» Napellus (L.), fl. bleu-indigo	0. 50
» » à fleurs blanches	1. 50
» paniculatum (Lam.), fl. bleu-foncé	0. 50
» pyrenaicum (Lam.), <i>Lycoton</i> var.	0. 50
» septentrionale (Kœlle) couleur lie de vin	1. 50
» variegatum (L.), fl. bleu et blanc	0. 50
» » à fl. blanches	1. 50
» vulparia (Reich.)	0. 50

Bonnes pl. vivaces, propres à garnir les places ombragées et les lieux frais, à décorer les plates-bandes et à animer les grandes rocailles. Excellents pour le jardin alpin. Culture des plus faciles; fleurissent l'été et l'automne.



Aconitum Napellus.

Actæa alba (Mill.)	fr. c. 1. 50
» brachypetala (D. C.)	1. 50
» japonica , voir <i>Cimicifuga</i>	
» longipes (Spach)	1. 50
» spicata (L.), beaux fruits noirs, luisants	0. 50
» » var. <i>alba</i> , à fr. blancs	1. 50
» » var. <i>rubea</i> , à fr. rouges	1. 50
Pl. à beaux feuillages, à fl. blanches, à baies décoratives, propres à garnir les lieux ombragés.	
Actinella grandiflora (Torr. et Gray)	1. 50
» scaposa (Nutt.)	1. 50
Composées à fleurs jaunes, des Mont. Rocheuses.	
Adenophora communis (Fisch.)	0. 50
» coronata (A. D. C.)	1. —
» denticulata (Traut.)	1. —



Adenophora denticulata.

» Lamarkii (Fisch.)	1. —
» latifolia (Fisch.)	0. 50
» liliifolia (Led.)	1. —
» Potanini (Rgl.)	0. 50
Nouvelle et très gracieuse esp. sibérienne.	
» stylosa (Fisch.)	1. —
» tricuspidata (Fisch.)	1. —
» verticillata (Fisch.)	1. —

fr. c.

Ce sont des Campanules propres à garnir les rochers, les plates-bandes et massifs; fl. lilas ou bleues; pl. élégantes, hautes de 50 cent. à 1 mètre; juin-août.

Adenostyles albida (Cass.), <i>A. albifrons</i>	1. —
» Alliaria (Kern.)	2.50
» alpina (Kern.)	1. —
» candidissima (Cass.), <i>A. leucophylla</i>	2.50
» viridis (Cass.)	1.50

Grandes plantes alpines de la famille des Composées, à grandes f. orbiculaires, fl. roses. Sol frais et mi-soleil sauf pour candid. qui veut la rocaille et le soleil.

Adonis amurensis (Rgl.)	2.50
» apennina (Schouw.), très rare	2.50
» hybrida (Wolf.)	2.50
» pyrenaica (D. C.), très rare	2.50
» vernalis (L.)	0.50



Adonis vernalis.

» amurensis alba	5. —
» Wolgensis (Stev.)	2.50

Grandes anémones d'un jaune brillant, à feuillage très finement divisé; de mars en mai. L'A. vernalis est une superbe espèce facile à cultiver; c'est l'une des meilleures plantes du premier printemps. Sol profond et léger, grand soleil; lieux secs.

Adoxa moschatellina (L.)	0.50
---	------

Egopodium Podagraria (L.) à feuilles panachées (pour le sous-bois)	0.50
---	------

Aethionema armenum (Boiss.)	2.50
--	------

» cordatum (Boiss.) <i>Eunomia cordata</i>	1. —
---	------

» cordifolium (D. C.)	1. —
--	------

» græcum (Boiss.)	2.50
------------------------------------	------

» gracile (D. C.), <i>A. persicum</i>	1. —
--	------

» grandiflorum (Boiss.)	0.50
--	------

» Iberideum (Boiss.)	0.50
---------------------------------------	------

» ovalifolium (Boiss.)	1. —
---	------

» pulchellum (Boiss.)	0.50
--	------

» saxatile (R. Br.)	0.50
--------------------------------------	------

» Thomasianum (Gay), rarissime	2.50
---	------

Gracieuses Crucifères aux fl. roses (sauf Iberideum qui les a blanches), très florifères, aimant le soleil et propres à garnir les rocaillies, les fentes des murs et les lieux secs. Les A. cordifol., grandifl. et gracile sont les plus florifères et les plus décoratives.

Agrimonia Eupatoria (L.)	0.50
» odorata (Ait.)	0.50

fr. c.

A. repens (L.)	0.50
» suaveolens (Pursh.)	0.50
Agrostis alpina (Scop.)	0.50
Ajuga atropurpurea (Hort.)	0.50
» Brockbanki (Hort.)	0.50
» Genevensis (L.)	0.50
» » var. Pink hybrid	0.50
» metallica crispa (Hort.)	0.50
» pyramidalis (L.)	0.50
» reptans (L.)	0.50
» » fol. var.	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. roses	0.50

Les Ajuga (Bugles) ont des épis de fl. bleues, très décoratives chez les A. Genevensis et reptans qui sont des espèces envahissantes et très propres à garnir rapidement un talus aride ou un rocher ensoleillé; sol maigre.

Alchemilla alpina (L.)	0.50
» acutiloba (Stev.)	0.50
» alpina (Buser)	0.50
» asterophylla (Buser)	0.50
» conjuncta (Bab.)	0.50
» fissa (Schum.)	0.50
» glaberrima (Schmidt)	0.50
» helvetica (Brüg.)	0.50
» incisa (Buser)	0.50
» kersipila (Buser)	0.50
» major (Buser)	0.50
» montana (Schmidt)	0.50
» pentaphyllea (L.)	0.50
» pubescens (Bieb.)	0.50
» pyrenaica (Dufour)	0.50
» rigida (Bus.)	0.50
» sericata (Reich.)	0.50
» splendens (Gaud.)	0.50
» vulgaris (L.)	0.50

Petites Rosacées au feuillage gracieux et souvent argenté-soyeux.

Allium cærulescens (Boiss.)	0.50
» fallax (Schult.)	0.50
» flavum (L.)	0.50
» giganteum (Rgl.)	2.50
» Karakense (Rgl.)	0.50
» Karataviense (Rgl.)	0.50
» nigrum (L.)	0.50
» odorum (L.)	1. —
» pedæmontanum (Willd.)	1. —
» Ursinum (L.), pour les sous-bois	0.50

Grandes fl. carmin et rose; esp. superbe et rare.

» Victorialis (L.). Herbe à neuf chemises	0.50
--	------

Voir en outre pl. bulbeuses.

Alsine, voir *Arenaria*.

Alyssum argenteum (Vitm.)	0.50
» alpestre (L.)	1.50
» calycarpum (Rupr.)	1.50
» corymbosum (Boiss.)	0.50
» creticum (L.)	0.50
» Gemonense (L.)	0.50
» incanum (L.) <i>Berteroa incana</i>	0.50
» leucadeum (Guss.)	2.50
» Mcclendorianum (Beck)	0.50
» montanum (L.)	0.50

	fr. c.
A. Nebrodense (Tin.)	0.50
» orientale (Ard.)	0.50
» Ovirens (Kern.)	2.50
» petræum (And.)	0.50
» pyrenaicum (Lap.)	2.50
» repens (Baumg.)	1.50
» rostratum (Stev.)	0.50
» saxatile (L.), Corbeille d'or	0.50
» serpyllifolium (Desf.)	1.50
» speciosum (Pomel.)	0.50
» spinosum (L.)	1.—
» transylvanicum (Schur.)	0.50
» Wiersbickii (Heuf.)	0.50
» Wulfenianum (Bern.)	0.50

Crucifères rampantes ou en buissons, aux nombreuses fl. jaunes ou blanches; soleil, avril-juin.

Amelanchier, voir arbustes.

Amphicome arguta (Royle) 2.50

Amphoricarpus Neumayeri (Vis.) 2.50

Anacyclus formosus (Fenzl.) 2.50

Anagallis tenella (L.) 2.50

Délicieuse petite pl. rampante, aux fl. roses; sol poreux et humide; mi-soleil. Se cultive aussi dans les suspensions ou dans le sphagnum.

Anandria, voir Gerbera.

Anaphalis Billiardieri (D. C.) 2.50

» **margaritacea** (Hook.) 0.50

Andromeda, voir arbustes.

Androsace, groupe des espèces terrestres.

» **arachnoidæa** (S. N. K.), fl. blanches 1.—

» **carnea** (L.), fl. roses 1.—

» **chamæjasme** (Willd.), fl. blanches 0.50

Androsace Chumbyi (Hort.), fl. carmin clair 0.50

» **foliosa** (Dub.), fl. lilas 0.50

» **lactea** (L.), fl. blanc pur 0.50

» **lactiflora** (Fisch.), fl. blanc pur 0.50

» **Laggeri** (Huet), fl. rose vif; mars-avril 0.50

» **lanuginosa** (Wall.), fl. lilas, feuil. argenté-soyeux 0.50



Androsace lanuginosa.

» obtusifolia (All.), fl. blanches	0.50
» oculata (Hort.), fl. blanc rosé, à cœur rose vif	1.—
» primuloides (Duby), fl. lilas	5.—
» sarmentosa (Wall.), fl. rose-lilas-n.	0.50

	fr. c.
A. sempervivoides (Jacquem.), fl. rose-carmin	1.—
» villosa (L.), fl. blanc et rose	0.50

Toutes ces esp. aiment le soleil, un sol pierreux et sableux, une bonne niche dans la rocaille. Les *A. foliosa*, *lanuginosa*, *oculata* et *sarmentosa* (himalayennes) sont plus particulièrement robustes et vigoureuses et fleuris. abond. de juin en octobre-novembre.

Androsace, Aretia, groupe des espèces saxatiles :

» Charpentieri (Heer), carmin vif, rarissime	5.—
» ciliata (D. C.), carmin vif, rare	5.—
» cylindrica (D. C.), blanc, rare	5.—
» glacialis (Hoppe), du rose le plus vif au blanc pur	0.50
» Hausmanni (Leyb.), rose	5.—
» Helvetica (Gaud.), blanc, touffe serrée de rameaux grisâtres	1.50
» Hedræantha (Griseb.), rose vif	5.—
» hirtella (L.), blanc, feuillage argenté, rarissime	5.—
» imbricata (Lam.), blanc, feuil. argenté	5.—
» Pacheri (Leyb.), rose vif	5.—
» pubescens (D. C.), blanc	2.50
» pyrenaica (Lam.), blanc, pelotte serrée, rarissime	5.—
» vitaliana (Lap.), fl. jaune vif, mars-avril	0.50
» Wulfeniana (Sieb.), rose vif	1.—

Ce groupe est composé d'esp. extrêmement belles et essentiellement alpines; ce sont ces pelottes de fleurs qu'on rencontre sur les hauts rochers des Alpes et des Pyrénées. Leur culture n'est point facile. Il leur faut une fente de muraille ou de rocaille au levant ou au couchant, pas de terre (ou seulement un composé de cailloux et de sable si l'on veut les cultiver en pots). Eviter la pourriture.

Androsæmum, voir *Hypericum*.

Andryala, voir *Hieracium*.

Anemone, groupe *Hepatica*.

» acutiloba (D. C.),	1.50
» angulosa (Lam.)	0.50
» Hepatica (L.)	0.50
Hep. vars., voir plantes vivaces.	
» transylvanica (Fuss.)	1.—

Bonnes pl. à bordures ou pour émailler les tal-
lis; ombre ou soleil; fleur. mars-avril.

Anemone, groupe *Pulsatilla*.

» albana (Stev.), fl. lilas	1.—
» alpina (L.), fl. blanches	1.50
» amœna (Jordan)	1.—
» Burseriana (Scop.), fl. blanches	2.50
» Halleri (All.), violet et or	0.50
» montana (L.), violet foncé et or	1.—
» patens (L.), lilas et jaune	1.—
» » à fl. jaunes	2.50
» » var., <i>Nuttalliana</i> (d'Amérique)	2.50
» pratensis (L.), violet foncé	1.—
» » var. <i>nigricans</i>	1.50
» » var. <i>ochrolenca</i>	1.50
» » var. <i>obsoleta</i>	1.50

	fr. c.
A. Pulsatilla (L.), lilas violet et or . . .	0 50
» » à fl. blanches . . .	5.—
» » var. <i>pinnatifida</i> . . .	1 50
» rubra (Lam.), rouge, grenat et or . . .	2 50
» sulfurea (L.), jaune soufre. . . .	1 50
» vernalis (L.), couleur opale . . .	0 50

Ce groupe renferme de fort belles pl., qui fleurissent en mars-avril-mai et exigent le sec et le soleil.

Anemone, groupe *Holomocarpus*.

» narcissiflora (L.), rose et blanc . . .	0 50
» polyanthes (Don.), rose pâle . . .	5.—

Fleurs en bouquets dressés, mai-juin, mi-soleil.

Anemone, groupe *Anemonanthea*.

» apennina (L.), bleu lilas . . .	0 50
» » à fl. blanches. . . .	0 50
» » <i>atroviolacea</i> . . .	1 50
» Baïkalense (Fisch.), rose clair . . .	1.—
» Baldensis (L.), blanc rosé . . .	1.—
» blanda (Schott.), bleu . . .	0 50
» decapetala (L.) . . .	1.—
» dichotoma (L.), blanc pur . . .	0 50
» intermedia (Winkl.), jaune pâle . . .	5.—
» memorosa (L.), la sylvie des bois . . .	0 50
» » à fl. rose carmin . . .	1.—
» » à fl. pleines, <i>monstrosa</i> . . .	1.—
» » à fl. doubles. . . .	1.—
» » <i>apetala</i> . . .	1.—

» **pensylvanica**, v. *dichotoma*.

» ranunculoides (L.), jaune vif. . . .	0 50
» Robinsoniana (Hort.), bleu pâle . . .	1.—
» rupicola (Lamb.), blanc . . .	2 50
» sylvestris (L.), blanc, rose extér. . .	0 50
» » major , voir pl. vivaces.	
» trifoliata (L.), blanc pur . . .	0 50

Ces esp. réussissent bien sous-bois, dans les rocaillies ou les plates-bandes, il leur faut le mi-soleil ou l'ombre. Elles fleurissent de mars en juin. A. *sylvestris*, aux grandes cloches blanches qui rappellent A. *alpina*, est une pl. très robuste et envahissante, qui fleurit longtemps et souvent recommence à l'automne. A. *Baldensis* veut la rocaille et un sol pierreux.

Anemone, groupe *Anemonospermus*.


» caroliniana (Walt.) . . .	1 50
» globosa (Nutt.) . . .	1 50
» Hudsoniana (Richards.) . . .	0 50
» magellanica (Janc.) . . .	0 50
» multifida (Poir.) . . .	0 50
» obtusiloba (Don) . . .	1 50
» occidentalis (Wats.) . . .	2 50
» rivularis (Buch.) . . .	0 50
» » macrantha (Hort.) . . .	0 50
» virginiana (L.) . . .	0 50
» vitifolia (Buch.) . . .	2 50
» sp. nov. Himalaya . . .	5.—

Les esp. de ce groupe sont toutes à fl. blanches, parfois teintées de rose à l'extérieur. Elles fleurissent l'été et demandent un sol léger et le mi-ombre. Voir, en outre, pl. bulbeuses.

Anemonopsis macrophylla (Sieb. et Zuc.) . . .	1 50
Angelica alpina (Krock.) . . .	0 50
» dahurica (Fisch.) . . .	0 50
» ternata (Regel.) . . .	1 50

	fr. c.
Antennaria alpina (Gært.) . . .	0 50
» carpathica (Bl.) . . .	0 50
» dioica (Gært.). <i>Immortelle rose ou blanche des Alpes</i>	0 50
» monocephala (D. C.) . . .	0 50
» plantaginea (R. Br.) . . .	0 50
» tripplinervis (Sims.) . . .	0 50

Composées touffues et gazonnantes, aux f. argentées-soyeuses, dont on fait grand usage pour l'ornementation des *mosaïcultures* ou des plates-bandes; l'A. *dioica*, dont les fleurs se conservent à l'infini, est très appréciée des amateurs de jolies plantes et fait très bien dans les rocaillies, en plein soleil; fleurit en mai-juin.




Anemone sylvestris.

Anthemis aizoon, v. *Achillea*.

» Biebersteiniana (Koch.), à fl. jaunés d'or . . .	1 50
» Blancheana (Boiss.), fl. blanches . . .	1 50
» carpathica (Willd.), fl. blanches . . .	1 50
» cinerea (Panc.), fl. blanches . . .	1 50
» Kitaibelii , v. <i>carpathica</i>	
» macedonica (Boiss.), fl. blanches . . .	0 50
» maritima (L.), fl. blanches. . . .	1 50
» montana (L.), belle marguerite simple . . .	0 50
» nobilis (L.), camomille romaine vraie . . .	0 50
» rigescens (Willd.), fl. jaune paille . . .	0 50
» Spruneri (Boiss.), fl. blanches . . .	1 50
» tenuifolia (Schur.), fl. blanches . . .	1 50

Ce sont des sortes de camomilles à grandes fleurs, blanches ou jaunes, à feuil. finement divisé; soleil.

	fr. c.
Anthericum algeriense (Boiss.)	1.50
» Liliago (L.)	0.50
» Liliastrum , v. <i>Paradisica</i> .	
» planifolium (L.)	1.50
» racemosum (L.), le petit lis blanc des rochers	0 50
Ce sont des Liliacées à fl. blanches, très nombreuses chez <i>racemosum</i> , qui est le plus recommandable; soleil.	
Anthyllis montana (L.)	
Très belle papillon. à feuell. grisâtre, à fl. rose vif, très odorantes, fleurissant de mai en octobre et s'étalant en touffes plates et ornementales; roc. ou pl. terre; soleil.	
Antirrhinum asarina (L.)	1.50
» glutinosum (Boiss.)	0.50
» sempervirens (Lap.)	1.50
» siculum (Ucr.)	1.50
Mufliers ou gueule-de-loup alpines ou murales, des Pyrénées ou des mont. d'Espagne et de Sicile; fl. jaune pâle ou blanc jaunâtre, nombreuses; A. <i>glutinosum</i> , la meilleure espèce, fait l'ornement des rochers et des vieux murs au plein soleil.	
Aphyllanthes monspeliensis (L.), <i>Jonc rose du midi</i>	1.50
Aposeris foetida (L.). <i>Hyoseris foetida</i>	0.50
Aquilegia advena (Fisch.), brunâtre	0.50
» alpina (L.), bleu d'azur	0.50
» arctica , v. <i>Formosa</i> .	
» atrata (Koch.), rouge grenat	0 50
» atropurpurea (Willd.), rouge sombre	0.50
» aurea (Ræzl.), voisine de <i>chrysantha</i>	1 —
» Baikalense (Hort.), bleu foncé et blanc	1.—
» Bertoloni (Schott.), bleu pur, gracieuse	1.50
» Buergeriana (S. et Z.), bleu foncé	0.50
» californica (A. Gr.), rouge vermillon et jaune	1 —
» canadensis (L.), rouge cinabre et jaune	0 50
» caucasica (Led.), bleu	0.50
» chrysantha (A. Gr.), jaune clair; longs éperons	0.50
» cœrulea (James), bleu d'azur et blanc	0.50
» corymbosa	1.—
» Einseleana (Schulz.), bleu	0.50
» flabellata (S. et Z.), très précoce; blanc pur; nain	0.50
» flavescens (Wats.), jaunâtre	1.50
» Formosa (Fisch.), <i>Arctica</i> , rouge vif, et vert et or	2.50
» glandulosa (Fisch.), bleu pur et blanc (vrai)	2.50
» grata (Maly.), bleu clair	1.—
» Hænkeana (Koch.), bleu foncé	0.50
» hispanica (Borb.), bleu foncé	0 50
» hybrida (Hort.), v. pl. vivaces.	
» jucunda (Fisch.), rose pâle	0.50
» Kitaibelii (Schott.), bleu foncé	0 50
» lactiflora (K. et K.), blanc	2 50
» leptoceras (Nutt.), v. <i>cœrulea</i> .	
» longicalcarata (Rgl.), bleu et blanc; nain	1.—
» nevadensis (Boiss.), bleu	0.50
» nigricans (Baumg.), brun foncé	1 —



Aquilegia cœrulea.

	fr. c.
A. nivea (Baumg.), blanc pur	0.50
» Olympica (Boiss.), bleu et blanc	0.50
» oxysepala (Traut.), bleu et jaune; nain et précoce	1.—



Aquilegia Olympica.

	fr. c.
A. pyrenaica (D. C.), bleu; nain	0.50
» sibirica (Lem.), bleu lilas	1. —
» Skinneri (Hook.), rouge vif et or; voi- sin de Formosa	0.50
» Stuartii (Hort. Angl.), grande fl. bleu céleste	2.50
» thalictrifolia (Schott.), bleu lilas	0.50
» transylvanica (Schur.), bleu pâle; voi- sine d'alpina	1.50
» truncata (Fisch.), rouge vif et or	1.50
» viridiflora (Pall.), presque noir; odor.	2.50
» viscosa (Gouan.), bleu lilas	1. —
» vulgaris (L.), bleu	0.50

Les Ancolies sont d'entre les meill. pl. du prin-
temps; cult. facile; mi-ombre ou sous-bois,
rocaille, pl. terre, même au soleil. Les *A. alpi-
na*, Bertoloni, *cœrulea*, *lactiflora*, *pyrenaica*,
thalictrifolia et *transylvanica*, plus délicates,
exigent la rocaille ou milieu frais, mi-ombre,
un sol poreux et bien drainé. Toutes fleuris-
sent abondamment et sont très grac. et orne-
mentales. (Voir pl. vivaces.)

Arabis albida (Stev.), <i>Corbeille d'argent</i>	0.50
» » <i>v. crispata</i>	0.50
» » <i>v. nana</i>	0.50
» alpina (L.)	0.50
» amplexicaulis (Edg.)	1. —
» androsacea (Fenzl.)	0.50
» arenosa (Scop.), à fl. roses	0.50
» aubrietoides (Boiss.), fl. lilas; très belle espèce d'Orient	1. —
» bellidifolia (Jacq.)	0.50
» Breweri (Wats.)	1. —
» bryoides (Boiss.)	0.50
» carduchorum (Boiss.) <i>Draba Gigas</i>	0.50
» ciliata (R. Br.)	0.50
» cœrulea (Wulf.), fl. bleu rosé	1. —
» dygenea (Fritsch.)	0.50
» Halleri (L.), rose clair	0.50
» japonica (Rgl.)	0.50
» petræa (Lam.)	0.50
» procurrens (W. et K.)	0.50
» rosea (D. C.), rose	0.50
» Scopoliana (Boiss.)	0.50
» Vochinensis (Sprgl.)	0.50

Petites crucifères traînantes, à fl. généralement
blanches, précoces et recherchant la rocaille
et le soleil.

Arctostaphylos alpina (Sprgl.) *Arbousier
des Alpes*.

» Uva Ursi (Sprgl.) <i>Raisin d'ours</i>	1.50
---	------

Arbustes rampants, le premier à f. caduques,
rougissant l'automne, et à baies d'un noir de
jais, le second à feuil. persistantes, d'un beau
vert et à fr. rouges.


Arenaria abietina (Presl.)	1. —
» Arduini (Vis.)	1. —
» aretioides (Port.)	0.50
» balearica (L.), très cespiteuse mais frileuse	0.50
» cæspitosa (Ehrh.)	0.50
» cephalotes (Bieb.)	0.50
» cerastiifolia (Ram.)	1. —
» ciliata (L.)	0.50

	fr. c.
A. Gerardi (Willd.)	1. —
» Gothica (Gren.)	1. —
» gracilis (K. et Sch.)	0.50
» graminifolia (Schrad.)	0.50
» grandiflora (L.)	0.50
» gypsophiloides (L.)	1. —
» Huteri (Kern.)	0.50
» juniperina (L.)	1. —
» kotschyana (Fenzl.)	1. —
» kingii (Hort.)	1. —
» lanceolata (All.)	0.50
» laricifolia (L.)	0.50
» Ledebouriana (Fenzl.)	0.50
» leptoclados (Boiss.)	1. —
» liniflora (Heg.)	0.50
» montana (L.)	1. —
» mucronata (L.)	0.50
» norvegica (Gunn.)	1. —
» pinifolia (Bieb.)	0.50
» pungens (Clém.)	1. —
» purpurascens (Ram.)	0.50
» recurva (All.)	0.50
» rigida (Bieb.)	0.50
» Rosani (Ten.)	0.50
» rotundifolia (Bieb.)	0.50
» scandinavica , v. <i>Stellaria biflora</i>	1. —
» sp. Hazara (Himalaya)	1. —
» striata (Vill.)	0.50
» tetraquetra (L.)	0.50
» verna (L.)	0.50
» » à fl. pleines	0.50
» Villarsii (Balb.)	1. —

Les *Arenaria* ou *Alsine* sont de petites pl. gazon-
nantes, tapissant le sol et produisant une infinité
de fl. blanches (roses chez *purpurascens*); mai-
juillet; soleil.

Aretia v. *Androsace*.

Armeria alpina (Willd.)	0.50
» arctica (Wallr.)	0.50
» argyrocephala (Wallr.)	0.50
» cæspitosa (Boiss.)	2.50
» cariensis (Boiss.)	0.50
» cephalotes (Hook.)	0.50
» » à fl. blanc pur	1. —



Armeria cephalotes.

	fr. c.
<i>A. elongata</i> (Hoffm.)	0 50
» <i>filicaulis</i> (Boiss.)	0 50
» <i>Halleri</i> (Wallr.)	0 50
» <i>juncea</i> (Gir.)	1 50
» <i>Labradorica</i> (Wallr.)	0 50
» <i>Laucheana</i> (Hort.)	0 50
» <i>majellensis</i> (Boiss.)	0 50
» <i>maritima</i> (Willd.)	0 50
» <i>plantaginea</i> (Willd.)	0 50
» <i>Rumelica</i> (Boiss.)	0 50
» <i>sibirica</i> (Turcz.)	0 50
» <i>splendens</i> (Boiss.)	0 50
» <i>vulgaris</i> (Willd.) <i>Gazon d'Olympe</i>	0 50
Pl. basses et gazon. à fl. rose plus ou moins vif en capitules serrés. Soleil; été.	
<i>Arnebia echinoides</i> (D. C.)	1 —
<i>Arnica alpina</i> (Ol. et Lad.)	1 50
» <i>amplexicaulis</i> (Nutt.)	2 50
» <i>Chamissonis</i> (Less.)	0 50
» <i>foliosa</i> (Nutt.)	1 50
» <i>latifolia</i> (Bong.)	2 50
» <i>longifolia</i> (Eaton)	2 50
» <i>montana</i> (L.)	1 50



Arnica montana.

» <i>v. angustifolia</i> (Turcz.)	2 50
» <i>sacchalinensis</i> (A. Gr.)	2 50

Fleurs jaunes, en marguerites; l'*A. montana*,
Arnica des officines, est bien connu par ses
grands capitules orangés. Il leur faut à tous
un sol profond et meuble, et, si possible (pour
A. montana surtout) dépourvu de calcaire.

Aronia, v. *Amelanchier*, arbustes.

Aronicum (*Doronicum*).

» <i>carpathicum</i> (Schur)	1. —
» <i>Clusii</i> (Koch)	1. —
» <i>glaciale</i> (Reich.)	1. —
» <i>scorpioides</i> (Reich.)	0 50

Brillants soleils d'or des pierriers alpins; mi-
soleil.

<i>Artemisia abrotanum</i> (L.)	0 50
* » <i>arbuscula</i> (Nutt)	2 50
* » <i>austriaca</i> (Jacq.)	1 50

	fr. c.
* <i>A. Baumgarteni</i> (Bess.)	1 50
» <i>Biasoletiana</i> (Vis.)	1 50
* » <i>borealis</i> (Pall.)	1 50
» <i>campestris</i> (L.)	0 50
» <i>camphorata</i> (Vill.)	0 50
* » <i>canadensis</i> (Mich.)	0 50
* » <i>caucasica</i> (Willd.)	1 50
» <i>chamæmelifolia</i> (Vill.)	0 50
* » <i>cœrulescens</i> (Pall.)	2 50
* » <i>filifolia</i> (Torr.)	1 50
* » <i>frigida</i> (Willd.)	2 50
* » <i>glacialis</i> (L.)	1. —
» <i>glaucæ</i> (Pall.)	0 50
» <i>gnaphalioides</i> (Nutt.)	0 50
* » <i>granatensis</i> (Boiss.)	0 50
* » <i>japonica</i> (Thumb.)	1 50
* » <i>lanata</i> (Willd.)	0 50
» <i>Ludoviciana</i> (Nutt.)	0 50
* » <i>maritima</i> (L.)	1. —
* » <i>mexicana</i> (Willd.)	1 50
* » <i>Mutellinum</i> (Vill.) <i>faux-Génipi</i>	0 50
» <i>nitida</i> (Bert.)	1. —
» <i>norica</i> (Lyb.)	1. —
* » <i>pedemontana</i> v. <i>lanata</i>	
* » <i>Rœzlii</i> (Hut.)	1 50
» <i>rupestris</i> (L.)	0 50
* » <i>sericea</i> (Weber)	1 50
» <i>Sieversiana</i> (Willd.)	1. —
* » <i>spicata</i> (Wulf.) <i>Génipi vrai</i>	0 50
* » <i>Stelleriana</i> (Bess.)	0 50
* » <i>tridentata</i> (Nutt.)	2 50
* » <i>Valesiaca</i> (all.) à odeur très forte	1. —
* » <i>Villarsii</i> (Gren. et Godr.)	2 50

Les *Artemises* ou *Armoises*, sont de gracieuses
composées fortement aromatiques, dont plus.
très appréciées en pharmacie. Le vrai *Génipi*
est la plus réputée; mais sa cult. est difficile
et son congénère *A. mutel.*, qui en diffère peu
quant aux qualités et offre le même aspect,
lui est généralement préféré dans les rocailles.
Soleil; sol sableux et caillout., profond, bien
drainé. Le *Génipi* veut un sol dépourvu de
calc., le soleil, la rocaille non calc.

Les esp. marquées d'un * ont le feuillage
très fin, hautement décoratif et gris d'argent;
soleil et sec.

<i>Arum italicum</i> (Mill.) beau feuillage pa- naché	0 50
» <i>maculatum</i> (L.), <i>Pied de veau</i>	0 50

Bonnes pl. pour l'ombre.



Arum italicum.

fr. c.

Asarum arifolium (Mich.)	2.50
» canadense (L.)	0.50
» caudatum (Lindl.)	2.50
» europæum (L.)	0.50
» grandiflorum (Klotzch)	2.50
» virginicum (L.)	2.50

Excellentes pour l'ombre; beau feuillage; plantes naines et touffues, propres à former un tapis de verdure dans les pentes des rocaillies tournées au nord. L'A. europæum forme de très jolis sous-bois; c'est l'une des meill. pl. d'ombre. Racines fortement aromatiques.

Asparagus tenuifolius (Lam.), charmante asperge des alpes lombardes, au feuil. extrêmement fin et délicat	1.50
--	------

» verticillatus (L.)	1.—
-----------------------------	-----

Asperula athoa v. <i>suberosa</i> .	
--	--

» carpathica	0.50
» cynanchica (L.)	0.50
» hexaphylla (All.)	0.50
» hirta (Ram.)	1.50
» humifusa (Bieb.)	0.50
» nitida (Sibt. et Sm.)	0.50
» odorata (L.)	0.50
» suberosa (Sibt. et Sm.)	2.50
» Taurina (L.)	1.—

Jolies petites pl. de rochers; l'A. odorata (Hépatique des bois, ou *Maitrank*, est recherchée pour le parfum qu'elle répand en séchant et comme pl. des bois; excellente pour l'ombre; fl. blanches; mai-juin.

Aster alpinus (L.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. roses	1.50
» » v. <i>Baldensis</i>	1.—
» » v. <i>Himalayensis</i>	1.—
» » v. <i>longipetiolata</i>	1.—
» » v. <i>speciosus</i>	0.50
» » v. <i>suffruticosus</i>	1.—
» » v. <i>superbus</i>	1.—



Aster alpinus.

» amelloides (Hoffm.), riche floraison	0.50
» amellus (L.), octobre-novembre	0.50
» Bessarabicus (Bruh.), gr. fl. lilas.	0.50
» Bigelowi (A. Gr.), des Montagnes Rocheuses	1.50



Aster amellus.

fr. c.

A. canescens (Pursh.), des Montagnes Rocheuses	0.50
» diplostephioides (Wall.), de l'Himalaya	0.50
» Fendleri (A. Gr.), des Mont. Rocheuses	0.50
» Fremonti (A. Gr.), des Mont. Rocheuses	0.50
» Garibaldii (Brügg.)	2.50
» Pattersoni (A. Gr.)	2.50
» Porteri (A. Gray.), Mont. Rocheuses	0.50
» pyrenæus (D. C.), rarissime et belle espèce	2.50
» Scaber (Thunb.), Japon	0.50
» Sikkimensis (Hook.), Himalaya	1.50
» Stracheyi (Hook.)	1.50
» suffruticosum (Winkl.)	1.—
» Thomsoni (Clarke), Himalaya	1.50
» Wahli (Hook.), Andes du Chili	1.50

Marguerites violettes, lilas, blanches ou bleues, au cœur d'or; soleil. Les Aster alpinus, amellus et Bessar. sont les plus solides.

Astilbe Chinensis (Franch.)	0.50
» japonica (Thunb.)	1.—
» rivularis (Buchan.)	0.50

Astragalus alopecuroides (L.), rare et belle; fl. jaunes	2.50
» alpinus (L.). <i>Phaca astragalina</i>	0.50
» aristatus (L'Hérit.)	2.50
» caryocarpus (Gawl.)	2.50
» depressus (L.)	1.50
» Drummondii (Dougl.)	2.50
» exscapus (L.)	1.50
» giganteus (Wats.)	2.50
» glyciphyllus (L.)	0.50
» monspessulanus (L.)	1.—
» Murphyi (Huter.)	1.50
» Onobrychis (L.)	1.—
» Parryi (A. Gr.)	2.50
» purpureus (Lam.)	1.—
» racemosus (Pursh.)	2.50
» reflexistipulus (Miq.)	2.50
» Shortianus (Nutt.)	2.50

Sol profond; soleil.

Astrantia bavarica (Schulz.)	0.50
» Biebersteiniana (Trautv.)	0.50
» carinthiaca (Hoppe)	0.50
» carniolica (Wulf.)	0.50

	fr. c.
A. gracilis (Bartl.)	0.50
» Helleborifolia (Salisb.)	0.50
» intermedia (Bieb.)	0.50
» major (L.), <i>Etoile du pâturage</i>	0.50
» » à fl. pourpres	1.—



Astrantia major.

» minor (L.)	0.50
» neglecta (Koch.)	0.50
» pauciflora (Bert.)	1.—

L'*Etoile du pâturage* est bien connue de tous les amis de la montagne; ombre ou mi-ombre; mai-novembre; roc. ou pl. terre; les autres espèces recherchent la fraîcheur et aiment les rocaillies.

Athemanthe cretensis (L.)	0.50
» Matthioli (Wulf.)	0.50
Atragene alpina (L.), <i>Clématite bleue des Alpes</i>	0.50
» alpina , à fl. blanches	5 —
» » à fl. roses	1.50
» ochotensis (Fisch.)	2.50
» sibirica (Fisch.)	1.50
» verticillaris (D. C.)	2.50
» Wenderothii (Schtdl.)	2.50
Atraphaxis Billardiesi (Jaub.)	0.50
Atriplex canescens (James)	1.—
Atropa Belladonna (L.), <i>Belladone</i>	0.50
» » à baies jaunes.	0.50
Aubrietia antilibani (Boiss.)	0.50
» Columnæ (Guss.)	0.50
» croatica (Schott.)	0.50
» deltoidea (D. C.)	0.50
» » v. grandiflora	0.50
» erubescens (Griseb.)	0.50
» Eyrii (Hort.)	0.50
» « Fire King » (Hort.)	0.50
» gracilis (Sprun.)	0.50
» Hendersonni (Hort.)	0.50
» Leichtlini (Hort.)	0.50
» Olympica (Boiss.)	0.50
» Pinardi (Boiss.)	0.50
» Tauricola (Schott)	0.50

Jolies petites crucifères aux innombrables fl. acaulés, violettes, roses, lilas, etc., formant des touffes compactes recouvertes, de mars en juin, de fl.; soleil.

	fr. c.
Audibertia polystachya (Benth.)	0.50
» stachyoides (Benth.)	0.50
Avena argentea (Willd.)	0.50
Azalea (<i>Loiseleuria</i>) procumbens (L.)	2.50
Petite azalée des Hautes Alpes où elle tapisse les rochers granitiques de ses innombr. fl. d'un rose intense; terre non calcaire; soleil.	

Baccharis , v. arbuscules .	
Bahia chrysanthemoides (A. Gr.)	0.50
» lanata v. <i>Eriophyllum</i> .	
Baldwinia uniflora (Nutt.)	1.50
Bantia petræa , v. <i>Gypsophyla transylvanica</i> .	
Baptisia , v. pl. vivaces.	
Bartsia alpina (L.)	0.50
Bellidiastrum Micheli (Cass.) <i>Grande Pâquerette</i> .	
Bellis cœrulescens (Coss. et Bal.)	0.50
» perennis (L.) (Pâquerette)	0.50
» rotundifolia (Boiss.)	0.50
» sylvestris (Cyr.)	0.50
Bellium bellioides (L.)	0.50
» crassifolium (Moris)	0.50
» minutum (L.)	0.50

Minuscules Pâquerettes méditerran. formant des rosettes de feuilles d'où s'échappent de nombreuses fl., se succédant de mai en octobre; soleil.

Berardia subacaulis (Vill.)	5.—
Berkheya purpurea (Bent. et Hook.)	1.50
Bergenia , v. <i>Saxifraga</i> .	
Berteroa incana (DC.)	0.50
Betonica alopecuroides (L.)	0.50
» grandiflora (Ster.) grandes fl. violettes; Caucase	0.50



Betonica grandiflora.

» hirsuta (L.)	0.50
» incana (Ait.), <i>macrostachys</i> (Wend.)	0.50
» nivea (Ster.)	0.50
» officinalis (L.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
Labiales à fl. en thyrses ou en épis, corolles jaune-clair, bleu-lilas, roses ou blanches; mi-soleil.	
Bigelovia albicaulis (Greene)	1.50
» graveolens (A. Gr.)	1.50
» Howardi (A. Gr.)	1.50
Belle comp. ornement. à fl. jaune d'or; soleil.	

	fr. c.
Biscutella lævigata (L.)	0.50
» lucida (D. C.)	1.50
Blitum capitatum (L.)	0.50

Très curieuse Chénopodiacee dont les graines, agglomérées en une pulpe rouge vif, ont l'aspect d'une énorme fraise ou d'une crête de coq; soleil; pl. terre ou roc.

Borago laxiflora (D. C.)	2.50
» orientalis (L.)	0.50

La première est une délicieuse pl. corse, aux fl. d'un azur intense; la deuxième, une grosse pl. vivace aux fl. azur et rose, en grands panicules apparaissant de février en juin; grand feuillage ornemental, très propre à garnir sous bois ou lieux ombragés.

Bouteloua olygostachya (Torr.)	1.50
Boykinia aconitifolia (Nutt.)	1.50
» elata (Greene)	1.50
» rotundifolia (Parr.)	1.50

Brassica Richerii (Vill.) pl. rare du Dauphiné	1.50
---	------

Braya alpina (Sternb.)	0.50
» supina (Koch)	0.50

Brickelia grandiflora (Nutt.)	1.50
--	------

Bridgesia, v. *Ercilla*.

Bulbocodium vernum (L.)	1.—
--	-----

Buphtalmum grandiflorum (L.)	0.50
---	------

» salicifolium (L.)	0.50
--------------------------------------	------

» speciosissimum (Ard.) <i>Telekia speciosissima</i>	2.50
---	------

» speciosum (Schreb.) v. pl. vivaces.	
--	--

Le vrai *B. speciosissimum*, aux feuilles parcheminées, aromatiques, aux beaux capitules d'or, est très rare dans les cultures. La pl. génér. vendue sous ce nom-là est le *B. speciosum*.

Bupleurum aureum (Fisch.)	0.50
--	------

» candollei (Wall.)	0.50
--------------------------------------	------

» fruticosum (L.), arbuste à f. persistantes	1.—
---	-----

» glaucum (Robil.)	0.50
-------------------------------------	------

» longifolium (L.)	0.50
-------------------------------------	------

» multinerve (D. C.)	0.50
---------------------------------------	------

» ranunculoides (L.)	0.50
---------------------------------------	------

» stellatum (L.)	0.50
-----------------------------------	------

Cacalia hastata (L.) <i>Senecio sagittatus</i>	2.50
---	------

» suaveolens	2.50
-------------------------------	------

» tuberosa (Nutt.)	0.50
-------------------------------------	------

Caccinia glauca (Savi)	0.50
---	------

» strigosa (Boiss.)	0.50
--------------------------------------	------

Boraginées persanes, à tiges couchées, à feuilles rugueuses et bleuâtres, à fl. bleu et rose, en larges grappes; soleil; mai-août.

Calamintha alpina (Lam.)	0.50
---	------

» grandiflora (Moench)	0.50
---	------

» thymifolia (Host.)	0.50
---------------------------------------	------

Callianthemum, v. *Ranunculus*.

Callirhoë pedata (A. Gr.)	0.50
--	------

» verticillata (A. G.)	0.50
---	------

Callisace, v. *Angelica*.

Callixene, u. *Luzuriaga*.

Calluna vulgaris (Salisb.) <i>Bruyère commune</i>	1.—
--	-----

Caltha alpestris (Schott)	1.—
--	-----

» biflora (D. C.)	2.50
------------------------------------	------

	fr. c.
C. leptosepala (D. C.)	2.50
» palustris (L.) <i>Populage</i> ; fl. jaune-orangé vif	0.50



Caltha palustris.

» parnassifolia (Raf.)	2.50
---	------

» purpurascens (Hort.)	2.50
---	------

Fl. jaunes, grandes, décorat.; premier printemps; propres à animer les lieux frais, le bord des eaux, les places fraîches ou humides.

Calystegia Soldanella (R. Br.)	1.—
---	-----

» Stans (Steud.)	1.—
-----------------------------------	-----

» tuguriorum (R. Br.)	1.—
--	-----

Liserons ou volubilis vivaces, à fl. roses ou blanches.

I. Campanula, espèces purement alpines, basses ou traînantes¹:

Campanula allionii (Vill.), grande cloche violette, penchée	2.50
--	------

» barbata (L.)	0.50
---------------------------------	------

» alpina (Jacq.) à fl. blanches	2.50
--	------

» Baumgarteni (Beck.)	0.50
--	------

» Bocconi (Vill.), voisin de <i>pusilla</i>	2.50
--	------

» Burghalti (Hort.), voisin de <i>van Houttei</i>	1.—
--	-----

» cæspitosa (Scop.), nombreuses clochettes lilas clair	2.50
---	------

» carnica (Schiede.)	2.50
---------------------------------------	------

» carpathica (Jacq.)	0.50
---------------------------------------	------

» » à fl. blanches	0.50
------------------------------	------

» » var. <i>nana</i>	1.—
--------------------------------	-----

» cenisia (L.)	1.—
---------------------------------	-----

» cochlearifolia , v. <i>pusilla</i> .	
---	--

» colorata (Wall.)	2.50
-------------------------------------	------

» collina (Bieb.)	0.50
------------------------------------	------

* » Elatines (L.)	2.50
------------------------------------	------

* » Elatinoides (Moret)	2.50
--	------

* » excisa (Schleich.)	2.50
---	------

* » expansa (Friv.)	2.50
--------------------------------------	------

* » garganica (Ten.)	0.50
---------------------------------------	------

» » à fl. blanches	2.50
------------------------------	------

» » à fl. lilas clair	2.50
---------------------------------	------

» » hirsuta	2.50
------------------------------	------

¹ M. Correvon a publié dans le *Garden*, de Londres, de juin à octobre 1901, une série d'articles sur les Campanules; nos clients anglais trouveront là des renseignements sur la culture, la description et la nomenclature de ce genre.



Campanula cæspitosa.



Campanula carpathica.

	fr. c.
C. hederacea (L.). <i>Wahlenbergia hederacea</i>	1.—
» Hentschiana (Sint.)	2.50
» Hostii (Baumg.)	0.50
» lactiflora (Bieb.), fl. lilas clair ou blanches	0.50
* » macrorhiza (Gay)	2.50
* » mirabilis (Albow.)	2.50
» Mœhreimii (Hort.)	2.50
* » muralis (Port.). <i>Postenschlagiana</i>	0.50
* » » major	2.50
» nitida (Soland)	1.—
» Parryi (A. Gray.)	2.50
» pelviformis (Hort.), lilas très clair; grande fleur	1.—
* » petræa (L.), fl. jaunes; très rare	5.—
» Postenschlagiana (R. et S.), v. <i>muralis</i>	
» pseudo-carnica (Gehni)	2.50
» pseudo-Raineri (Defreg.)	2.50
» pulloides (Hort.)	2.50
» pulla (L.), cloch. d'un violet noir, très nombr.	0.50
* » pusilla (Hænke), excell. esp. traînante; fl. lilas clair	0.50

	fr. c.
C. pusilla , à fl. blanches	0.50
* » Raineri (Perp.), vraie; très belle espèce des Alpes lombardes.	2.50
» Raineri , var. N° I	1.—
» » var. N° II.	1.—
» Rhomboidalis (L.)	0.50
» » à fl. blanches	1.50



Campanula rhomboidalis.

» sarmatica (Ker.)	0.50
* » Saxifraga (Bieb.)	1.—
* » Scheuchzeri (Vill.)	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» soldanellæflora (Hort.)	1.50
» speciosa (Pourr.), superbe espèce pyrénéenne	2.50
» stenocodon (Boiss.), rare espèce piémontaise	2.50
» Steveni (Bieb.)	1.—
» Tenorii (Moret)	5.—
» thyrsoidea (L.), à fl. jaunes, odor.	0.50
* » tridentata (Schreb.)	1.—
» turbinata (Schott.)	0.50



Campanula turbinata.

	fr. c.
C. turbinata à fl. blanches	0.50
» tyroliensis (Hym.)	1.—
» Valdensis (All.)	1.—
» van Houttei (Hort.)	1.—
* » Vanneri (Roch.)	1.—
» velutina (Desf.)	5.—
» Waldsteiniana (R. S.)	2.50
» Wilsoni (Hort.)	1.—
* » Zoyzii (Wulf.)	2.50

Les espèces marquées d'une * sont murales ou essentiellement saxatiles; elles exigent le rocher ou la muraille et veulent être plantées horizontalement. Elles aiment le soleil; les *C. Elatines*, du Piémont, et *Elatinoides*, des Alpes bergamasques, préfèrent l'ombre et réussissent seulement dans les fentes de rochers ou des murs. Ce sont de superbes Campanules aux nombreuses fleurs bleu foncé, au feuillage velu tomenteux chez la dernière et qui fleur. l'automne. Elles sont très rares dans les cultures parce qu'on a le tort de leur donner un sol nourrissant et la position verticale. Les *C. Allionii*, *cenisia*, *excisa* et *speciosa* croissent naturellement dans les pierriers, les moraines ou les éboulis terreux exposés au soleil. Il leur faut très peu de nourriture, un sol sableux, caillouteux et profond. Le vrai *C. Raineri* est rarement cultivé, car ce qu'on vend le plus souvent sous son nom c'est le *C. turbinata*. Le *C. Raineri* hante les fissures des rochers dolomitiques très ensoleillés des Alpes lombardes-vénitiennes; sa belle large fl. lilas est une décoration superbe pour les rochers. Il lui faut le mur ou la fente d'un rocher en plein soleil. Les *C. Garganica* et *muralis* font merveille dans les rochers comme en pl. terre et le second supporte le mi-ombre et même l'ombre, fleurissant de juin en octobre souvent. *C. Zoyzii* est une espèce délicate qu'il faut cultiver dans une pente bien ensoleillée et surveiller de près. Les espèces qui poussent les plus fortes touffes sont les *C. caespitosa*, *carpathica*, *collina*, *Hostii*, *muralis*, *pelviformis*, *pulla*, *pusilla*, *rotundifolia*, *sarmatica*, *Scheuchzeri*, *turbinata*, *tyroliensis* et *Valdensis*; elles sont de culture facile et fleur. beaucoup.

Toutes ces Camp. alpines et saxatiles sont riches de couleur et abondantes de floraison.

II. Campanules montagnardes, des régions inférieures ou des bois, propres à orner la pleine terre ou les rocailles:

C. Abietina (Gris.)	1.—
» Alliariaefolia (Willd.), grandes fl. blanches, penchées	0.50
» Alliariaefolia , v. <i>cordata</i> (Traut.)	0.50
» " v. <i>macrophylla</i> (D. C.)	0.50
» americana (L.)	0.50
» azurea (Sol.)	0.50
» Baldschiana (Hort.)	2.50
» Bononiensis (L.)	0.50
» caudata (Vis.)	1.—
» dahurica (Siev.)	1.50
» elegans (R. et S.)	0.50
» eriocarpa (Bieb.), très belles et grandes fleurs lilas	0.50



Campanula Alliariaefolia.

	fr. c.
C. glomerata (L.), violet foncé	0.50
» " à fl. blanches	1.50
» " à fl. azurées	1.50
» grandis , v. <i>latiloba</i>	
» Grosseki (Heuf.)	0.50
» Haylodgensis (Hort.)	1.50
» Hendersonni (Hort.)	1.50
» lamiifolia (Bieb.) voisin d' <i>Alliariaefolia</i>	0.50
» latifolia (L.)	0.50
» " à fl. blanches	0.50
» " villicaulis (Witt.)	0.50
» latiloba (A. D. C.) grandis	0.50
» macrantha (Fisch.) grandes fl. bleu-lilas	0.50
» nobilis (Lindl.) grandes fl. blanches	0.50



Campanula nobilis.

» persicifolia (L.) grandes cloches bleu-lilas	0.50
» persicifolia à fl. blanches	0.50
» primulaefolia (Brot.)	1.—
» punctata (Lam.), grandes fl. ponctuées de noir	0.50
» pyramidalis (L.)	0.50
» " à fl. blanches	1.—
» Rapunculoides (L.)	0.50



Campanula pyramidalis.

	fr. c.
C. sibirica (L.)	0.50
» spicata (L.)	0.50
» subpyrenaica (Timbal.)	0.50
» Trachelium (L.)	0.50
» » à fl. pleines	1.50
» » à fl. blanches	1.50
» urticifolia (Schmidt.)	0.50

Les espèces les plus robustes et élevées sont : *Alliariaefolia* et ses var., *eriocarpa*, *lanceifolia*, *latifolia*, *latiloba*, *macrantha*, *rapunculoides* et *trachelium*. Le *C. pyramidalis* et sa var. à fl. blanches, sont des pl. hautement décoratives et qui portent, en de longs épis dressés, des myriades de fleurs lilas clair ou blanc pur; hauteur 1 à 1 m. $\frac{1}{2}$ suivant la cult.; fleurit de juillet en novembre, soleil, pleine terre, vieux murs, rochers, talus ensoleillés, gravières, etc.



Campanula Trachelium.

Cardamine alpina (Willd.)	0.50
» asarifolia (L.)	1.—
» chenopodifolia (Pers.)	1.—
» macrophylla (Willd.)	0.50
» pratensis (L.)	0.50
» » à fl. doubles	1.—
» resedifolia (L.)	1.—
» trifolia (L.)	0.50

	fr. c.
Carduncellus monspeliacus (All.)	1.50
Carduus defloratus (L.). <i>Chardon carmin</i> des Alpes	0.50
» nutans (L.)	0.50
Carex alba (Scop.), la douzaine 4 fr.	0.50
Propre à former des tapis gazonneux dans les lieux secs et arides, sous les arbres, dans les bois, etc.	
» Baldensis (L.). Très jolie graminée à épis blanc de neige; l'espèce la plus décorative du genre	0.50
» Darwini (Booth), de Magellan	1.50
Carex folliculata (Ell.)	0.50
» Hordeistychos (Vill.)	0.50
» japonica (Kunth.), fol. var.	0.50
» pediformis (C. A. M.)	0.50
» secalina (Wahl.)	0.50
» Vilmorini (Hort.)	0.50
» Xanthophysa (Wahl.)	0.50
Carlina acanthifolia (All.)	2.50
» acaulis (L.)	0.50

Le grand Chardon d'argent anime à l'automne les pâturages alp. et subalp. de ses grands capitules bordés de ligules blanches et luisantes, scarieuses, ce qui fait que la fleur peut être conservée pr. les bouquets d'hiver; fleurit abondamment d. les roc. au soleil ou en pl. terre. Sol profond; soleil.

Cassiope tetragona (Don). <i>Andromeda tetragona</i>	2.50
Castilleja sessiliflora (Pursh)	2.50
Caulophyllum thalictroides (Mich.)	2.50
Celsia , v. pl. méditerranéennes.	
Centaurea alpina (L.), à fl. jaune paille.	2.50
» axillaris (Willd.)	0.50
» dealbata (Willd.)	0.50
» Fernandi (Gren.)	0.50
» glastifolia (L.)	0.50
» Lugdunensis (Jord.)	0.50
» montana (L.), Grand bleuet vivace des montagnes.	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» » à fl. jaunâtres.	1.50
» » à fl. roses	1.50
» nervosa (Willd.)	0.50



Centaurea montana.

	fr. c.
C. orientalis (L.). Belles fl. jaunes	0.50
» phrygia (L.).	0.50
» præalta (Boiss.), pourpre foncé	0.50
» ragusina (L.).	0.50
» ruthenica (Lam.), fl. jaune paille	1.50
» rutifolia (Sib.).	0.50
» sibirica (L.).	0.50
» uniflora (All.).	1. —
Bonnes pl. rustiques et solides, très florifères; les très grandes esp. figurent parmi les plantes vivaces.	
Centranthus angustifolius (D. C.).	1. —
» nervosus (Moris), très petite espèce corse, rarissime	10 —
» ruber , v. pl. vivaces.	
» Sibthorpi (Heldr.).	0.50
Cephalaria alpina (Schräd.).	0.50
Grande Scabieuse jaune d'ocre, à formes archi- tecturales, croissant à l'o. ou au sol., excel- lente pour les grands rochers ou les lieux pit- toresques. Juillet-septembre.	
Cephalaria leucantha (Schräd.).	0.50
» radiata (Schult.).	0.50
» tatarica (Schräd.).	0.50
» transylvanica (Schräd.).	0.50
» Uralensis (Schräd.).	0.50
Cerastium album (Presl.).	0.50
» alpinum (L.).	0.50
» Boissieri (Gren.).	0.50
» banaticum (Kit.).	0.50
» carinthiacum (Vest.).	0.50
» decalvans (Schloss.), du Monténégro	1.50
» frigidum (Bieb.).	0.50
» glaciale (Gaud.).	1. —
» grandiflorum (W. K.).	0.50
» illyricum (Ard.).	0.50
» lanatum (Lam.).	0.50
» longirostre (Vich.).	0.50
» purpurascens (Adams).	0.50
» rigidum (Led.).	0.50
» strictum (L.).	0.50
» tomentosum (D. C.).	0.50
» trigynum (Vill.).	0.50
» villosum (Baumg.).	0.50
Pl. rampantes, à feuillage grisâtre, souvent ar- genté, à très nombreuses fl. blanches, en étoil- les; mai-juillet.	
Cerintho alpina (Kit.), feuillage glauque	0.50
Cheiranthus alpinus (L.), superbe cruci- fère basse, à grandes fl. jaunes; mai- juin	0.50
» mutabilis (L'Hér.).	1.50
Chelidonium Franchetianum (Prain.), pavot du Thibet	1.50
» laciniatum (Mill.).	0.50
» majus , fl. pl.	0.50
Cherleria sedoides (L.).	0.50
Chrysanthemum alpinum (L.), <i>Margue- rite des Alpes</i>	0.50
» anserinaefolium (Haussk.).	0.50
» caucasicum (Pers.).	0.50
» ceratophylloides (All.).	0.50
» coronopifolium (Vill.).	0.50

	fr. c.
C. latifolium (Willd.).	0.50
» maximum (Ram.).	0.50
» montanum (L.).	0.50
» rotundifolium (W. K.).	0.50
Chrysogonum virginianum (L.), petits soleils bas, à fl. jaune orangé vif; juin-octobre	1. —
Chrysopsis villosa (D. C.).	0.50
» var. Rutteri	0.50
Petites composées à f. grisâtres, à nombreux ca- pitules jaunes; soleil.	
Chrysosplenium alternifolium (L.), <i>Do- rine</i>	0.50
» glaciale (Fuss.).	0.50
» oppositifolium (L.).	0.50
» rosulare (S. N. K.).	0.50
» tetrandrum (Fries.).	0.50
Saxifragées à fl. jaunes enveloppées de bractées, à feuillage vert gai et luisant, formant de lar- ges touffes et propres à décorer les fissures fraîches et humides des rochers ombragés.	
Cimicifuga americana (Michx.).	1.50
» baternata (Miq.).	1.50
» cordifolia (Pursh.).	1.50
» elata (Nutt.).	1.50
» fœtida (L.), <i>Actæa fœtida</i>	0.50
» japonica (Sprgl.).	1.50
» racemosa (Nutt.), <i>Actæa racemosa</i>	0.50
Fleurs blanches en grappes ou en épis, gracieuses; feuillage ornemental; ombre, sous bois, etc.	
Cineraria , v. <i>Senecio</i>	
Circæa alpina (L.).	0.50
» cordata (Royle).	1.50
» Lutetiana (L.).	0.50
» mollis (S. et Z.).	1.50
» quadrisculcata (Maxim.).	1.50
Plants d'ombre et propres à garnir les sous-bois.	
Cirsium acaule (All.). Chardon rose sans tige	0.50
» arachnoideum (Bieb.).	0.50
» ciliatum (Bieb.).	0.50
» Eriophorum (Scop.).	0.50
» Erisithales (Scop.), jaune paille	0.50
» flavispina (Boiss.).	0.50
» Gerhardtii (Sch. Bip.).	0.50
» heterophyllum (All.), rose pourpre	0.50
» var. monstrosus	0.50
» Rhizocephalum (C. A. M.).	0.50
» Semenowi (Rgl.).	0.50
» setigerum (Led.).	0.50
» spinosisissimum (Scop.) <i>Chardon du Pe- tit-St-Bernard</i>	0.50
» Wallichii (D. C.).	1.50
Les Cirsium ou Cnicus sont des chardons d'or- nement très solides et florifères.	
Claytonia perfoliata (Don.).	0.50
» sibirica (L.).	0.50
Portulacées à fl. roses, propres à garnir les lieux frais et ombragés.	
Clematis alpina , v. <i>atragene</i>	
Clintonia borealis (Raf.), <i>Dracæna bo- realis</i>	2.50
Cochlearia danica (L.).	0.50
» grœnlandica (L.).	0.50

	fr. c.
<i>C. saxatilis</i> (L.), <i>Kernerasaxatilis</i> . . .	0.50
<i>Codonopsis ovata</i> (Benth.), <i>Glossocomia</i> <i>clematidea</i> . . .	0.50
» <i>Ussuriensis</i> (Rgl.) . . .	2.50
<i>Collinsonia canadensis</i> (L.) . . .	1.50
<i>Coluria potentilloides</i> (R. Br.) . . .	1.—
<i>Convallaria majalis</i> (L.), <i>muguet</i> . . .	0.50
» var. <i>major</i> . . .	0.50
» fol. var. . .	0.50
» <i>rosea</i> . . .	0.50
» <i>univittata</i> . . .	0.50
<i>Convolvulus cantabricus</i> (L.), <i>Liseron rose</i> <i>chair</i> . . .	0.50
<i>Coptis orientalis</i> (Maxim.) . . .	2.50
» <i>trifolia</i> (Salisb.) . . .	2.50
<i>Coreopsis rosea</i> (Nutt.), fl. roses . . .	1.50
Pour les autres <i>Coreopsis</i> , v. pl. vivaces.	
<i>Cornus canadensis</i> (L.) . . .	2.50
» <i>suecica</i> (L.) . . .	2.50



Cornus canadensis.

<i>Coronilla atlantica</i> (Boiss.) . . .	1.—
» <i>cappadocica</i> (Boiss.) . . .	2.50
» <i>coronata</i> (L.) . . .	1.—
» <i>Emerus</i> (L.) . . .	1.—
» <i>glauca</i> (L.) . . .	2.50
» <i>Libanotica</i> (Boiss.) . . .	2.50
» <i>montana</i> (Scop.) . . .	0.50
» <i>varia</i> (L.) . . .	0.50

Cette dernière est à fl. rose ou lilas et blanc, très jolies, mais la pl. est envahissante; très propre à garnir les lieux stériles et ensoleillés.

<i>Cortusa Matthioli</i> (L.) . . .	0.50
» <i>grandiflora</i> . . .	1.50
» <i>pubens</i> (S. N. K.) . . .	1.50

Les Cortuses, gracieuses primulacées à fl. carmin, recherchent un sol dépourvu de calcaire et l'ombre.

<i>Corydalis bulbosa</i> (D. C.) . . .	0.50
» <i>bracteata</i> (Pers.) . . .	2.50
» <i>cava</i> , v. <i>tuberosa</i> . . .	
» <i>glauca</i> (Pursh.) . . .	0.50
» <i>Halleri</i> (Willd.) . . .	0.50
» <i>Kolpakowskiana</i> (Rgl.) . . .	2.50
» <i>Ledebouriana</i> (Kar. et Kir.) . . .	2.50
» <i>lutea</i> (D. C.). La douzaine 2 fr.) . . .	0.50



Cortusa Matthioli.



Corydalis cava.



Corydalis lutea.

	fr. c.
<i>Corydalis nobilis</i> (Pers.) . . .	1.50
» <i>ochroleuca</i> (Koch), jaune-pâle . . .	0.50
» <i>ophiocarpa</i> (Hook.) . . .	2.50
» <i>pallida</i> (Pers.) . . .	2.50
» <i>rutæfolia</i> (D. C.) . . .	0.50
» <i>Scouleri</i> (Hook.) . . .	2.50
» <i>tomentella</i> (Frauchet) . . .	5.—
» <i>tuberosa</i> (D. C.), la douz. 2 fr.) . . .	0.50
» <i>verticillaris</i> (D. C.) . . .	2.50

fr. c.

Les Corydales, ou Fumetères vivaces, sont des pl. du premier printemps, tout au moins leurs espèces tubéreuses, qui recherchent l'ombre et les sous-bois. Le *C. lutea*, aux fl. d'un jaune brillant, fleurit d'avril en novembre. Planté dans un mur au soleil ou à l'ombre, il s'y propage rapidement. C'est l'une des plus gaies décorations qu'on puisse donner à une rocaille et à une muraille qu'on veut animer de fleurs. Il envahit rapidement mais on tolère bien volontiers cet envahissement.

Cotula squalida (Hook.) Pl. cespiteuse et rampante, à très gracieux feuillage de fougère 0.50

Cotyledon (*Umbilicus*) **aizoon** (Fenzl.) 0.50

» **chrysanthus** (Boiss.) 0.50

» (*Echeveria*) **amœnum** (de Smet) 0.50

» (*Umbil.*) **ciliolata** (Rgl.) 2.50

» » **globulariæfolia** (Bak.) 2.50

» » **Libanotica** (Labil.) 2.50

» » **linifolius** (Rupr.) 5.—

» » **malachophylla** (Pall.) 2.50

» » **oppositifolia** (Led.) 2.50

» » **Pestallozæ** (Boiss.) 2.50

» » **platyphilla** (Schrenk) 2.50

» » **Semenowi** (Rgl.) rouge-vermillon 1.50

» » **Sempervivum** (Bieb.) rouge-vermillon 2.50

» » **spinosa** (L.) très jolie rosette épineuse 1.—

» » **turkestanica** (Rgl.) 2.50

Pl. voisines des *Sempervivum*, à rosettes fermes et serrées, formant de gracieuses touffes qu'on place en plein soleil.

Crenularia eunomioides (Boiss.) 2.50

Crepis aurea (Cass.), fl. brune 0.50

» **incarnata** (Tausch.) 2.50

» **jubata** (Koch) 2.50

» **pygmæa** (L.) 0.50

Crocus, voir pl. bulbeuses.

Crucianella stylosa (Trin.) 0.50

» **var. carmin vif** 1.—



Crucianella stylosa.

Crythmum maritimum (L.) 0.50

Cyananthus lobatus (Wall.) 2.50

Cyclamen.

fr. c.

I. A FLORAIISON PRINTANIÈRE :

C. Atkinsi (Moore) 1.—

» **Coum** (Mill.) Janvier-mars 1.50

» » à fl. blanches 2.50

» **ibericum** (Goldie) 2.50

» **libanoticum** (Hild.) 1.50

» **repandum** (Sibt. et Sm.) *C. vernum* 1.—

» » à fl. blanches 2.50

II. A FLORAIISON AUTOMNALE :

C. cilicium (Boiss.) 1.50


» **europæum** (L.) *Violette des Alpes* 0.50

» » à fl. blanches 1.50

» **græcum** (Link) 2.50

» **hederæfolium**, v. *neapolitanum*.

» **neapolitanum** (Ten.) 0.50



Cyclamen neapolitanum.

Cynanchum, v. *Vincetoxicum*.

Cynoglossum nervosum (Benth.) 1.—

Cypripedium, v. *Orchidées terrestres*.

Daphne, v. arbustes.

Decumaria barbara (L.) 1.—

Delphinium alpinum (W. K.) 1.—

» **cachemirianum** (Royle) 0.50

» **elatum** (L.) *Pied d'alouette des Alpes* 0.50

» **fissum** (W. K.) 1.—

» **grandiflorum** (L.) Le plus beau bleu imaginable 0.50

» **sulfureum** (Boiss.), jaune-clair 1.—

» **tyrolense** (Kern) 1.—

» **triste** (Fisch.) 1.—

Les Pieds d'alouettes ou dauphinelles des montagnes sont de belles pl. vivaces propres à décorer les plates-bandes, le bord des massifs d'arbres, les grands rochers; le *D. elatum* recherche l'ombre ou le mi-sol., tandis que le superbe *grandiflorum* veut le soleil. Pour les autres esp. ou variétés, v. pl. vivaces.

	fr. c.
Dentaria (<i>Cardamine</i>) bulbifera (L.)	0.50
» digitata (Lam.)	0.50
» diphylla (Mich.)	2.50
» enneaphylla (Guld.)	2.50
» glandulosa (W. K.)	2.50
» intermedia (Sond.)	2.50
» Killiasi (Brüg.)	2.50
» pinnata (Lem.)	0.50
» polyphylla (W. K.)	1.—
Belles Crucifères aux grandes fl. lilas, blanches, rose-clair ou jaunâtre, croissant sous bois.	



Dentaria digitata.

Dianthus (œillets).I. ESPÈCES MONTAGNARDES OU ALPINES, NAINES
ET CESPITEUSES :

Dianthus alpestris (Sternb.), très parfumé; rose-clair	0.50
» alpinus (L.), rose très vif, pl. très basse	0.50
» arenarius (L.)	0.50
» atrorubens (All.)	1.50
» bicolor (Bieb.)	0.50
» brevicalyx (Beck)	1.50
» brevicaulis (Fenzl.)	2.50
» cæsius (Smith)	0.50
* » callizonus (Schott et Kot.)	2.50
» campestris (Bieb.)	0.50
» deltoides (L.). Excellent pour tapisser rochers ou former des bordures.	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» glaucus (L.)	0.50
» Falconeri (Edg.), fl. blanches; Hima- laya	2.50
» fragrans (Bieb.)	0.50
* » Freynii (Vandas)	2.50
» frigidus (Zucc.)	1.—
» gallicus (Pers.), très parfumé; fleurit de sept. en déc.	0.50
* » glacialis (Hænk.)	1.—
» glutinosus (Boiss.)	0.50
* » granaticus (Jord.)	2.50
» heptaneurus (Gris.)	0.50
» Hœlzeri (Wink.)	1.50



Dianthus deltoïdes.

	fr. c.
D. hungaricus (Pers.), très parfumé	0.50
* » inodorus (Stend.) var. acaulis	2.50
» integer (Vis.)	0.50
» monspessulanus (L.), fl. élégante, lilas, parfumée; août-sept.	0.50
» montanus (Bieb.)	0.50
» Mussini (Horn.)	0.50
» neglectus (Lois.). Œillet bleu du Dau- phiné	1.—
* » nitidus (W. K.)	2.50
» petræus (W. K.)	0.50
» Plumarius (L.), très parfumé, florifère, envahissant rapidement et propre à garnir les talus arides, les lieux secs et au soleil; mai-octobre	0.50
» Plumarius var. et pl. vivaces.	
» » × cæsius	1.—
» » × Seguieri	1.—
» polycladus (Boiss.)	2.50
» pulchellus (Pers.)	1.—
» Scheuchzeri (Gris.)	0.50
» serotinus (W. K.)	0.50
» » var. moschatus	0.50
» speciosus (Reich.), voisin du superbus	0.50
* » spinosus (Desf.) <i>Acanthophyllum spi- nosum</i>	5.—
» squarrosus (Bieb.)	0.50
» Sternbergi (Sieb.) forme de monspes- sulanus	0.50
» suavis (Willd.)	0.50
* » subacaulis (Vill.), très nain	1.—
» superbus (L.), élégant et parfumé	0.50
» sylvestris (Wulf.)	0.50
* » » à fl. blanches	5.—
» » acaulis	2.50
» » orophylus (Jord.)	0.50
* » tergestinus (Reich.)	2.50
» viscidus (Bor. et Chaub.)	0.50
» Wimmeri (Wich.), voisin de superbus	0.50
» Zonatus (Fenzl.)	0.50

Les esp. marquées d'une * sont les plus délicates et exigent une niche ensoleillée et bien drainée et un sol maigre et pierreux. Les autres vont en pl. terre comme dans la roc., au soleil ou au demi-sol. Tous fleurissent abondamment, de mai-juin en automne.



Dianthus superbus

II. ESPÈCES MONT. OU DES PLAINES ET ROCHERS
DONT LES TIGES SONT NON COUCHÉES ET QUI
FORMENT DES TOUFFES DRESSÉES :

	fr. c.
Dianthus ambiguus (Panc.)	0.50
» aridus (Gris.), à fl. jaune-clair	1.—
» Armeria (L.), peut croître sous bois, à l'ombre	0.50
» asper (Willd.)	0.50
» Balbisii (Ser.)	0.50
» Bannaticus (Henf.)	0.50
» barbatus (L.). <i>Œillet des poètes</i>	0.50
» Boissieri (Wilk.)	2.50
» calocephalus (Boiss.)	0.50
» capitatus (D. C.)	0.50
» Carthusianorum (L.), rose très vif	0.50
» Caryophyllus (L.)	0.50
» cinnabarinus (Sprun.)	2.50
» congestus (Bor.)	0.50
» cossicus (Fisch.)	0.50
» Courtoisi (Reich.)	1.50
» cruentus (Gris.), rouge-vermillon ardent; l'un des meilleurs.	0.50
» giganteiformis (Borb.)	0.50
» giganteus (d'Urv.)	0.50
» Knappii (Aschers.), jaune-paille	1.50
» Liburnicus (Bartl.)	0.50
» pallens (Sib. et Sm.)	0.50
» papillosus (Vis.)	1.50
» pinifolius (Sm.)	0.50
» Pontederæ (Kern.)	0.50
» pruinosis (Boiss.)	0.50
» puberulus (Simk.)	0.50
» Requienii (Gr. God.)	0.50
» sabulorum (Henf.)	0.50
» sanguineus (Vis.)	0.50
» Seguieri (Vill.)	0.50
» strictus (Sib. et Sm.)	0.50
» suffruticosus (Willd.)	0.50
» sylvestris , Wulf.	0.50
» tenuiflorus (Gris.)	0.50
» tenuifolius (Schur.)	0.50
» trifasciculatus (W. K.)	0.50
» versicolor (Fisch.)	0.50

fr. c.

Ces œillets sont tous très florifères et préfèrent le soleil à l'ombre, un sol plutôt léger; juin-octobre.

Dicentra canadensis (Walp.)	1.—
» cucullaria (Bern.)	1.—
» eximia (Torr.)	0.50
» formosa (Walp.)	1.50

Pl. d'ombre ou demi-ombre; *D. eximia* est un petit *Diclytra* à fl. carmin vif, très décoratives, gracieuses, qui fleurit abondamment d'avril en novembre; demi-ombre ou soleil.

Diclythra, v. *Dicentra* et pl. vivaces.

Dictamnus, v. pl. vivaces.

Digitalis ambigua (Murr.). <i>D. grandiflora</i>	0.50
» ferruginea (L.)	0.50
» grandiflora , v. <i>D. ambigua</i> .	
» lævigata (W. K.)	0.50
» lanata (Ehrh.)	0.50
» lutea (L.)	0.50
» media (Roth.)	0.50
» purpurascens (Roth)	0.50
» purpurea (L.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» sibirica (Lindl.)	0.50
» Thapsi (L.)	2.50
» viridiflora (Lindl.)	0.50

Le *D. ambigua*, à grandes fl. jaune d'ocre, est précieux pour les rochers (demi-ombre) et la pl. terre; le *lutea*, à petites fl. jaune paille très nombreuses, réussit n'importe où et fleurit tout l'été. Toutes les *Dig.*, sauf *Thapsi*, sont de cult. très facile.



Digitalis ambigua.

Dioscoræa pyrenaica (Boub.)	5.—
Esp. petite et rarissime, à rameaux traînant sur le sol; ombre ou demi-ombre.	
» caucasica , v. pl. grimpantes.	
Diphylleia cymosa (Mich.)	2.50
Diplacus glutinosus (Nutt.). <i>Mimulus glutinosus</i>	2.50
Diplopappus , v. <i>Aster</i> .	
Dipsacus asper (Wall.)	0.50
» japonicus (Miq.)	0.50
Disporum (Prosarthes) Hookeri (Nichols.)	2.50

	fr. c.
Dodecatheon giganteum (Hort.)	1.50
» Hendersoni (Hort.)	1.50
» integrifolium (Michx.)	0.50
» Jefferayi (Hort.)	1.—
» Mædia (L.). <i>Gyroselle</i> ou <i>Herbe aux</i> <i>douze dieux</i>	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» » v. alpina	1.50
» » v. elegans	1.50
» » v. pauciflora	1.50
» » v. splendens	1.50

Primulacées dont les fl. ressemblent à celles des
Cyclamen, très élégantes, rose carmin ou clair,
parfois blanc pur; demi-ombre; sol profond
et frais; mai-juin.



Dodecatheon Mædia.

Doronicum austriacum (Jacq.)	0.50
» altaicum (Pall.)	1.50
» carpetanum (Boiss.)	1.50
» caucasicum (Bieb.)	0.50
» Columnæ (Ten.)	0.50
» Draytonense (Hort.)	0.50
» Hungaricum (Reich.)	0.50
» macrophyllum (Fisch.)	0.50



Doronicum caucasicum.

	fr. c.
D. Orphanides (Boiss.)	1.50
» Pardalianches (L.). <i>Mort aux Pan-</i> <i>tères</i>	0.50
» plantagineum (L.)	0.50
» » v. excelsum (Brown.)	0.50

Soleils jaunes, apparaissant au printemps et très
propres à garnir les lieux frais et demi-om-
brés; ce sont de belles marguerites or ou
orangé qui fleurissent avec abondance; le D.
caucasicum fleurit en mars-avril. Pl. terre ou
roc; cult. facile.

Dorycnium herbaceum (Vill.)	1.—
--	-----

Pour les autres Dorycn. voir arbustes et v. pl.
exotiques.

Draba.

I. ESPÈCES A FLEURS JAUNES :

Draba affinis (Hort.)	0.50
* » aizoides (L.)	0.50
» » v. elongata	0.50
* » aizoon (Wahl.)	0.50
* » armata (Schott.)	0.50
» aurea (Wahl.)	0.50
» bruniæfolia (Stev.)	0.50
» dicranoides , v. rigida	0.50
» Haynaldi (Stur.)	0.50
* » hispanica (Boiss.)	0.50
» Hoppeana (Reich.)	0.50
» lasiocarpa , v. Aizoon	0.50
* » olympica (Sibt.)	1.—
» repens (Bieb.) rampant; fl. jaune yif	0.50
» rigida (Willd.)	0.50
» Sauteri (Hoppe.)	0.50
» scabra (C. A. M.), très belle esp. à f. de genévrier	1.—
» tridentata (D. C.)	0.50

Les esp. marq. d'un * sont plus spécialement
murales et saxatiles.



Draba aizoides.

II. ESPÈCES A FLEURS BLANCHES :

Draba alpina (L.), de Scandinavie	0.50
» altaica (Bunge.)	0.50
» arabisans (Mich.)	0.50
» borealis (D. C.)	0.50

	fr. c.
D. carinthiaca (Hoppe)	0.50
» chamæjasme (Gris.)	0.50
» ciliata (Scop.)	0.50
» Dedeana (Boiss.)	0.50
» Fladnizensis (Wulf.)	0.50
» frigida (Saut.)	0.50
» glacialis (Adans.)	0.50
» Gigas , v. <i>Arabis carduchorum</i> .	
» hirta (Jacq.)	0.50
» incana (L.)	0.50
» lapponica (Willd.)	0.50
» laxa (Lindb.)	0.50
» nivalis (Willd.)	0.50
» streptocarpa (A. Gray)	0.50
» tomentosa (Wahl.), feuillage blanc d'argent	1. —

Cette dernière esp. est murale et saxatile et préfère le calcaire.

III. ESPÈCES A FLEURS VIOLETTES OU LILAS ROSE :

Draba pyrenaica (L.) <i>Petrocallispyrenaica</i>	1.50
Pl. saxatile et murale; calcaire; soleil.	
Dracocephalum alpinum (Turcz.)	0.50
» austriacum (L.)	1. —
» fruticulosum (Steph.)	1. —
» grandiflorum (L.)	1. —
» nutans (L.)	0.50
» peregrinum (L.)	1. —
» Ruprechtii (Rgl.)	0.50
» Ruyschiana (L.)	0.50
» <i>var. japonicum</i>	1.50
» speciosum (Benth.)	1. —
» stamineum (K. et K.)	1. —
» thymiflorum (L.)	1. —

Labiées à fl. bleues, basses, touffues, fleur. en mai-juillet-août; soleil.



Dracocephalum Ruyschiana

	fr. c.
Drummondia mitelloides , v. <i>Mitella pentandra</i> .	
Dryas Drummondii (Rich.)	1. —
» integrifolia (Vahl.)	5. —
» lanata (Stein). <i>D. nivea</i> , Kern	2.50
» octopetala (L.). <i>Dryade ou thé suisse</i>	0.50
» tenella , v. <i>integrifolia</i> .	

Charmantes rosacées rampantes, à beau feuillage et à fl. d'églantines. Le *D. octopetala* est l'une des meill. pl. de rocailles; elle tapisse les rocs ou le sol et étale au soleil ses rameaux frais et gracieux et sa belle églantine blanche au cœur d'or. Mai-juillet; refleurit souvent à l'automne.



Dryas octopetala.

Drypis spinosa (L.)	0.50
Pl. touffue et naine, épineuse et rampante, à fl. blanches.	
Duchesnea fragarioides , v. <i>Fragaria indica</i> .	
Echinacea , v. pl. vivaces.	
Echinops , v. pl. vivaces.	
Echiumpetræum , v. <i>Moltkia petræa</i> .	
Edelweiss , v. <i>Leontopodium alpinum</i> .	
Edrayanthus , v. <i>Hedraëanthus</i> .	
Elymus arenarius (L.). Graminée d'orné à verd. bleuâtre	0.50
Empetrum nigrum (L.)	1.50
» rubrum (Vahl.) de Magellan	5. —

Charmants arbustes alpins ou antarctiques, au feuillage fin et persistant, aux rameaux traînants, étalés sur le sol, très élégants; baies noires ou rouges; mi-ombre.

Eomecon chionantha (Hance)	1.50
Gracieuse papavéracée à fl. blanches, à feuillage élégant, qui recherche les lieux humides et frais.	
Epheda helvetica (C. A. M.)	2.50
Pl. murale et saxatile rare et de grande valeur ornementale. C'est une sorte de Prêle (<i>Equisetum</i>) appartenant aux Gnétacées, voisine des Conifères, et dont les fruits, une baie rouge corail, sont assez semblables à ceux de l'If; soleil.	
Epigæa repens (L.)	5. —
Epilobium abyssinicum (Höchst.), grand des fl. carmin	0.50

	fr. c.
Epilobium alpinum (L.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» alsinifolium (Vill.)	0.50
» angustifolium (L.)	0.50
Fl. rose et carmin très vif, en longs épis dressés; feuilles de saules; 1 ^m à 2 ^m de hauteur; mai-août; mi-ombre ou ombre.	
» angustifolium à fl. blanches	0.50
* » brevipes (Hook.)	1.50
» Dodonæi (Vill.), grandes fl. carmin et rose; soleil	0.50
* » erubescens (Haussk.)	1.50
» Fleischeri , v. Dodonæi	
* » glabellum (Forst.)	1.50
* » Hectori (Haussk.)	1.50
» hirsutum (L.)	0.50
» » à fleurs blanches	1.—
» japonicum (Haussk.)	0.50
» latifolium (L.), sup. pl. à très gr. fl. rose carmin; feuil. bleuâtres	1.50
* » linnæoides (Hook.) à feuilles de <i>Linnæa</i>	1.50
* » luteum (Pursh), à fl. jaune clair	2.50
* » melanocaulon (Hook.)	1.50
* » microphyllum (Rich.)	1.50
* » nummulariæfolium (Cunn.)	1.50
* » pedunculare (Cunn.)	1.50
* » pubens (A. Kirk.)	1.50
» roseum (Schrab.)	0.50
» rosmarinifolium (Hænke), rose carmin et clair	0.50

Les esp. marquées d'un * sont plus délicates que les esp. du pays; elles réclament une posit. abritée ou une légère couverture car, sauf luteum, elles proviennent toutes de la Nouvelle-Zélande. Toutes les esp., sauf *Dodonæi* et *rosmarinifolium*, demandent de la fraîcheur et la mi-ombre. Mai-octobre.



Epilobium angustifolium.

Epimedium alpinum (L.), rouge-brun	0.50
» colchicum , v. pinnatum	
» diphyllum , v. Aceranthus	
» hexandrum , v. Vancouveria	
» Ikariso (Sieb.), blanc-rose	1.50
» macranthum (Morr.), blanc pur	1.—

	fr. c.
E. Musschianum (Morr.), blanc terne	1.50
» ochroleucum , v. Perraldianum	
» Perraldianum (Coss.), jaune soufre	1.—
» pinnatum (Fisch.) jaune vif	1.—
» rubrum (Morr.), rouge très vif	1.—
» » v. grandiflorum	2.50
» sulfureum , v. Perraldianum	
» versicolor (Morr.), rose et jaune	1.50
» violaceum (Morr.), violet foncé	5.—
Les <i>Epimèdes</i> sont d'entre les meilleures pl. d'ombre; ils font admirablement sous bois, fleurissent en avril-mai et offrent une verdure merveilleuse toute l'année durant.	
Eranthis cilicica (Boiss.)	0.50
» hyemalis (L.)	0.50
Petits <i>Hellébores</i> jaunes, fleur. sous bois ou de l'herbe, à l'o. ou au soleil, de fin janvier à mars.	
Erianthus Ravennæ (Beauv.) Graminée ornement	0.50
Erica carnea (L.) <i>Bruyère rose des Alpes</i>	1.—
» » à fl. blanches	1.50
» ciliaris (L.)	1.50
» cinerea (L.)	1.50
» herbacea , v. carnea	
» multiflora (L.)	1.50
» stricta (Don.), fl. rose vif, nombreuses; automne	1.50
» tetralix (L.)	1.50
» vagans (L.)	1.50
» vulgaris , v. <i>Calluna vulgaris</i>	

L'*E. carnea*, la plus rustique de toutes, donne de janvier à mars-avril, une abondance de fl. rose carmin; soleil ou mi-ombre; c'est la seule esp. qui supporte bien le calcaire; les autres exigent une terre siliceuse (terreau de feuilles ou terre dite de bruyère, elles vont bien dans le sphagnum.



Eranthis hyemalis.

Erigeron alpinus (L.) <i>Vergerette des Alpes</i>	0.50
» armerifolius (Turcz.)	0.50
» aurantiacus (Rgl.), rouge vermillon; du Turkestan	0.50
» » v. splendens	0.50
» bellidifolius (Mühl.)	0.50
» cæspitosus (Nutt.)	0.50
» caucasicus , v. pulchellus	
» compositus (Pursh.), à f. divisées	0.50
» Coulteri (Porter.)	0.50
» flagellaris (A. Gray)	1.—
» glabellus (Nutt.)	0.50



Erigeron glabellus.

	fr. c.
E. glabratus (Hoppe)	0.50
» glandulosus (Poir.)	1.—
» glaucus (Gawl.)	0.50
» grandiflorus (Hook.)	1.—
» hybridus roseus (Hort.)	1.50
» hyssopifolius (Mich.)	1.—
» leiomorus (A. Gray)	0.50
» macranthus (Nutt.)	0.50
» mucronatus (D. C.)	0.50
» Muelleri (Lund.)	0.50
» multifidus (sp. nov.)	1.—
» multiradiatus (Benth.)	0.50
» neglectus (Kern.)	0.50
» Philadelphicus (L.), fl. nombreuses, beau rose; mai-novembre	0.50
» pulchellus (D. C.)	0.50
» quercinus (D. C.), variété de philadel- phicus	0.50
» salsuginosus (A. Gray)	1.—
» speciosus (D. C.), grandes fl. violet foncé; été	0.50



Erigeron speciosus

	fr. c.
E. strigosus (Mühl.)	1.—
» trifidus (Schlecht.)	1.—
» uniflorus (L.)	0.50
» VahlII (Gaudich.)	1.—
» Villarsii (Bell.)	0.50

Charmantes composées propres à garnir les rochers ou les plates-bandes; soleil ou mi-soleil; été et automne.



Erigeron salsuginosus

Erinacea pungens (Boiss.)	10.—
Erinus alpinus (L.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » v. carmineus	1.50
» hirsutus (Lap.)	0.50
» hispanicus (Pers.)	1.50
Excellentes pl. murales et saxatiles à fl. roses, violettes ou blanches; mai-juin.	
Eriogonum umbellatum (Torr.)	0.50
Eriophorum , v. pl. paludéennes.	
Eriophyllum cæspitosum (Dougl.)	0.50
» confertifolium (A. Gray)	0.50
» trifidum (sp. nov.)	2.50
Eritrichium nanum (Schräd.) <i>Roi des Alpes</i>	5.—
Le roi des Alpes est de cult. extrêmement difficile. Il lui faut la position horizontale, c'est-à-dire une pente de rocher ou de muraille, le levant ou le couchant et un sol très maigre. Pour la cult. en pots il faut tenir très sec, l'air restant humide. Nous le cultivons pour la vente dans le sable granitique et le tenons très sec l'hiver.	
* Erodium absinthoides (Willd.) <i>Sibthorpianum, olympicum</i>	2.50
» chamædryoides (L'Hér.), <i>Reichardii</i>	2.50
» cheilanthifolium , v. <i>trichomanæfolium</i>	
* chrysanthum (Boiss.)	5.—
» corsicum (Leman)	2.50
» daucoides (Boiss.), à f. de carottes et à fl. carmin	1.—
» glandulosum , v. <i>macradenum</i>	
» hymenodes (L'Hér.)	1.—
* macradenum (L'Hér.)	1.—
* macradenum × trychomanæfolium	2.50
» macrophyllum (Hook.), bisannuel, de Californie	1.—

	fr. c.
Erodium Manescavi (Coss.), belles grandes fl. carmin vif.	1. —
» olympicum , v. absinthoides.	
» pelargoniiflorum (Boiss.)	1. —
» pelargoniiflorum × geoides	2.50
» Reichardii , v. chamædryoides.	
» Sibthorpium , v. absinthoides.	
* » supracanum (L'Hér.), pl. rare d'Espagne.	5. —
* » trichomanæfolium (L'Hér.)	2.50

Charmantes géraniacées très florifères, dont plusieurs ont des fl. de *Pelargonium* élégantes; les esp. marquées du * sont celles qui préfèrent la muraille ou une fente de rochers, au soleil, sauf *Manescavi* — la plus brillante de toutes, — qui va fort bien à l'ombre ou à mi-ombre. Mai-octobre, même novembre.



Erodium Manescavi.

Eryngium alpinum (L.), <i>chardon bleu</i> , <i>Panicaut des Alpes</i> , <i>Reine de l'Alpe</i> , etc. ¹	1. —
» amethystinum (L.)	0.50
» Bourgati (Gouan)	0.50
» giganteum (Bieb.)	0.50
» glaciale (Boiss.)	5. —
» multifidum (S. S.)	1. —
» rigidum (Lam.)	1. —
» serbicum (Panc.)	5. —
» Rothenbergi (Hort.)	1. —
» spino-alba , v. rigidum	

Voir p. autres espèces, pl. vivaces ou pl. exotiques.

Les *Panicauts* sont d'entre les plus ornementales des pl. alpines. Le *Panicaut des Alpes* (*Blue thistle* des Anglais) est une merveille végétale; la collerette admirablement ouvragée, en filigrane et de teinte bleu-violet, qui porte le chaton de fleurs, est puissamment artistique. Toute la partie supérieure de la pl. (haute de près d'un mètre), se teinte en bleu-violet et conserve cette couleur pendant près de six semaines (juin-juillet). La multiplication de

¹Le véritable *E. alp.* est très rare dans les cultures; on a publié sous ce nom et vendu presque partout plusieurs espèces bien inférieures.

	fr. c.
cette pl. est lente et difficile, car les graines germent capricieusement; mi-soleil; sol profond, ni trop lourd ni trop léger; fait bien dans les gazons. Les <i>E. amethystinum</i> , des Alpes orientales, et <i>Bourgati</i> , des Pyrénées, sont jolis, bien que moins décoratifs. Tous bleuissent leurs feuillages au moment de l'anthèse.	
Erysimum Helveticum (D. C.)	0.50
» Kotschyannum (Gay)	0.50
» ochroleucum (D. C.), pl. superbe, à fl. jaune-clair	0.50
» pulchellum (Willd.), pl. naine et ramp., à fl. jaune d'or	0.50
» pumilum (Gaud.)	0.50
» purpureum (Auch.)	1.50
» thyrsoidesum (Boiss.)	2.50
» transylvanicum (Schur.)	0.50
» Wahlenbergii (Sim.)	0.50
» Wittmanni (Zavatsk.)	0.50

Les *Velars* sont des *Crucifères* à floraison prolongée et brillante et aimant tous le soleil et la rocaille.



Erysimum pulchellum.

Erythræa Centaurium (L.), <i>Petite Centaurée</i> (annuelle)	0.50
» diffusa (Woods).	2.50
Pl. cespit. et rampante, à grandes fl. rose clair; mi-soleil.	

Erythronium, v. pl. bulbeuses.

Eunomia cordata, v. *Aethionema cordatum*.

Euphorbia altissima (Boiss.)	1. —
» Bornmülleri (Haussk.)	1. —
» capitulata (Reich.)	1. —
» Gerardiana (Jacq.), feuillage bleuâtre	0.50
» Kotschyana (Fenzl.)	1. —
» myrsinites (L.)	1. —

Pl. à longs rameaux traînants, garnis de f. serrées et bleuâtres, disposées en spirales; pl. méditerranéenne très ornementale, précieuse pour la décoration des rochers ensoleillés, des pentes arides et des moraines stériles.

» robusta (Greene)	1. —
» Sikkimensis (Boiss.)	1. —

	fr. c.
Euonymus , v. arbustes.	
Facchinia (Alsine) lanceolata (Reich.)	1.—
Fagopyrum cymosum (Meissn.)	1.—
Falcaria latifolia (Koch.)	0.50
» scioides (Asch.), pl. envahissante, à joli feuillage denté en scie	0.50
Farsetia clypeata (R. Br.)	0.50
» lunarioides (R. Br.)	0.50
Ferula Assa-fœtida (L.). <i>Asa-fetida</i>	2.50
» communis (L.), très beau feuillage divisé	1.—
» Ferulago (L.)	1.—
» glaucæ (L.)	1.—
» Narthex (Boiss.)	2.50
» orientalis (L.), très beau feuillage divisé	1.—
» thyrsiflora (Sib. et Sm.)	1.—

Les Férules sont des pl. remarquables par la majesté de leur port, leurs amples proportions et par la beauté du feuillage. Elles aiment un sol profond, une exposition abritée contre les trop grands froids et contre le trop fort soleil.



Ferula communis.

Festuca alpina (Gaud.)	0.50
» amethystina (L.)	0.50
» crinum ursi (Ram.), la douz. 2 f.	0.50
Le crin d'ours est un gazon oriental très fin, vert foncé, ne s'élevant pas au-dessus de 10 cent. et qu'on ne fauche jamais; il supporte le sec et la chaleur; propre à former des bordures.	
» glaucæ (Lam.), herbe bleuâtre.	0.50
» Halleri (All.)	0.50
» pulchella (Schrud.)	0.50
» punctoria (Sibt.)	0.50
» valesiaca (Gaud.)	0.50
» violacea (Schl.)	0.50
Ficaria grandiflora (Rob.), grande Ren. d'or; premier printemps	0.50
» ranunculoides , fl. pl. Petite fl. jaune brillant, très pleine; mars	0.50
Filipendula , v. <i>Spiræa</i> .	

	fr. c.
Fragaria alpina (Steud.)	0.50
» collina (Ehrh.), fraisier étoilé	0.50
» Daltoniana (Gay), jolie fraise himalayenne	1.—
» elatiør (Ehrh.)	0.50
» grandiflora (Ehrh.), var. tricolor	0.50
» indica (Andr.), pl. très sarmenteuse, à fl. jaunes. La douz. 2 francs	0.50
» lucida (Vilm.)	0.50
» monophylla (Duch.)	0.50
» roseiflora (Boulay), à fl. roses	0.50
» Sandwichensis (Hort.)	0.50
» semperflorens (Duch.)	0.50
» vesca (L.), fraisier des bois. La douz. 2 francs	0.50

Francoa, v. pl. vivaces.

Frankenia, v. pl. non rustiques, p.

Fritillaria, v. pl. bulbeuses.

Fuchsia pumila (Hort.), esp. rustique très naine et jolie. 1.50

Funkia, v. pl. vivaces.

Gagea Liotardi (Schult.) 1.—

» **lutea** (Schult.) 1.—

Galanthus, v. pl. bulbeuses.

Galax aphylla (L.) 2.50

Galium alpinum (Schur.) 0.50

» **Baldense** (Sprgl.) 0.50

» **boreale** (L.) 0.50

» **majellense** (Ten.) 0.50

» **rotundifolium** (L.) 0.50

» **tyrolense** (Willd.) 0.50

Gaultheria procumbens (L.), *Thé du Canada* 2.50

» **Shallon** (Pursh.) 2.50

Pl. de terre siliceuse, craignant la chaux et le trop grand soleil.

Gaya pyrenaica (Gaud.) 2.50

» **simplex** (Gaud.) 1.—

Genista, v. arbustes.

Gentiana.

I. GROUPE ACAULIS (L.).

Ce type renferme quatre espèces parfaitement distinctes, qui sont ¹:

Gentiana alpina (Vill.)	2.50
» angustifolia (Vill. non Mich.)	1.50
» Clusii (Perr. et Song.)	1.50
» Kochiana (Perr. et Song.)	2.50

La 2^{me} et la 3^{me} esp. sont calcicoles, tandis que la 4^{me} craint la chaux et exige un sol dépourvu de calcaire. Le *Gentiana acaulis* des jardins (*Gentianella* des Anglais) est le *G. angustifolia* introduit dans le XVI^{me} siècle en Angleterre et modifié par la culture. Le *G. angust.* est la plus belle espèce du genre avec le *Clusii*; ces deux pl. réussissent dans tous les terrains mais sont plus belles dans le calcaire. Mi-soleil. Avril-mai.

» **acaulis**, à fl. blanches, très rare 10.—

¹ Voir à ce sujet : Flore colorée de poche, par H. Corréon, p. 104 et 105.



Gentiana acaulis des jardins.

II. GROUPE DES ESPÈCES ÉLEVÉES, A GROSSES RACINES CHARNUES :

	fr. c.
Gentiana Burseri (Lap.)	5. —
» lutea (L.), <i>Grande Gent. jaune</i>	2.50
» pannonica (Scop.)	2.50
» punctata (L.)	2.50
» purpurea (L.)	2.50

Il faut à ce groupe un sol profond et poreux (calcaire pour lutea), une exposition au mi-soleil; ne jamais entamer ni couper les racines lors du repiquage ou de la transplantation.



Gentiana lutea.

III. ESPÈCES BASSES ET CESPITEUSES :

Gentiana angulosa (Bieb.)	2.50
*» bavarica (L.)	2.50
» brachyphylla (Vill.)	2.50
» Favrati (Ritt.), très florifère; hybride bavarica × verna	2.50
*» imbricata (Frœl.)	2.50
» pyrenaica (L.)	5. —
*» Rostani (Reut.), pl. rarissime des Alpes Cottiennes	5. —
*» septemfida (Pall.)	2.50

fr. c.

G. verna (L.), étoile bleue; l'une des plus belles fl. des montagnes	0.50
» » à fl. blanc pur	5. —
» » atrocœrulea , bleu très foncé	2.50
» » azurea , bleu clair	2.50
» » grandiflora	2.50
» » violacea	2.50

Les espèces marquées d'une * exigent un sol poreux et humide, si possible la tourbe ou le sphagnum et le plein soleil. Les G. brach., Favradi et verna recherchent le sec, le pl. soleil et un sol caillouteux, si possible calcaire pour verna et ses var. Le pyrenaica est de culture plutôt difficile; il lui faut une niche bien drainée dans une rocaille, au mi-soleil, et un sol poreux mélangé de cailloux et de sable.

IV. ESPÈCES DES LIEUX HUMIDES ET PALUDÉENS :

Gentiana Andrewsii (Gris.)	2.50
» angustifolia (Mich.)	5. —
» asclepiadæa (L.)	0.50
» » à fl. blanches.	2.50
Pl. d'ombre, à grosses racines charnues, recherchant la fraîcheur, un sol poreux et humide.	
» Pneumonanthe (L.), esp. des marécages; soleil	2.50



Gentiana asclepiadæa.



Gentiana Pneumonanthe.

V. ESPÈCES DE CULTURE SPÉCIALE :

	fr. c.
Gentiana alba (Mühl.)	5.—
» Bigelowi (A. Gray)	5.—
» ciliata (L.)	2.50
» frigida (Hænke)	2.50
» Freyniana (Born.)	2.50
» Frœlichii (Jan.)	2.50
» Kurroo (Royle), de l'Himalaya	5.—
» Parryi (Engel.) des Mont. Rocheuses	5.—
» pumila (Jacq.)	5.—
» Wallichiana	5.—
» Weschniakowi (Rgl.)	5.—

Il leur faut un sol composé de terreau de feuilles, de sable et de tourbe, le tout additionné de cailloux concassés ; mi-soleil.

VI. ESPÈCES DE CULTURE FACILE 1/2 :

Gentiana brevidens (Franch.), du Japon	1.50
» cruciata (L.), exige le calcaire	0.50
» dahurica (Fisch.), Sibérie	1.50
» decumbens (L.), Amérique sept.	1.50
» Fetisowi (Rgl.), Turkestan	1.50
» Kesselringii (Rgl.), Turkestan	1.50
» macrophylla (Pall.), Sibérie	1.50
» Olivieri (Gris.), Sibérie	1.50
» phlogifolia (Schott.), Transylvanie	1.50
» Przewalskii (Maxim.), Chine	1.50
» Saponaria (L.), Amérique sept.	1.50
» scabra (Bunge), Asie orientale	1.50
» straminea (Maxim.), Chine	1.50
» tibetica (King), Himalaya	1.50
» Tianschanica (Rupr.), Asie centrale	1.50
» Walujewi (Rgl.), Turkestan	1.50
» Weschniakowi (Rgl.), Turkestan	2.50



Gentiana cruciata.

VII. ESPÈCES ANNUELLES DONT NOUS OFFRONS DES PLANTES OU, CE QUI EST MIEUX, DES GRAINES A 50 CENTIMES LE PAQUET.

Gentiana amarella (L.)	0.50
» campestris (L.)	0.50
» Germanica (L.)	0.50

G. nivalis (L.)	0.50
» tenella (Rottb.)	0.50

Le classement que nous avons établi pour les gentianes est arbitraire et basé sur notre seule expérience dans la culture. Il y aurait un travail à faire sur ce genre car la monographie du Prodromus est insuffisante.



Geranium pratense.

Geranium aconitifolium, v. *G. rivulare*.

» affine (Led.)	0.50
» albanum (Bieb.)	0.50
» albiflorum (Led.)	0.50
* » argenteum (L.)	1.50
» armenum (Boiss.), brillante esp. orientale	1.50
» atlanticum (Boiss.)	1.50
» cæruleum (Schur.), sup. esp. transylvaine	2.50
* » cinereum (Cav.)	1.—
» Endressi (Gay), excell. espèce à gr. fl. rose vif, des Pyrénées	0.50
» Eriostemon (Fisch.)	1.—
» Fremonti (Torr.)	1.—
» grandiflorum (Edgew.) ¹	2.50
» Grevilleum (Wall.)	0.50
» gymnocaulon (D. C.), différent, certainement, de <i>Ibericum</i>	1.—
» ibericum (Cav.), grandes fl. bleu violet	0.50
» incisum (Nutt.)	1.50
» lancastrienne (Wither.), esp. basse à fl. rose tendre	1.50
» lividum (Willd.)	0.50
» macrorrhizum (L.)	0.50
» » à feuilles panachées	1.—
» nepalense (Sweet.)	0.50
» » var. <i>Japonicum</i>	0.50
» nodosum (L.), recherche l'humidité, fl. lilas	0.50

¹ Le Ger. grandiflorum d'Edgeworth ne doit pas être confondu avec ses nombreux synonymes. C'est une superbe espèce himalayenne qui a été distribuée par le Dr Duthie, de Saharanpur, auquel nous sommes redevables de sa graine, et dont les très grandes fl. bleu ultramarin, le port bas (25 cm. au plus) sont remarquables. Culture facile. Mai-juin. Nous l'avions vendu sous le nom de G. sp. Hazara.

*Geranium prostratum.**Geranium macrorhizum.**Geranium Ibericum.**Geranium sanguineum.**Geranium tuberosum.**Geranium sanguineum.*



Campanula Elatines.

(Du futur Album des plantes de montagnes, par H. Correvon.)





Saxifraga planifolia.

(Du futur Album des plantes de montagnes, par H. Correvon.)

	fr. c.
<i>Geranium palustre</i> (L.)	0.50
» <i>phæum</i> (L.)	0.50
» <i>platypetalum</i> (Fisch.), excell. pl. à gr. fl. lilas bleu foncé	0.50
» <i>polyanthes</i> (Edg. et Hook.)	2.50
» <i>pratense</i> (L.), l'une des meill. et des plus florif.; grandes fl. bleues, de mai en octobre; très solide	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. lilas	0.50
» » à fl. doubles	1.—
» <i>Richardsoni</i> (Fisch.)	1.—
» <i>rivulare</i> (Vill.), <i>aconitifolium</i> , fl. bl.	0.50
» <i>sanguineum</i> (L.), pl. basse et étalée, à très nombr. grandes fl. rose vif; très facile; soleil ou mi-o.; mai-sept.	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» » v. <i>prostratum</i> (Cav.)	1.50
» <i>sibiricum</i> (L.)	1.—
» <i>striatum</i> (L.)	1.—
* » <i>subcaulescens</i> (L'Hér.)	1.50
» <i>sylvaticum</i> (L.)	0.50
» » à fl. blanches	1.50
» » à fl. doubles	2.50
» <i>tuberosum</i> (L.)	1.—
» <i>Wallichianum</i> (Sweet.)	1.—

Les espèces marquées d'une * sont plus spécialement de rocailles et rech. le soleil. Tous ces ger. sont très solides et florifères. Nous cultivons en outre les espèces annuelles suivantes dont nous offrons des plantons ou des graines à 50 centimes le paquet :

<i>Geranium lucidum</i>	0.50
» <i>Robertianum</i>	0.50
» » à fl. blanches	0.50
<i>Gerardia tenuifolia</i> (Vahl.)	1.50
<i>Gerbera Anandria</i> (Sch. Bip.)	1.—
» <i>Kunzeana</i> (A. Br.)	1.—
» <i>lanuginosa</i> (Sch. Bip.)	1.—
» <i>nivea</i> (Sch. Bip.)	1.—
<i>Geum bulgaricum</i> (Panc.)	1.—
» <i>chiloense</i> (Balb.), fl. nombreuses, écar- lates; soleil	0.50
» <i>chiloense</i> × <i>strictum</i>	2.50
* » <i>coccineum</i> (Sib. et Sm.), fl. d'un rouge vif, très ornementale	0.50
» <i>coccineum</i> v. <i>grandiflorum</i>	1.—
» » v. <i>grandiflorum plenum</i>	1.—
» <i>Heldreichii</i> (Hort.), fl. orangée; feuil- lage grisâtre	1.—
» <i>heterocarpum</i> (Boiss.)	1.50
» <i>intermedium</i> (Ehrh.)	1.—
» <i>japonicum</i> (Thunb.)	0.50
» <i>macrophyllum</i> (Willd.)	0.50
» <i>magellanicum</i> (Commers)	1.50
» <i>miniatum</i> (Hort.), var. du <i>chiloense</i>	1.—

* Les *Geum chiloense* et *coccineum* sont très généralement confondus dans les cultures; les fl. du premier sont d'un rouge plus écarlate et ses feuilles radicales sont pinnées et interrompues; c'est une pl. velue, à tige glanduleuse et le lobe terminal des f. est grand, cordiforme, lobé-crénelé et l'article supérieur du style est hispide.

	fr. c.
<i>G. molle</i> (Panc.)	0.50
» <i>montanum</i> (L.), fl. jaune brillant; pl. basse	0.50
» <i>pyrenaicum</i> (Ram.)	0.50
» <i>reptans</i> (L.), pl. saxatile; très grandes fl. jaune d'or	1.—
» <i>rhæticum</i> (Brüg.)	1.—
* » <i>rivale</i> (L.), fl. rouge-brun, penchées	0.50
» » var. <i>pallidum</i>	0.50
» <i>Rossii</i> (Ser.) de l'Amérique arctique	2.50
» <i>Roylei</i> (Walt.)	0.50
» <i>speciosum</i> (Alboff.), rarissime et nouv. esp. du Caucase	10.—
» <i>strictum</i> (Ait.), du Japon	1.—
* » <i>triflorum</i> (Pursh.), fl. rouge brun	1.—
» <i>tyrolense</i> (Brüg.)	1.—

Les Benoites sont de jolies Rosacées voisines des Potentilles; les esp. marquées d'une * préfèrent les lieux humides, frais et mi-ombragés; les autres recherchent le soleil.



Geum coccineum.

<i>Gillenia stipulacea</i> (Nutt.)	1.50
» <i>trifoliata</i> (Moench)	1.50

Gracieuses Spirées à fl. blanches, à grands pétales, très rustiques; mai-août; mi-soleil.



Gillenia trifoliata.

Gladiolus, v. *pl. bulbeuses*.

Glaucium flavum (Crantz), *Pavot marin*
ou *cornu*

fr. c.

» **luteum**, v. *flavum*.

» **rubrum** (Sibt. et Sm.) à fl. rouge brique


» **tricolor** (Bernh.)

0.50

0.50

0.50

Curieuses papavéracées à feuillage glauque, élégamment découpé, persistant l'hiver et constituant une belle décoration, même pour la fl. coupée et la décoration de tables et de salons; fl. jaunes ou rouges, très solide partout, mais préfère un sol léger et sablonneux et le soleil.



Glaucium flavum.

Glechoma hederacea rosea 0.50

Globularia cordifolia (L.) 0.50

» **nana** (D. C.) 1.50

» **nudicaulis** (L.) 1.—

» **trychosantha** (Fisch.) 0.50

» **vulgaris** (L.) 1.—

» **à fl. blanches** 0.50

» **à fl. blanches** 1.—

Les Globulaires sont des pl. de soleil et de rochers; les deux premières esp. sont rampantes et cespitueuses et la prem. est l'une des meill. pl. de roc. pour le soleil. Toutes — sauf leurs var. à fl. blanches — ont des fl. lilas, disposées en capitules serrés, en boules sphériques chez les trois dernières, aplaties chez les deux premières. Mai-juin.

Glossocomia, v. *Codonopsis*.

Gnaphalium Leontopodium, v. *Leontopodium alpinum*.

» **Margaritaceum**, v. *Anaphalis*, *pl. vivaces*.

» **supinum** (L.) 0.50

Goniolimon, v. *Statice*.

Grindelia, v. *pl. vivaces*.

Goodenia repens, v. *Selliera*.

Gutierrezia Euthamiae (Torr.) 1.50

Sorte d'arbuste nain de la fam. des Composées, à feuell. très fin, à nombreuses fl. jaune vif, fleurissant de juillet en novembre. Soleil.

Gymnolomia multiflora (Bent. et Hook.) 1.—

Gypsophila alpigena (Kern.) 0.50

» **cerastioides** (Don.) 0.50

» **glauca** (Stev.) 0.50

G. Mangini (Hort. alp. Gen.). Des steppes mongoles 2.50


» **repens** (L.) 0.50

» **var. monstrosa**; plus grande dans toutes ses formes 1.—

» **Rokejeka** (Del.) 0.50

» **transylvania** (Sprg.). *Banffia petræa* 1.—

Ce sont des cariophyllées aux très nombreuses fl. blanches ou roses, aimant le soleil et préférant le calcaire à la silice. Le *G. repens* est l'une des meill. et des plus florif. d'entre les pl. de rocaillies; pl. très retombante, se couvrant tout l'été de fl. rose clair; feuell. glauque. Pour les grandes espèces v. pl. vivaces.



Gypsophila repens.

Haberlea Rhodopensis (Friv.) 2.50

Curieuse et belle Gessneracée des Balkans qui fait merveille dans un mur au N. ou à mi-ombre ou dans les fentes d'un rocher.

Hacquetia Epipactis (D. C.) 0.50

Curieuse ombellif. à fl. jaunes, en capitules portés par un involucre vert gai; février-mars; très solide.

Hablitzia, v. *pl. grimpantes*.

Halenia ellyptica (Don.) 2.50

Hedraeanthus¹ croaticus (Kern.) 2.50

» **dalmaticus** (D. C.) 1.—

* **dinaricus** (Kern.) 2.50

» **graminifolius** (D. C.) 2.50

» **Kitaibelii** (D. C.) 2.50

* **pumilio** (D. C.) 2.50

* **serpyllifolius** (D. C.) 2.50

» **tenuifolius** (D. C.) 2.50

Ce sont de gracieuses Campanules des rochers, qui fleurissent abondamment de mai en juillet et aiment les fentes des murs et des rocaillies en pl. soleil; fl. lilas ou violet plus ou moins foncé, disposées en capitules, sauf chez les espèces marquées d'une *.

¹ Le Chev. Beck von Mannagetta a publié dans le *Wiener Garten-Zeitung* de 1893, N° 8, une étude-critique très complète sur ce genre, connu sous le nom incorrect de *Edrayanthus* ou sous celui de *Wahlebergia*. Nous suivons sa nomenclature qui est différente de celle de l'*Index Kewensis*.

	fr. c.
Hedysarum altaicum (Fisch.)	1.—
» boreale (Nutt.)	1.—
» canadense (L.)	1.—
» denticulatum (Rgl.)	1.—
» obscurum (L.)	1.—
» flavescens (Rgl.)	1.—
» microcalyx (Baker)	1.—
» neglectum (Led.)	1.—
» sibiricum (Poir.)	1.—
Heimia , v. <i>Nescea</i> , arbustes.	
Helianthemum alpestre (Dun.), fl. jaunes	0.50
» amabile (Hort.), rose tendre, vif ou carmin	0.50
» apenninum (D. C.), blanc pur	0.50
» canum (Dun.), jaune ; feuillage velu	0.50
» chamæcistus (Mill.), blanc	0.50
» coccineum (Hort.), rouge vermillon	0.50
» » à fl. doubles, rouges, fl. très pleines ; juin-octobre	1.—
» coccineum , var. <i>fire Bell</i> (Barr), rouge ardent	0.50
» cruentum (Hort.), rouge très vif	0.50
» cupreum (Hort.), rouge cuivre vif	0.50
» Fumana (Mill.), jaune clair ; feuilles étroites	0.50
» grandiflorum (D. C.), jaune vif ; très florifère	0.50
» » fl. pl. — à fl. très doubles. Mai-août	1.—
» » var. « <i>Lemon Yellow</i> », jaune citron	0.50
» italicum (Pers.), jaune	0.50
» mutabile , v. variable.	
» obscurum (Pers.), jaune vif	0.50
» polifolium (D. D.), blanc	0.50
» » var. à fl. roses	0.50
» purpureum (Hort.), rose vif	0.50
» rhodantum (Dun.), rose clair	0.50
» roseum (D. C.), rose plus ou moins vif	0.50
» rubrum (Hort.), rouge cerise	0.50
» rupifragum (Kern.)	0.50
» sanguineum (Lag.), rouge sang	0.50
» tomentosum (Guss.), grande fl. jaune vif	0.50
» velutinum (Jord.)	0.50
» vulgare (D. C.), jaune vif ; très florifère	0.50

Les Hélianthèmes (Rockroses des Anglais) sont de petits arbustes couchés, les meilleurs pour garnir les rochers ensoleillés, les pentes arides et sèches, les sols exposés au soleil ; on en fait des bordures et des corbeilles. Leurs fleurs ont l'aspect de petites Eglantines et offrent toutes les teintes en dehors de la couleur bleue ; ou en a même à fl. doubles. Ils ne s'élèvent pas au-dessus de 20 à 25 cent. et se couvrent littéralement de fl. de mai en juillet ; puis, si l'on a soin de couper immédiatement les tiges qui ont fleuri et d'empêcher la graine de mûrir, on a une nouvelle floraison en septembre-octobre et jusqu'en hiver. Leur feuillage est à lui seul un ornement de valeur, mais ce qui les rend précieux c'est leur solidité à toute épreuve et leur constitution qui résiste aux plus fortes sécheresses.



Helianthemum.

	fr. c.
Heliosperma , v. <i>Silene</i> .	
Helleborus Abschasicus (A. Br.)	1.50
» antiquorum (A. Br.)	1.50
» atrorubens (W. K.)	1.—
» caucasicus (A. Br.)	1.50
» colchicus (Rgl.), à fl. cuivrées, très belles ; mars-avril	1.—
» corsicus , v. <i>lividus</i> .	
» fœtidus (L.), beau feuillage.	0.50
» guttatus (A. Br.)	1.50
» hybridus , v. pl. vivaces.	
» lividus (Sol.)	1.50
» niger (L.). <i>Rose de Noël</i> , <i>Christmasrose</i>	0.50
» » v. <i>altifolius</i>	2.50
» » v. <i>maximus</i>	2.50
» occidentalis (Reut.)	1.50
» olympicus (Lindl.)	1.50
» orientalis (Lam.)	1.—
» » vars, v. pl. vivaces.	
» purpurascens (W. K.)	1.—
» viridis (L.), fl. vertes	1.—

Les Hellébore recherchent un sol riche en humus et un peu pierreux, une exposition un peu fraîche et mi-ombragée.



Helleborus niger.



Helleborus purpurascens.

	fr. c.
Helonias bullata (L.)	2.50
Helxine Soleirolii (Req.)	2.50
Plante minuscule, jolies pour garnir les murs ou rochers à l'ombre.	
Hemerorallis , v. pl. vivaces.	
Hepatica , v. pl. vivaces.	
Heracleum alpinum (L.)	1.—
» diversifolium , Wall. (Himalaya)	1.50
» Mantegazzianum (Lev. et Som.)	1.50
Plante gigantesque que nous avons introduite du Caucase, propre à décorer les grands rochers ou à être isolée dans les parcs et jardins; mellifère et très recherchée des abeilles.	
» pyrenaicum (Lam.)	0.50
v. en outre pl. vivaces.	
Herniaria glabra (L.)	0.50
Plante naine et rampante, dont on forme des gazons, des tapis, des bordures, des fonds de parterres et dont les jardiniers se servent pour toutes sortes de motifs de décoration et de « mosaiculture. » Elle résiste à la sécheresse et à la pluie, ne craint pas le grand soleil et est d'une culture très facile. C'est l'une des meilleures pl. tapissantes.	
» incana (Lam.)	0.50
» latifolia (Lap.)	0.50
» pyrenaica (Gay)	0.50
Hesperis Dinarica (Beck)	2.50



Heuchera americana.

	fr. c.
Heuchera americana (L.)	0.50
» bracteata (Ser.)	0.50
» brizoides (Hort.)	0.50
» erubescens (A. Br.)	0.50
» glabra (Willd.)	0.50
» Menziesii (Hook.)	0.50
» micrantha (Dougl.)	0.50
» purpurescens (Hort.)	0.50
» rosea (Zabel)	0.50
» sanguinea (Engel.)	0.50

Fl. rouge corail très vif, en grappes dressées, à grand effet, excellentes pour bouquets; mai-septembre; soleil; très solide; pl. précieuse et recommandable.

» à fl. blanches	0.50
Hibiscus , v. pl. vivaces.	
Hieracium albidum , v. intybacum	0.50
» alpinum (L.)	0.50
» arenicola (God.)	0.50
» aurantiacum (L.)	0.50
» suecicum	0.50
» boreale (Fries)	0.50
» Bornmülleri (Freyn.)	0.50
» gymnocephalum (Gris.)	0.50
» Heldreichii (Boiss.)	0.50
» intyhaceum (Wulf.)	1.—
» lanatum (Vill.) <i>Andryala lanata</i>	0.50
» Pelleterianum (Merat.), pl. stolonif. à feuell. gris-blanc.	0.50
» pilosella (L.), Pl. stolonif., envahissante, propre à garnir les lieux arides et secs	0.50
» rubrum (Pet.)	1.—
» stoloni ferum (W. K.), fl. rouge brique	0.50
» villosum (Jacq.)	0.50



Hieracium aurantiacum.

Hippocrepis comosa (L.)	0.50
Homogyne alpina (Cass.), joli feuillage; fl. en capit. rose clair	0.50
» discolor (Cass.)	1.50
» sylvestris (Cass.)	2.50
Horminum pyrenaicum (L.)	0.50
Hoteya japonica (Decsne.), <i>Spirée blanche du Japon</i>	0.50

*Horminum pyrenaicum.*

<i>Houstonia cœrulea</i> (L.)	fr. c.
» à fl. blanches.	2.50
» <i>serpyllifolia</i> (Mich.)	2.50


*Houstonia cœrulea.*

<i>Hugueninia tanacetifolia</i> (Reich.)	0.50
<i>Hutschinsia</i> (<i>Lepidium</i>) <i>alpina</i> (R. Br.)	0.50
» <i>Auerswaldii</i> (Willk.)	0.50
» <i>brevicaulis</i> (Hoppe)	0.50
<i>Hyacinthus</i> , v. pl. bulbeuses.	
<i>Hydrocotyle moschata</i> (Forst.)	2.50
» <i>rotundifolia</i> (Rosb.) <i>Sibthorpioides</i>	2.50
Jolie petite esp. rampante, à feuil. ornemental, très propre à garnir les lieux frais.	
<i>Hydrophyllum occidentale</i> (A. Gr.)	1. —
» <i>virginicum</i> (L.)	0.50
<i>Hyoseris</i> (<i>Aposeris</i>) <i>fœtida</i> (L.)	0.50
<i>Hypericum Androsæum</i> (L.) <i>Andro-</i> <i>sæum officinale</i>	0.50
» <i>atomarium</i> (Boiss.)	0.50
» <i>calycinum</i> (L.) la douz. 2 fr.	0.50

fr. c.

L'une des meilleures pl. tapissantes pour sous-bois, lieux arides, à l'ombre ou au plein soleil; envahissante et très solide; beau feuillage et très grandes fl. jaune brillant.

* <i>H. Coris</i> (L.)	1. —
* » <i>crenulatum</i> (Boiss.)	2.50
» <i>delphicum</i> (Boiss.)	0.50
» <i>delphinense</i> (Vill.)	0.50
» <i>elegans</i> (Steph.)	0.50
» <i>Gebleri</i> (Led.)	0.50
» <i>hyssopifolium</i> (Vill.)	0.50
» <i>inodorum</i> (Mill.)	0.50

*Hypericum calycinum.*

<i>Hypericum Kotschyannum</i> (Boiss.)	1.50
» <i>montanum</i> (L.)	0.50
» <i>nummularium</i> (L.)	0.50
» <i>orientale</i> (L.)	0.50
» » var. <i>decussatum</i>	0.50
» <i>organifolium</i> (Willd.)	1.50
» <i>perforatum</i> (L.) <i>Millepertuis</i>	0.50
» <i>polyphyllum</i> (Boiss.)	1.50
» <i>pulchrum</i> (L.)	0.50
» <i>quadrangulum</i> (L.)	0.50
* » <i>repens</i> (L.), brillante esp. à florais. prolongée	1.50
» <i>Rhodopæum</i> (Friv.)	0.50
» <i>Richeri</i> (Vill.)	0.50
» <i>tomentosum</i> (L.)	0.50
» <i>transylvanicum</i> (Celak.)	1.50

Voir pour les autres espèces aux arbustes.

Les *Hypericum* ont tous des fl. jaunes, brillantes et le plus souvent très ornementales; ils recherchent les lieux ensoleillés; mai-juillet.

Les esp. marquées d'un * sont des pl. de rocaillies, basses et cespitueuses.

<i>Hypochaeris Helvetica</i> (Wulf.) <i>H. uni-</i> <i>flora</i>	1. —
» <i>maculata</i> (L.)	0.50
<i>Hyssopus aristatus</i> (Godr.)	0.50
» <i>officinalis</i> (L.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. rouges	0.50
» » sp. Sibérie	1.50

L'Hyssope est d'entre les pl. aromatiques les plus appréciées; elle croît dans les lieux les plus arides et stériles, au grand soleil et ses fl. bleu foncé (blanches ou rouges chez les var. d'officinalis) sont un bel ornement; de juillet en octobre.



Hyssopus officinalis.

Iberis Bernardiana (Gren. et Godr.) . . .	1.—
» commutata (Schott. et Kots.) . . .	1.50
» Garrexiana (All.) . . .	0.50
» Gibraltarica (L.) . . .	0.50
» jucunda (Schott. et Kots.) . . .	1.50
» saxatilis (L.) . . .	0.50
» sempervirens (L.) . . .	0.50

L'une des meill. pl. à bordures et pour garnir rochers ensoleillés; verdure foncée, persistant l'hiver; fl. blanc éblouissant, très abondantes, avril-juin; pl. des plus solides.

» » var. nana . . .	1.—
» » var. à fl. doubles . . .	1.—
» stylosa (D. C.) . . .	1.50
» taurica (D. C.) . . .	0.50
» Tenoreana (D. C.) . . .	0.50



Iberis sempervirens.

Imperatoria Ostruthium (L.), pl. d'ombre, très solide . . .	0.50
--	------

fr. c.

Incarvillea Delavayi (Franch.) . . .	1.—
» grandiflora (Franch.) . . .	5.—
» Olgæ (Rgl.) . . .	0.50
» sinensis (Lam.) . . .	2.50
» variabilis (Batal.) . . .	0.50

Bignoniacées herbacées, à fl. roses, très ornementales; les deux premières, très recherchées pour leur beauté, possèdent des tubercules et se traitent comme des pl. bulbeuses. Bonne terre profonde et meuble; soleil.



Incarvillea Olgæ.

Inula acuminata (D. C.) . . .	2.50
» britannica (L.) . . .	0.50
» » var. Japonica . . .	1.50
» ciliaris (Maxim.) . . .	1.—
» cordata (Boiss.) . . .	1.—
» ensifolia (L.) . . .	0.50
» germanica (L.) . . .	0.50
» glandulosa (Willd.), grand Arnica à fl. orangées du Caucase . . .	0.50
» » var. grandiflora , superbe plante de grand effet . . .	1.—
» Helenium (L.), Aulnée, le meilleur remède contre les paresse d'estomac . . .	0.50
» » var. grandiflora . . .	0.50
» hirta (L.) . . .	0.50
» Hookeri (Clarke) . . .	1.—
» limonifolia (Boiss.) . . .	1.—
» macrocephala (Boiss.) . . .	0.50
» montana (L.) . . .	1.—
» obtusifolia (Kern.) . . .	1.—
» oculus-Christi (L.) . . .	0.50
» racemosa (Hook.) . . .	1.—

fr. c.

Inula Royleana (D. C.)	fr. c.
» salicina (L.)	1.—
» spiræfolia (Koch.)	0.50
» Vaillantii (Vill.)	2.50
	0.50

Les Aulnées sont de bonnes pl. de pleine terre, sortes de grandes Marguerites jaunes fleurissant l'été; elles aiment le mi-soleil et la fraîcheur.



Inula glandulosa.

Iris¹.

Iris albicans (Lange), blanc pur	1.50
» amœna (D. C.)	0.50
» aphylla (L.)	0.50
» arenaria (W. et K.), très nain, fl. jaun.	1.50
» asiatica (Stapf.), très grandes fl. violet foncé, superbe	1.—
» Balkana (Janka.)	1.—
» Benacensis (Kern.)	0.50
» biflora (L.)	0.50
» Biliotti (Foster)	0.50
» Bohemica (Schmidt)	0.50
» bosniaca (Baker), jaune brillant, précocce	2.50
» cæspitosa (Borb.)	1.—
» Chamæiris (Berh.), jaune pâle, nain	0.50
» cristata (Ait.), bleu et orange	0.50
» cypriana (Baker.), bleu clair, maculé de brun rouge	2.50

¹ Nous comprenons dans le chapitre des pl. de mont. ou saxatiles les seuls Iris à rhizome ou à racines fibreuses, les autres étant compris dans les pl. vivaces, les pl. paludéennes ou les pl. bulbeuses.

Iris ensata (Thunb.), fl. violet et or, odorantes	fr. c.
» var. Chinensis (Matsam.)	0.50
» erratica (Tod.)	1.—
» flavescens (Del.)	1.—
» Florentina (L.), fl. blanches, racine odorante dont on fait la poudre d'Iris	0.50
» fœtidissima (L.), plante d'ombre, à f. ornemental, à fruits rouge vif	0.50
» » à feuilles panachées	1.—



Iris fœtidissima (en fruits).



Iris fœtidissima (en fleurs).

I. furcata (Bieb.), v. aphylla	
» Germanica (L.), la douz. 2 francs	0.50
Pour variétés v. pl. vivaces.	
» graminea (L.), fl. bleues	0.50
» » var. inodora (Fost.)	0.50
» Hungarica (W. et K.), fl. bleues	0.50
» italica (Parl.)	0.50
» japonica (Thunb.), <i>I. fimbriata</i> , très beau	1.—
» Kochii (Kern.), fl. bleues, feuilles marginées de brun	1.—
» lacustris (Nutt.), lilas et jaune; très nain	1.50

	fr. c.
Iris Mandraliscæ (Todaro)	1. —
» neglecta (Horn.)	0. 50
» notha (Bieb.)	0. 50
» olbiensis (Hénon)	0. 50
» oxypetala (Bunge.), odorant	1. 50
» pallida (Lam.), bleu d'azur; odorant	0. 50
» plicata (Lam.), bleu et blanc	0. 50
» pumila (L.), nain et précoce	0. 50
» » var. fl. violet foncé	0. 50
» » var. fl. jaunes	0. 50
» ruthenica (Dryand.), <i>I. cæspitosa</i>	1. 50
» sambucina (L.), jaune et brun	0. 50
» sibirica (L.), bleu foncé	0. 50
» » à fl. blanches	0. 50
» » var. <i>alte-cærulea</i> (Matz.)	1. 50
» spuria (L.), bleu-clair et jaunâtre	0. 50
» squalens (L.), jaune vif et brun foncé	0. 50
» Statellæ (Todaro), jaune et blanc	1. —
» stylosa (Desf.), bleu, odorant et très précoce	0. 50
» » à fl. blanches	1. —
» suaveolens (Boiss.)	1. —
» tectorum (Maxim.)	1. 50
» variegata (L.), jaune et brun	1. 50
» verna (Pursh.), violet et orangé	1. —
» versicolor (L.), violet rougeâtre et or	0. 50
» virescens (Rad.), jaune verdâtre, odorant, rare	0. 50
» virginica (L.), <i>I. prismatica</i> , lilas vif	0. 50

Voir en outre pl. vivaces ou pl. bulbeuses ou pl. paludéennes.

Tous ces Iris sont de culture entièrement facile et ne demandent qu'une place au soleil, dans la rocaille ou la pleine terre.



Iris pumila.

Isopyrum thalictroides (L.) 0. 50

Jolie petite renonculacée tuberculeuse précoce, à feuillage fin et à fleurs blanches; mi-ombre ou sous-bois.

Jasione humilis (Loisel.)	2. 50
» Jankæ (Neilr.)	2. 50
» montana (L.)	1. —
» perennis (L.)	1. —

Campanulées à fl. bleu-lilas, réunies en capitules; soleil.



Jeffersonia diphylla.

	fr. c.
Jeffersonia diphylla (Pers.)	2. 50
Jurinea depressa (C. A. M.)	0. 50
Kernera saxatilis , v. <i>Cochlearia</i>	
Kosteletzkya pentacarpa (Led.)	2. 50
» virginica (Presl.)	2. 50
Lactuca Lessertiana (Clarke.)	1. —
» perennis (L.)	0. 50
» racemosa (Willd.)	0. 50
» v. <i>Mulgedium</i>	
Lamium album (L.)	0. 50
» album × purpureum	0. 50
» maculatum (L.), v. <i>univittatum</i>	0. 50
» Orvala (L.)	0. 50

Très belle espèce à fl. rouge brun.



Lamium Orvala.

Lappa major (Gært.)	0. 50
Laserpitium gallicum (L.)	1. —
» Gaudini (Mor.)	1. —
» latifolium (L.)	0. 50
» Panax (Gouan). — <i>L. Halleri</i>	0. 50
» Siler (L.)	0. 50

Ombellifères à feuell. ornemental et très solide; fl. blanches.

	fr. c.
Lathyrus aureus (Benth.)	1.50
» grandiflorus (S. et S.)	1.50
» latifolius (L.)	0.50
» à fl. blanches	1.—
» var. obtusifolius	1.—
» maritimus (Big.)	1.—
» montanus (Bernh.)	1.50
» palustris (L.)	0.50
» polymorphus (Nutt.)	1.50
» pyrenaicus (Jord.)	1.—
» rotundifolius (Willd.)	1.50
» Sibthorpi	1.50
» sylvestris (L.)	0.50
» sp. Andes du Chili	2.50
» tuberosus (L.)	0.50
Lavandula vera (D. C.)	0.50
» spica (D. C.)	0.50
» à fl. blanches	0.50

Les Lavandes sont très recherchées des maîtres de maison pour parfumer le linge, les armoires, etc. Soleil et lieux secs.



Lavandula vera.

Leontice altaica (Pall.)	2.50
» Leontopetalum (L.)	2.50
Leontopodium alpinum (Cass.). <i>Etoile d'argent. Edelweiss</i>	0.50
» forts pieds de 2 ans	1.—

La cult. de l'Etoile d'argent est facile ; soleil, rocher ou plate-bande si possible ; tenir sec l'hiver, diviser la touffe tous les deux ans. Pour l'avoir très blanche il faut mettre du calcaire dans le sol.

Leontopodium alp. , v. Himalayense (D. C.)	1.50
» v. sibiricum (Cass.)	1.50
» v. Transylvanicum	1.50
» japonicum (Miq.)	5.—
» sp. Asie centrale	2.50
Lepachys columnaris (Torr.)	1.50
» pinnatifida (Rafin.)	1.50
Lepidium flexicaule (Kirk), de Nouv. Zélande	0.50

	fr. c.
Leptinella (Cotula), dioica (Hook.), de nouv. Zélande	0.50
Leucojum , v. pl. bulbeuses.	
Leuzea conifera (D. C.)	0.50
Levistichum officinale (Koch.), <i>Livèche</i>	0.50
Liatris elegans (Willd.)	1.—
» gracilis (Ell.)	1.—
» graminifolia (Pursh.)	1.—
» montana (Gray)	1.—
» odoratissima (Willd.)	1.—
» punctata (Hook.)	1.—
» pumila (Lodd.)	1.—
» scariosa (Willd.)	1.—
» spicata (Willd.)	0.50

Charmantes Composées de l'Amér. sept., à fl. roses, rouge carmin ou brunâtres, disposées en épis dressés ; sol sain et léger ; sol. ou mi-ombre ; juin-septembre.



Levistichum officinale.



Liatris spicata.

Ligularia macrophylla (D. C.). <i>Senecio Ledebouri</i>	1.—
» robusta (D. C.) <i>S. robustus</i>	1.—
» sibirica (Cass.), <i>S. Ligularia</i>	1.—
» speciosa (Fisch.)	1.—
» turkestanica (Rgl.)	1.—

Grand. Compos. à grand feuillage, à fl. jaunes, disposées en grappées dressées ; sol profond ; juillet-septembre.

*Ligularia sibirica.**Lilium*, v. pl. bulbeuses.

* <i>Linaria alpina</i> (Mill.)	0.50
» à fl. blanches	2.50
» à fl. roses	2.50

La *L. alp.*, l'une des plus gracieuses et des plus florifères d'entre les pl. de rocailles, réussit au soleil, dans les fentes d'un mur ou d'un rocher; juin-septembre.


*Linaria alpina.*

<i>L. anticaria</i> (Boiss.)	0.50
» <i>cilicica</i>	1.—
* » <i>cymbalaria</i> (L.). <i>Ruine de Rome</i> , la douz. 2 fr.	0.50
» à fl. blanches	1.—
* » <i>hepaticæfolia</i> (Steud.)	0.50
» <i>italica</i> (Trevir.)	0.50
» <i>linifolia</i> (Willd.)	0.50
» <i>macedonica</i> (Gris.)	0.50
* » <i>origanifolia</i> (D. C.)	0.50
* » <i>pallida</i> (Ten.). <i>Ruine de Naples</i>	0.50
» <i>Pancicii</i> (Jank.)	0.50
» <i>petræa</i> (Jord.)	0.50
» <i>pilosa</i> (D. C.)	0.50
» <i>purpurea</i> (Mill.)	0.50
» <i>repens</i> (Steud), <i>striata</i>	0.50
» <i>tristis</i> (Mill.)	0.50

fr. c.

Linaria Velenowsky (Hort.) 0.50
 * *vulgaris* × *repens* 0.50

Toutes sont des plantes de plein soleil; les espèces marquées d'une * préfèrent la muraille ou les fentes de rochers. La Ruine de Rome va bien à l'ombre.

*Linaria cymbalaria.*

Lindelofia spectabilis (Lehm.) 0.50

Boraginée à fl. d'un bleu superbe; mi-ombre; mai-juillet.

Linnæa borealis (L.), pl. d'ombre 2.50

*Linnæa borealis.*


Linosyris vulgaris (L.) 0.50

Compos. à fl. jaune ardent, de 40 à 60 centim., très florif. et gracieuse; juillet-octobre; va partout mais surtout au sec et au gr. soleil.

* <i>Linum alpinum</i> (L.), bleu azur	0.50
» à fl. blanches	1.50
* » <i>austriacum</i> (L.)	0.50
» <i>capitatum</i> (Kit.), grandes fl. jaunes	1.—
» <i>flavum</i> (L.), jaune clair	1.—
» <i>hologynum</i> (Reich.)	1.—
» <i>Lewisi</i> (Mühl.), bleu clair	1.—
» <i>maritimum</i> (L.), jaune clair	1.—
* » <i>perenne</i> (L.), bleu lilas	0.50

fr. c.

Linum perenne à fl. blanches
» **tenuifolium** (L.), rose lilacé. 0.50
Pl. très florifères, surtout les espèces marquées
d'un *, qui donnent leurs abondantes fleurs
bleues tout l'été durant et jusqu'en novembre.
Port gracieux ; soleil.



Linum perenne.

Lippia canescens (H. B.). *L. repens*. 0.50
Petite Verveine minuscule et rampante qui ne
résiste pas à tous nos hivers si elle n'a pas
une position abritée.



Lippia canescens.

Liriope graminifolia (Baker) . . . 1.50
Lithospermum angustifolium (Mich.),
jaune clair . . . 2.50
» **canescens** (Lehm.), jaune d'or . . . 2.50
» **Gastoni** (D. C.), bleu foncé ; très rare. 5.—
» **longiflorum** (Sprengl.), jaune . . . 2.50
» **multiflorum** (Wats.), jaune clair . . . 2.50
» **petraeum**, v. *Moltkia petraea*.
» **prostratum** (Lois.), bleu superbe . . . 1.—
» **purpureo-cœruleum** (L.), bleu in-
tense . . . 0.50

Cette dernière espèce seule demande l'ombre ;
c'est l'une des meill. pl. pour sous-bois. Les
autres sont des pl. de rocailles et de soleil.



Lithospermum purpureo-cœruleum.

fr. c.

Lloydia alpina (Salesb.). *L. serotina* . . . 2.50
Lobelia sessilifolia (Lamb.). *L. Kamt-*
schatica . . . 2.50
» **Xalapensis** (H. B. et K.) . . . 2.50
Voir en outre pl. vivaces.
Lophanthus anisatus (Bent.), forte odeur
anisée . . . 0.50
» **rugosus** (Fisch.) . . . 2.50
Lotus corniculatus (L.) . . . 0.50
» » var. *americanus* . . . 2.50
» » var. *japonicus* . . . 2.50



Lotus corniculatus.

Lunaria rediviva (L.) . . . 0.50
Luzula albida (Hoffm.) . . . 0.50
» **lutea** (D. C.) . . . 0.50
» **nivea** (D. C.) . . . 0.50
Lychnis alpina (L.) . . . 0.50
» » à fl. blanches. . . 1.50
» **Bungeana** (Fisch.) . . . 0.50
» **flor Jovis** (L.) . . . 0.50
» » à fl. blanches . . . 1.50
» **fulgens** (Fisch.), écarlate vif . . . 0.50



Lychnis flor Jovis.



Lychnis fulgens.



Lychnis Viscaria fl. pl.

	fr. c.
Lychnis grandiflora (Jacq.)	0.50
* Lagascæ (Hook.), pl. murale	0.50
» Preslii (Sek.)	0.50
» Lapponica (L.)	0.50
» pyrenaica (Rey.)	1.50
» Viscaria (L.)	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» » à fl. doubles	1.—

Bonnes pl. florifères, faciles ; soleil ; mai-juillet.

Lycopodium Selago (L.)	2.50
Lycopus luridus (Turcz.)	1.50
Lysimachia atropurpurea (L.)	1.—
» barystachys (Bunge.)	1.—
» ciliata (L.)	0.50
» clethroides (Duby.)	0.50
» epheumerum (L.)	0.50
* » japonica (Thunb.)	0.50
» Leschenaulti (Duby.)	0.50
» longifolia (Pursh.)	0.50
* » nemorum (L.), excell. pour sous-bois	0.50
* » nummularia (L.)	0.50
» » v. aurea	0.50
» punctata (L.)	0.50
» secunda (Don.)	0.50
» thyrsiflora (L.)	0.50
» verticillata (Bieb.)	0.50
» vulgaris (L.)	0.50

Bonnes pl. florif., à fl. blanches, roses ou jaunes, propres à garnir les lieux frais et humides ; les espèces marquées d'un * sont rampantes. Le *L. nummularia* est l'une des meill. plantes tombantes ; au cœur de Londres on le voit retomber des fenêtres de 1 et 2 étages et se couvrir de fl. jaune brillant, de mai en septembre ; très solide ; craint seulement le sec et le trop grand soleil.



Lysimachia clethroides.


Lythrum hyssopifolium (L.)	0.50
» Salicaria (L.)	0.50
» » à fl. roses	0.50
» tomentosum (Mill.)	1.—
» virgatum (L.)	1.—



Lysimachia nummularia.



Lysimachia vulgaris.



Lythrum Salicaria.



Mertensia virginica.

	fr. c.
Malva californica (Presl.)	1.50
Malvastrum coccineum (Gray.)	2.50
» Davidsonni (Hort.)	2.50
Mandragora officinalis (L.)	2.50
La mystérieuse Mandragore ! parfaitement rustique au midi d'un mur.	
Margyricarpus setosus (R. P.)	1.50
Marrubium supinum (L.)	1.50
» velutinum (S. et S.)	1.50
Matricaria ambigua (Matsam.)	2.50
Matthiola fenestralis (R. Br.)	1.—
» Oyensis (Menier.)	1.—
» pedemontana (Gremli), rarissime	2.50
» sinuata (R. Br.)	1.—
» tristis (R. Br.)	2.50
» Valesiaca (Boiss.)	2.50
Mayanthemum bifolium (Lam.)	0.50
Muguet nain des bois.	
Meconopsis aculeata (Royle)	2.50
» grandis (Prain.)	2.50
» cambrica (Vig.) <i>Pavot jaune des Pyrénées</i>	0.50
» » à fl. orangées	0.50
» » à fl. pleines	1.—
» petiolata , v. <i>Stylophorum</i> .	
Ombre et fraîcheur ; très florifères.	
Megasea , v. <i>Saxifraga</i> .	
Melandrium (Silene) noctiflorum (Fries)	0.50
» rubrum (Gärcke)	0.50
Melica altissima (L.), jolie graminée d'ornement	0.50
» ciliata (L.)	0.50
» nutans (L.)	0.50
Melissa officinalis (L.), <i>Mélisse</i>	0.50
» » v. <i>graveolens</i>	0.50
Melitis melissophyllum (L.)	0.50
Mentha aquatica (L.)	0.50
» arvensis (L.)	0.50
» piperita (L.), <i>menthe poivrée</i>	0.50
» Pulegium (L.)	0.50
» Requienii (Benth.), <i>Thymus corsicus</i>	0.50
Plante de rocaille, pour mi-ombre.	
» rotundifolia (L.)	0.50
» sylvestris (L.)	0.50
» viridis (L.)	0.50

	fr. c.
Mertensia lanceolata (D. C.)	1. —
» oblongifolia (Don)	1. —
» paniculata (D. C.)	1. —
» sibirica (Don)	1. —
» virginica (D. C.)	1. —

Boraginées à fl. bleues ou lilas rose, fleurissant au printemps; pleine terre, mi-soleil.

Meum athamanticum (Jacq.)	0.50
» mutellinum (Gært.)	0.50

Petites Ombellifères alpines à feuil. très fin, extrêmement divisé et gracieux chez la première.

Michauxia campanuloides (Juss.)	1. —
» Tschihatscheffi (Fisch.)	2.50

Micromeria bulgarica	1. —
» cristata (Gris.)	1.50
» Douglasi (Benth.)	1.50
» filiformis (Benth.)	1.50
» græca (Benth.)	1.50
» Juliana (Benth.)	1. —
» montana (Reich.), <i>Satureya montana</i>	0.50
» piperella (Benth.)	1.50
» rupestris (Benth.)	0.50

Petites Labiées propres pour les rochers ensoleillés; été; *M. rupestris*, jolie espèce à nombreuses fl. blanches, est très recommandable.



Mimulus cupreus.

Mimulus Burneti (Hort.), fl. jaune-brun	0.50
» cardinalis (Lindl.), rouge-écarlate	0.50
» cupreus (Rgl.), rouge-brun ardent	0.50
» luteus (L.), jaune vif	0.50
» moschatus (L.), <i>Herbe au musc.</i>	0.50
» primuloides (Benth.)	1.50
» ringens (L.), jaune paille, maculé brun	0.50

Belles et brillantes Scrophularinées à fl. généralement grandes et belles; juin-octobre; humidité et mi-ombre; place abritée contre gr. froids. Le *M. primuloides* a de très nombreuses petites fl. jaune vif, extrêmement élégantes; il lui faut, chez nous, une légère couvert.

Mitchella repens (L.)	2.50
Mitella diphylla (L.)	0.50
» nuda (L.)	0.50



Mimulus luteus.

Mitella pentandra (Hook.), <i>Drummondia mitelloides</i>	0.50
---	------

Gracieuses Saxifragées pour les lieux ombragés et frais; été.

Modiola geranioides (Gill.)	1. —
» multifida (Möench)	1. —
Mœhringia Grisebachii (Janka)	2.50
» muscosa (L.)	0.50

Délicieuse petite Cariophyllée à feuil. très fin, à fl. blanches en croix, très nombreuses; mai-octobre; fissures d'un mur ou rocher, ombre ou mi-sol.; fraîcheur; préfère le calcaire.


» pendula (Fenzl.), excell. pl. tombante	1. —
» polygonoides (M. K.)	0.50
» Ponæ (Fenzl.)	1.50
» villosa (Fenzl.)	1.50

Molopospermum cicutarium (D. C.)	0.50
» peloponesiacum (Koch)	1.50

Moltkia petræa (Boiss.), <i>Lithospermum, Echium pet.</i>	1.50
--	------

Charmant pet. arbrisseau qui se couvre de fl. bleu et rose; été; soleil.

Molucella spinosa (L.), rare	2.50
Monarda , v. pl. vivaces	



Morine longifolia.

	fr. c.
Morine Coulteriana (Royle)	1. —
» Kokanica (Rgl.)	2. 50
» betonicoides (Reut.)	2. 50
» longifolia (Wall.)	0. 50
» persica (L.), craint l'humidité	2. 50

Superbes pl. à l'aspect d'Acanthes; feuillage ornemental qui, froissé, répand od. citron; fl. roses et blanches, en épis dressés très beaux. Juin-septembre. Sol profond; soleil.

Morisia hypogæa (Gay)	2. 50
Mulgedium alpinum (L.)	0. 50
» Bourgæi (Boiss.)	1. 50
» caliciæfolium (D. C.)	1. 50
» floridanum (D. C.)	1. 50
» integrifolium (Cass.)	0. 50
» macrophyllum (D. C.)	0. 50
» multiflorum (D. C.)	0. 50
» Plumieri (D. C.)	0. 50
» prenanthoides (D. C.)	1. 50
» racemosum	1. 50
» sibiricum (Less.)	0. 50
» Tschiantanicum (Rgl.)	1. —
» tataricum (D. C.)	1. 50

Composées à fl. bleu violacé, assez semblables à celles de la Chicorée sauvage, très nombreuses, en grappes ou panicules plus ou moins étalées, décoratifs; mi-ombre; pl. solides; mai-sept. Le M. Bourgæi est une pl. superbe que nous avons introduite du Caucase et qui donne des milliers de capitules bleus.



Mulgedium alpinum.

Myosotis alpestris (Schmidt.)	0. 50
» à fl. blanches	0. 50
» azorica (Wats.)	0. 50
» palustris (With.)	0. 50
» » à fl. blanches	0. 50
» » var. semperflorens	0. 50
» pygmæa (Bert.)	1. —
» Rehsteineri (Wartm.)	0. 50
» rupicola (Sm.)	1. —
» Wellwitschii (Boiss.)	0. 50

Lieux frais et mi-ombragés.



Myosotis rupicola.

	fr. c.
Myriactis Nepalensis (Less.)	2. 50
Myrrhis odorata (L.), <i>Myrrhe</i>	0. 50
Ombellifère fortement anisée, à racines très odorantes, prop. à garnir lieux frais et ombragés.	
Narcissus , v. pl. bulbeuses.	
Nardosmia fragans , v. <i>Petasites</i> .	
Narthex Polakii (Falcon.)	2. 50
Nepeta cæsaræa (Boiss.)	1. —
» camphorata (Boiss.)	1. —
» Cataria (L.)	0. 50
» dirphya (Boiss.)	1. —
» granatensis (Boiss.)	0. 50
» grandiflora (Bieb.)	0. 50
» Kokamyrica (Rgl.)	1. —
» lavandulacea (L.)	1. —
» macrantha (Fisch.)	0. 50
» Mussini (3prgl.)	0. 50
» nepetella (L.)	1. —
» nuda (L.)	0. 50
» » à fl. blanches	0. 50
» suavis	1. —

Labiées aromatiques et florifères; sec et soleil.



Nepeta macrantha.

Nesæa , v. arbustes.	
Nigritella , v. <i>Orchidées</i> .	
Nothoscordum striatum (Kunth.)	2. 50
Nothosmyrnum japonicum (Miq.)	1. 50
Obeliscaria pinnata (Cass.)	1. —
Onothera (<i>Oenothera</i>) albicaulis (Fras.)	1. —
* » brachicarpa (A. Gr.)	1. —
* » cæspitosa (Nutt.)	0. 50

	fr. c.
Oenothera Fraseri (Pursh.)	0.50
» fruticosa (L.)	0.50
» Joungi (Hort.)	1. —
* » missouriensis (Sims.)	0.50
» Nuttalli (Torr.)	1. —
» ovata (Nutt.)	0.50
* » pumila (L.)	0.50
* » serrulata (Nutt.)	1.50
» speciosa (Nutt.)	0.50
* » taraxacifolia (Sweet.)	0.50

Les Primevères du soir « Evening primroses » des Anglais, sont de vigoureuses et bonnes pl. viv. et de roch.; les esp. marquées d'un * sont naines et cespitueuses; les autres atteignent 25 à 60 cent.; toutes sont très florifères. *O. missour.* est la meill. des pl. rampantes; grandes fl. jaune clair, mai-octobre; *O. speciosa*, à très gr. fl. blanc rosé à centre jaune, est une merveille de grâce et d'élégance, très solide et plutôt envahissante. Toutes réclament soleil ou mi-soleil et vont dans tous les sols.



Oenothera fruticosa.



Oenothera missouriensis.



Oenothera speciosa.

	fr. c.
Omphalodes Luciliæ (Boiss.)	5 —
» nitida (Hoff.), <i>O. Lusitanica</i> .	2.50
» verna (L.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50

L'*O. verna* est une bonne plante viv., propre à constit. des bordures; fl. bleu superbe; mai; ombre ou mi-ombre. *O. nitida*, très belle esp. voisine, plus grande. *O. Lucil.*, rare et bien connue des amateurs, veut un mur au mi-soleil.



Omphalodes verna.

Onobrychis cornuta (Desv.)	0.50
» montana (D. C.)	0.50
» petræa (Desv.)	0.50
Ononis , v. arbustes.	
Onosma arenarium (W. et K.)	2.50
» Bourgæi (Boiss.)	2.50
» echioides (L.)	2.50
» Helveticum (Boiss.)	2.50
» pyramidalis	2.50
» stellulata (W. et K.)	2.50
» syriacum (Labill.)	2.50
» taurica (Pall.)	2.50
» tinctorum (Bieb.)	2.50

Boraginées à fl. jaunes; grand soleil et sec.

	fr. c.
Ophiopogon Jaburan (Lodd.)	0.50
» fol. var.	0.50
» japonicus (Wall.)	0.50
» spicatus (Kerr.)	0.50
Opuntia , v. <i>Cactées rustiques</i> .	
Origanum creticum (L.)	1.50
» Dictamnus (L.)	2.50
» pulchrum (Boiss.)	2.50
» sipyleum (L.)	2.50
» Smyrnaceum (L.)	2.50
» vulgare (L.)	0.50
Jolies Labiées au feuil. aromatique, très parfumé chez pulchrum qui a de belles fl. roses entourées de bractées vivement colorées. Soleil et sec. Juin-octobre.	
Ornithogalum , v. pl. bulbeuses.	
Orobus canescens (L.)	1.—
» luteus (L.)	1.—
» niger (L.)	0.50
» vernus (L.)	0.50
» à fl. blanches	2.50



Orobus luteus.

Ostrowskya magnifica (Rgl.)	1.50
Oxalis acetosella (L.), <i>Pain de coucou</i>	0.50
» var. <i>rosea</i>	0.50
» enneaphylla (Cav.)	2.50
» tropæoloides (Hook.)	0.50
Oxyria dygina (Campd.)	0.50
» fol. <i>argentea</i>	1.50
» elatio r (R. Br.)	0.50
» reniformis (Hook.)	0.50
Oxytropis campestris (D. C.)	0.50
» Baikalensis (Pall.)	2.50
» deflexa (D. C.)	2.50
» fœtida (D. C.)	1.—
» Halleri (Bunge)	1.—
» Lamberti (Pursh.)	2.50
» montana (D. C.)	1.—
» ochroleuca (Bunge)	2.50
» pilosa (D. C.)	0.50
» strobilacea (Bunge)	1.—

Culture assez difficile; soleil, sol profond et caillouteux.

	fr. c.
Pachysandra procumbens (Mich.)	1.50
» terminalis (S. et Z.)	1.—
» fol. var.	1.50
Pl. basses et rampantes, à feuillage décoratif et persistant; mi-ombre.	
Pæderota Ageria (L.), fl. jaunes.	0.50
» Bonarota (L.), fl. bleues	0.50
Pæonia , v. pl. vivaces.	
Pancratium , v. pl. bulbeuses.	
Papaver alpinum (L.)	0.50
» v. <i>Burserianum</i> .	0.50
» v. <i>flaviflorum</i>	0.50
» v. <i>Rhæticum</i> .	0.50
» à fl. rouge vif	1.—
» à fl. rose tendre.	1.—
» à fl. laciniées.	1.—
Délicieuses petites pl. des pierriers calcaires qui prod. des cent. de fl. légèrement odor., très gracieuses, de mai en automne; fentes roch. ou mur ou pl. terre, au mi-sol.; se resème naturellement si l'on a soin de ne pas déranger le sol alentour.	
Papaver atlanticum (Ball.), très florif.; rouge brique	0.50
» californicum (A. Gr.)	1.50
» caucasicum (Bieb.)	0.50
» croceum (Led.)	0.50
» Heldreichii (Boiss.)	0.50
» nudicaule (L.)	0.50
» à fl. blanches	0.50
» à fl. rouges	0.50
Voisin du P. alpinum, plus fort et plus solide; fl. très abond.; mai-automne; lieux frais; l'une des meill. pl. pour rochers et pl. terre à mi-ombre.	
Papaver pilosum (Sibt.)	0.50
» pyrenaicum (Willd.)	1.50
» radicatum (Rottb.)	1.—
» rupifragum (Boiss.)	0.50
» var. <i>major</i>	1.—
» var. <i>minor</i>	1.—
» spicatum (Boiss.)	0.50
» strictum (Boiss.)	0.50
Tous les Pavots vivaces sont d'excell. pl. d'ornement, fleurissant abondamment et de cult. extra facile.	
Pour les espèces de grandes dimensions voir pl. vivaces.	
Paracaryum angustifolium (Boiss.)	1.—
» glochidiatum (Benth.)	1.—
Boraginées à belles fl. bleues; mi-soleil.	
Paradisea Liliastrium (Bert.). <i>Lis de St-Bruno</i>	0.50
» var. <i>major</i> .	
Pardanthus chinensis (Ker.)	0.50
Paris quadrifolia (L.) <i>Parisette</i> . Ombre	0.50
Parnassia asarifolia (Vent.)	1.50
» mysorensis (Heyn.)	1.50
» palustris (L.)	0.50
Lieux frais et humides.	
Paronychia argentea (Lam.)	0.50
» aurantiaca (Webb.)	0.50
» capitata (Lam.)	0.50
» cephalotes (Stev.)	0.50
» Kapella (Kern.)	0.50

	fr. c.
Paronychia nivea (D. C.)	0.50
» polygonifolia (D. C.)	0.50
» serpyllifolia (D. C.)	0.50
Petites pl. saxatiles et ramp., au port absolu- nain, aux fl. insignif. entourées de bractées brillantes et souvent très belles; sol. et sec.	
Patrinia gibbosa (Maxim.)	1.—
» intermedia (Rœm.)	0.50
» scabiosæfolia (Fisch.)	0.50
» villosa (Juss.)	1.—
Sortes de Valérianes à fl. génér. jaunes et très curieuses; juillet-octobre; mi-soleil.	
Peganum Harmala (L.)	1.50
Pelargonium Endlicherianum (Fenzl.)	2.50
Pelteria alliacea (Jacq.)	0.50
Penthorum sedoides (L.)	0.50
» var. chinensis	1.—
Pentstemon , v. pl. vivaces.	
Perovskya atriplicifolia (Bent.)	2.50
Petalostemon candidus (Michx.)	1.50
» tenuifolius (A. Gr.)	1.50
Petites Papilionacées suffrutesc. propres à gar- nir roch.; soleil.	
Petasites albus (Gært.)	0.50
» Deschmanni (Kern.)	1.50
» fragrans (Presl.). <i>Héliotrope d'hiver</i>	0.50
Fleurit tout l'hiver en pl. air s'il est à l'abri de la neige; parfum intense de vanille; lieux abrités contre gros sol. et trop grands froids; envahissant.	



Petasites fragrans.

Petasites giganteus (Schmidt)	1.—
Feuilles pouvant atteindre de gigantesques di- mensions; mi-ombre.	
niveus (L.)	0.50
» ochroleucus (Boiss.)	0.50
» officinalis (L.), humide et frais.	0.50
» Reuterianus (Jord.), feuil. avant les fl.	0.50

Tous ces Tussillages sont envahissants et propres
à garnir et à orner, grâce à leur grand et
beau feuil., les lieux frais et mi-ombragés.

Petrocallis, v. *Draba*.

Petrocoptis, v. *Lychnis*.

	fr. c.
Peucedanum alsaticum (L.)	0.50
» austriacum (Koch.)	0.50
» sibiricum (Willd.)	0.50
Phaca alpina (L.)	1.50
» astragalina (D. C.)	1.50
» australis (L.)	1.50
» frigida (L.)	1.50
Phacelia sericea (A. Gr.)	1.50
Phalangium , v. <i>Anthericum</i> .	
Phalaris arundinacea (L.), v. fol. var.	
Herbe <i>vaudoise</i> .	0.50
Phaseolus perennis (Walt.)	1.50
Phleum alpinum (L.)	0.50
Phlomis alpina (Pall.)	1.50
» brevilabris (Ehrh.)	1.50
» chrysophilla (Boiss.)	1.50
» fruticosa (L.)	1.—
» Samia (L.)	0.50
Grandes Labiées de soleil; le P. Samia est une excellente pl. viv. pour grands rochers ou pl. terre, aux grands épis dressés; fl. jaune ocre et orangé. Mai-août.	
Phlox amœna (Sim.)	0.50
» divaricata (L.). <i>P. canadensis</i>	0.50
» à fl. blanches.	0.50
* Douglasi (Hook.)	1.50
» glaberrima (L.)	1.—
* nivalis (Sweet.)	0.50
» ovata (L.)	0.50
» paniculata , v. pl. vivaces.	
» var. acuminata	0.50
» pilosa (L.)	2.50
* reptans (Michx.)	0.50
* setacea (L.)	0.50
» à fl. blanches	0.50
* stellaria (A. Gr.)	0.50
» var. purpurea .	0.50
* subulata (L.)	0.50
» var. Nelsoni	0.50
» var. The Bride	0.50
» var. vivid	0.50
» suffruticosa (Vent.)	1.—
* verna (Sweet)	0.50

Les esp. marquées d'un * sont absolument nai-
nes et rampantes; abondante floraison en
rose, rouge carmin ou blanc; avril-mai; soleil.



Phlox setacea.



Phlox subulata.



Phlox verna.

Physalis Alkekengi (L.), Coqueret, Alkékengé» **Franchetti (Mast.)** 0.50

Très intér. Solanées dont la baie, une cerise rouge, est entourée d'un calice renflé et gonflé qui forme autour du fruit une grande vésicule comme une lanterne vénitienne d'un rouge brique vif, écarlate très ardent chez Franchetti; soleil; pl. envahissantes.



Physalis Alkekengi.

	fr. c.
Physaria dydimocarpa (A. Gr.)	1.50
Physochlaina orientalis (Don)	1.50
Physostegia, v. pl. vivaces.	
Phyteuma austriacum (Beck)	1.50
* » betonicæfolium (Vill.)	1.—
» canescens (W. K.)	1.50
* » Carestiæ (Bir.)	1.—
» Charmelli (Vill.)	0.50
* » comosum (L.)	2.50
» globulariæfolium (Sternb.)	2.50
» Halleri (All.)	0.50
* » hemisphæricum (L.)	1.50
» » à fl. blanches	5.—
* » humile (Schleich.)	5.—
» limonifolium (S. S.)	0.50
» Micheli (All.)	0.50
» orbiculare (L.)	0.50
» » v. <i>nana</i>	1.50
* » pauciflorum (L.)	2.50
» Scheuchzeri (All.)	0.50
» spicatum (L.), Raiponce	0.50
» » à fl. bleues	0.50

Campanulacées à fl. génér. bleues, blanches chez le spicatum de nos pays, très jolies et curieuses. Les espèces marquées d'un * sont saxatiles et de soleil; le P. comosum exige la fente d'un roch. calc. en plein soleil. Printemps et été.




Phyteuma orbiculare.

Pimpinella magna rosea	0.50
Pinguicula alpina (L.), Grassète; fl. blanche	0.50
» grandiflora (Lam.), bleu et blanc	1.50
» longifolia (D. C.), bleu et blanc	1.50
» Reuteri (Genty.), rose et blanc	1.50
» vulgaris (L.), violet foncé	0.50

Pl. insectivores, à feuell. visqueux qui attire, prend et absorbe les mouches; racines presque nulles, à l'automne les f. disparaissent et la vie de la plante est renfermée dans un pseudobulbe qu'il faut surveiller afin que les oiseaux ne le mangent pas et qu'il faut enterrer dans le sol moussu où on le cultive. Humidité constante et, si possible, eau suintant au travers du sol ou de la roche; mai-août.

	fr. c.
<i>Plantago alpina</i> (L.)	0.50
» <i>argentea</i> (Chaix)	0.50
» <i>asiatica</i> (L.)	0.50
» <i>californica</i> (Greene)	0.50
» <i>Cynops</i> (L.)	0.50
» <i>monanthos</i> (Urv.)	0.50
» <i>montana</i> (L.)	0.50
» <i>serpentina</i> (L.)	0.50
» <i>uniflora</i> (Hook.)	0.50
» <i>vivipara</i> (Hort.)	0.50
<i>Platycodon</i> , v. pl. vivaces.	
<i>Pleurospermum pulchrum</i> (Aitch.)	0.50
<i>Plumbago Larpentæ</i> (Lindl.)	0.50
Plante basse et traçante, à fl. d'un bleu intense, assez semblable au <i>Gentiana verna</i> ; mi-omb.; août-novembre.	
<i>Poa alpina</i> (L.)	0.50
» <i>cæsia</i> (L.)	0.50
<i>Podophyllum Emodi</i> (Wall.)	1.—
» <i>peltatum</i> (L.)	1.—
<i>Podospermum laciniatum</i> (D. C.)	0.50



Podophyllum peltatum.



Polemonium coeruleum nanum.

	fr. c.
<i>Polemonium acutiflorum</i> (Willd.)	0.50
» <i>album</i> (Fisch.)	0.50
» <i>boreale</i> (Adams)	0.50
» <i>coeruleum</i> (L.), <i>Valériane grecque</i>	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » var. <i>dissectum</i>	0.50
» » var. <i>grandiflorum</i>	0.50
» <i>confertum</i> (A. Gr.)	2.50
* <i>flavum</i> (Greene)	0.50
» <i>foliosissimum</i> (A. Gr.)	2.50
» <i>gracile</i> (Willd.)	0.50
» <i>Himalayense</i> (Bak.)	0.50
» <i>humilis</i> (Rgl.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
* <i>pauciflorum</i> (Wats.)	0.50
» <i>pulchellum</i> (Bunge)	0.50
» <i>reptans</i> (L.)	0.50
» <i>Richardsoni</i> (Grah.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» <i>virginicum</i> (Rgl.)	0.50

Les Polémoines sont de bonnes pl. viv. de pl. terre ou de rocaillies, fleurissant de mai en septembre, à fl. généralement bleues, odorantes, disposées en panicules dressées; les espèces marquées d'un * sont à fl. jaunes et les *P. humile*, *pulchellum* et *reptans* sont nains ou rampants; fraîcheur; soleil, mi-soleil ou ombre.

<i>Polygala chamæbuxus</i> (L.)	1.—
» <i>atropurpurea</i>	

P. Rhodoptera

Charmante var. à fl. carmin vif et jaune, des Alpes italiennes.




Polygala chamæbuxus.

<i>Polygala Vayredæ</i> (Costa)	5.—
<i>Polygonatum biflorum</i> (Ell.)	1.—
» <i>giganteum</i> (O. et D.)	1.—
» <i>humile</i> (Fisch.)	1.—
» <i>intermedium</i> (Boreau)	1.—
» <i>Maximowiczii</i> (Schur)	1.—
» <i>multiflorum</i> (Desf.), <i>Sceau de Salomon</i>	0.50
» <i>roseum</i> (Led.)	1.—
» <i>Thunbergi</i> (Morr.)	1.50
» <i>verticillatum</i> (Desf.)	0.50
» <i>vulgare</i> (Desf.)	0.50

Plantes de sous-bois, propres à garnir les lieux frais.

	fr. c.
Polygonum affine (Don), <i>P. Brunonis</i>	0.50
» alpinum (All.)	0.50
» amplexicaule (Don)	0.50
» Bistorta (L.), <i>Bistorte</i>	0.50
» bistortioides (Pursh.)	2.50
» cymosum (Trev.)	1.50
» romanum (Jacq.), pl. filiforme et tombante	0.50
» virginianum (L.)	0.50
» viviparum (L.)	0.50

Pour les plus grandes espèces v. pl. vivaces.



Polygonum amplexicaule.



Potentilla Nepalensis.

Potentilla alba (L.), blanches	0.50
» albanica , jaune	0.50
» alchemilloides (Lap.), blanc; feuillage arg.	1.—
* » alpestris (Hall.), jaune brillant	0.50
» ambigua (Wall.), jaune vif	0.50
» anserina (L.), jaune; feuillage argenté	0.50
» apennina (Ten.)	0.50
» argentea (L.), jaune	0.50
» arguta (Pursh.), »	0.50
» argyrophila (Wall.), rouge écarlate ou jaune	0.50

Potentilla atosanguinea (Don), rouge sang foncé	0.50
* » aurea (L.), jaune vif	0.50
* » Baldensis (Kern), jaune	1.—
» carniolica (Kern), blanc et rose	0.50
» caucasica (Somm.), jaune	0.50
* » caulescens (L.), blanc	0.50
» chrysantha (Trev.), jaune pâle	0.50
* » cinerea (Chaix), jaune	0.50
* » Clusiana (Jacq.), blanc	1.50
» cryptotæniæ (Maxim.), jaune	1.50
* » cuneata (Wall.), jaune	0.50
* » delphinensis (Gr. et God.), jaune	0.50
» fragiformis (Willd.), jaune, feuil. arg.	1.—
» Friedrichseni (<i>Dahurica</i> × <i>Fruticosa</i>)	2.50
* » frigida (Vill.), jaune	1.50
» fruticosa (L.), jaune	1.—
* » fulgens (Wall.), jaune, feuil. arg.	2.50
» gelida (C. A. M.), jaune, feuil. arg.	1.—
» glandulosa (Lindl.), jaune	1.—
» gracilis (Dougl.), jaune vif	0.50
» grandiflora (L.), jaune d'or	0.50
» Haynaldiana (Janka), jaune	2.50
» Hippiana (Lehm.), jaune, feuil. arg.	0.50
» Hookeriana (Lehm.), jaune	0.50
» Hopwoodiana (Sweet), rose et rouge	0.50
» hybrida (Wall.), <i>alba</i> × <i>fragariastrum</i>	0.50
» hybrida (Hort.), pl. vivaces	
» insignis (Royle), jaune vif	0.50
» Kleiniana (Wight), du Japon	1.—
» Kotschyana (Fenz.), jaune	0.50
» Kurdica (Boiss.), jaune	0.50
» maculata (Pourr.), jaune vif	0.50
» micrantha (Ram.), blanc rosé	0.50
» millegramma (Engelm.), jaune	1.—
* » minima (Hall.), jaune	1.—
» mollis (Panc.), jaune	0.50
» Mooniana (Wight), jaune, feuil. arg.	2.50
» multifida (L.), jaune	0.50
» Nepalensis (Hook.), rose intense	0.50
» nevadensis (Boiss.), jaune	0.50
» nivalis (Lap.), blanc	1.50
* » nivea (L.), jaune	0.50
* » nitida (L.), rose tendre	1.—
» pedemontana (Reut.), jaune vif	0.50
» peduncularis (Don.), jaune	2.50
» pennsylvanica (L.), jaune	0.50
» petiolulata (Gaud), blanc, saxatile	1.—
» pygmæa (Jord.), blanc	2.50
» pyrenaica (Willd.), jaune	0.50
» recta (L.), jaune pâle	0.50
» reptans , var. fl. pl., jaune vif	0.50
» rupestris (L.), blanc	0.50
» Salesoviana (Steph.), blanc rose	2.50
» sanguisorba (Willd.), jaune	0.50
» sanguisorbæfolia (Wolf)	1.50
* » Sibbaldi (Hall.), jaune	2.50
» speciosa (Willd.), blanc jaunâtre	1.—
» splendens (Rem.), blanc rose	0.50
» Thurberi (A. Gr.), jaune	1.50
» tormentilla (Neck.), jaune	0.50
» tridentata (Soland), blanc	1.50

	fr. c.
Potentilla verna (L.), jaune	0.50
» Visiani (Panc.), jaune vif.	1.—
» Wrangeliana (Fisch.), jaune	0.50

Les espèces marquées d'un * sont basses, cespitueuses ou rampantes. Les Potentilles sont de bonnes pl. gracieuses et florifères, de cult. génér. facile; été et automne; les esp. à feuillage argenté, qui brunit souvent à l'automne et se bronze délicatement, sont très décoratives.



Potentille.

Prenanthes alba (L.)	1.—
» purpurea (L.)	0.50

Composées à petits capitules blancs ou pourpre, propres à garnir les sous-bois.

Primula (nomenclature de Pax)¹.

I. GROUPE DES ESPÈCES SAXATILES :

Primula alpina (Schleich.)	2.50
» arctotis (Kern.)	2.50
» Auricula (L.), la douz. 5 francs.	0.50
Le type des Auricules de jardins.	
» Auricula , var. <i>ciliata</i>	2.50
» Bellunensis (Kern.)	1.—
» Berninæ (Kern.)	2.50
» biflora (Huter.)	2.50
» calycina (Duby.)	1.50
» carniolica (Jacq.)	1.50
» ciliata (Moret.)	2.50
» Clusiana (Tausch.)	1.—
» commutata (Schott.)	2.50
» confinis (Schott.)	2.50
» Cottia (Widmer), rarissime et tr. belle	2.50
» crenata (Fuss.)	2.50
» deorum (Velen.), des Balkans	3.—
» discolor (Leyl.)	2.50
» Facchini (Schott.)	1.50
» Flørkeana (Salz.)	2.50
» Gœblii (Kern.)	2.50

¹ Le *Garden* a publié dans ses numéros de printemps et d'été 1902, une étude complète de ce genre au point de vue horticole, par M. H. Corrévon.

	fr. c.
Primula Heerii (Brug.)	2.50
» hirsuta (All.), la douzaine 5 francs	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» integrifolia (L.)	0.50
» Kitaibeliana (Schott.)	2.50
» marginata (Curt.)	1.—
» minima (L.)	0.50
» Muretiana (Kern.)	1.—
» nivea (Hort.)	1.50
» Oenensis (Thomas)	1.50
» Parryi (A. Gr.)	2.50
» pedemontana (Thom.)	2.50
» Portæ (Huter), rare	5.—
» Portenschlagiana (Beck.)	2.50
» pubescens (Jacq.)	0.50
» Rhætica (Gaud.)	2.50
» similis (Stein.)	2.50
» spectabilis (Tratt.)	1.50
» tirolensis (Schott.)	2.50
» venusta (Hort.)	2.50
» villosa (Wulf.)	2.50
» viscosa (All. non Vill.), <i>P. graveolens</i> , <i>latifolia</i>	2.50
» Wulfeniana (Schott.)	1.—

Tous ces Pr. fleurissent de mars en mai et préfèrent une position horizontale, dans les fentes d'un mur ou d'un rocher, au mi-soleil.



Primula integrifolia.



Primula marginata.

II. GROUPE DES ESPÈCES PALUDÉENNES :

	fr. c.
Primula algida (Adams.)	1.50
» auriculata (Lam.)	1.50
» farinosa (L.), la douzaine 5 francs.	0.50
» frondosa (Janka.)	0.50
» grandis (Traut.)	2.50
» involucrata (Wall.)	1.—
» japonica (A. Gr.), la douz. 5 francs	0.50
» » à fl. blanches,	0.50
» longiflora (All.), la douz. 10 francs	1.—
» luteola (Rupr.)	2.50
» magellanica (Hook.)	1.—
» Olgæ (Regel.)	1.50
» Parryi (A. Gr.)	2.50


*Primula farinosa.**Primula involucrata.*

	fr. c.
Primula Poissonni (Franch.), la douz., 5 fr.	0.50

Exige une couverture pour l'hiver.

» rosea (Royle)	1.—
» » var. grandiflora	1.50
» Scottica (Hook.) la douz. 10 fr.	1.—
» Sikkimensis (Hook.)	1.—
» stricta (Horn.)	1.50
» Warei (Stein) la douz. 10 fr.	1.—

Ces espèces préfèrent un sol poreux et légèrement humide, une situation fraîche et mi-ombragée.

*Primula japonica.**Primula Sieboldi.*

III. GROUPE DES ESPÈCES SILICICOLES ET DE CULTURE SPÉCIALE.

	fr. c.
Primula capitata , Hook.	2.50
L'une des plus belles; fl. d'un bleu très foncé (le vrai <i>P. capitata</i> , que nous offrons ici, est rare dans le commerce).	
» erosa (Wall.)	2.50
» Forbesi (Franch.)	1.—
» megasæfolia (Boiss.)	2.50
» mollis (Hook.)	2.50
» Sieboldi (Morr.) <i>Cortusoides amœna</i>	1.—
» » var. à fl. blanches	1.50
» » » fl. bleues	1.50
» » » fl. lilas	1.50
» » » fl. rose carmin	1.50
» » » fl. bleue int. et rose extér.	1.50
» » » fl. blanc strié rose	1.50
» » » fl. laciniées	1.50

Il faut à cette catégorie un sol dépourvu de calcaire, terre de feuilles et sable granitique et une exposition mi-ombragée.



Primula rosea.

IV. GROUPE DES ESPÈCES DE PLEINE TERRE.

Primula acaulis (Jacq.), la douz. 5 fr.	0.50
» austriaca (Wettst.)	0.50
» Carpathica (Fuss.)	0.50
» Cachemiriana (Hook)	0.50
» Columnæ (Ten.), <i>suaveolens</i>	0.50
» cortusoides (L.)	0.50
» denticulata (Smith.)	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» » à fl. lilacées	1.—
» » var. <i>pulcherrima</i>	1.—
» elatiior (Jacq.), <i>Oxlip</i>	0.50
» flagellicaulis (Kern.)	0.50
» inflata (Reich.)	0.50
» intermedia (Facch.)	0.50
» macrocalyx (Bunge)	0.50
» officinalis (Jacq.), <i>Cowslip</i>	0.50
» » var. <i>duplex</i>	0.50
» veris (L.) <i>Primevères des jardins</i>	0.50
» » variétés de toutes couleurs, formes et dimensions ; la douz. 5 fr.	0.50



Primula acaulis.



Primula cachemiriana.



Primula cortusoides.

	fr. c.
Prunella grandiflora (Jacq.)	0.50
» laciniata (L.), fl. blanches	0.50
» vulgaris (L.)	0.50
Labiales rampantes et propres à garnir les lieux secs.	



Prunella grandiflora.

Pterocephalus Parnassi (Sprgl.)	0.50
Pulmonaria angustifolia (L.)	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» azurea (Bess.)	0.50
» mollis (Wolff.)	0.50
» rubra (Schott.), fl. vermillon	1.50
» saccharata (Mill.)	0.50
Pycnanthemum lanceolatum (Pursh.)	0.50
» linifolium (Pursh.)	0.50
» muticum (Pers.)	0.50

Labiales à feuil. fortement aromatique.

Pyrethrum achillæfolium (Bieb.)	5. —
» anserinaefolium (Alb.)	2.50
» carneum (Bieb.)	0.50
» caucasicum (Willd.)	0.50
» macrophyllum (Willd.) Très grande espèce	0.50
» parthenifolium (Willd.)	0.50
» roseum (Bieb.)	0.50
» Starkianum (Alb.)	1.50

Pyrethrum (Chamæmelum) Tschihat-scheffii (Boiss.)	0.50
---	------

Ce genre a été réparti dans les Chrysanthèmes et les Chamæmelum, mais il est si connu en horticulture que nous le conservons.

Pyrola chlorantha (Sw.)	2.50
» media (Sw.)	2.50
» minor (L.)	2.50
» rotundifolia (L.)	1. —
» secunda (L.)	1. —
» uniflora (L.)	2.50

Pour bien réussir ces plantes délicieuses qui recherchent l'ombre des bois à f. caduques ou les pentes situées au nord, il faut un sol composé de terreau de feuilles, de terre franche et de sable et l'ombre. Nous les réunissons parfaitement dans nos terrines de Sphagnum.

	fr. c.
Ramonda Nataliaë (Panc.)	1.50
» pyrenaica (Rich.)	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» serbica (Panc.)	1.50

Le plus beau est certainement le *R. pyrenaica*; tous exigent les fentes rocheuses à l'ombre et une humidité constante aux racines.



Ramonda pyrenaica.

Ranunculus.

I. GROUPE DES ESPÈCES DE PLEINE TERRE.

* Ranunculus aconitifolius (L.)	0.50
* » à fl. doubles	1.50
» cardiophyllus (Hook)	1. —
» carinthiacus (Hoppe)	0.50
» carpathicus (Herb)	0.50
» Illyricus (L.)	0.50
» Kernerii (Frey)	1.50
» macrophyllus (Desf.)	0.50
» millæfoliatus (Vahl.)	1.50
» monspeliacus (L.)	1.50
» montanus (Willd.)	0.50
» pennsylvanicus (L.), var. <i>Japonicus</i>	1.50
* » platanifolius (L.)	0.50
» Sommieri (Alb.)	1. —
» Villarsii (D. C.)	0.50

Les esp. marquées d'un * sont à fl. blanches.



Ranunculus parnassifolius.

II. ESPÈCES SAXATILES OU DES HAUTS SOMMETS

A PORT BAS :

	fr. c.
<i>Ranunculus alpestris</i> (L.)	0.50
» <i>amplexicaulis</i> (L.)	1.—
» (<i>Callianthemum</i>) <i>anemonoides</i> (Zahl.)	2.50
» <i>bilobus</i> (Bert.)	1.50
» <i>crenatus</i> (W. K.)	1.50
» <i>glacialis</i> (L.)	1.—
* <i>gramineus</i> (L.)	1.—
» <i>parnassifolius</i> (L.)	1.—
» <i>pyrenæus</i> (L.)	0.50
» (<i>Callianthemum</i>) <i>rutifolius</i> (L.)	1.—
» <i>Seguieri</i> (Vill.)	1.50
* <i>Thora</i> (L.), à feuillage orbiculaire, très curieuse	0.50
» <i>Trautvetterii</i> (Hoppe)	2.50

Toutes sont à fl. blanches ou roses, sauf celles marquées d'un * qui sont à fl. jaunes; ro-caille; mi-soleil; avril-juin.

III. ESPÈCES AQUATIQUES OU PALUDÉENNES :

<i>Ranunculus aquatilis</i> (L.)	1.—
» <i>Lingua</i> (L.)	0.50
» <i>reptans</i> (L.)	1.—
<i>Reseda complicata</i> (Bory)	0.50
» <i>glaucula</i> (L.)	0.50
» <i>virgata</i>	0.50
<i>Rhaponcticum cynarioides</i> (Less.)	1.50
» <i>Heleniifolium</i> (G. G.)	1.50
» <i>nitidum</i> (Fisch.)	1.50
» <i>pulchrum</i> (Fisch.)	1.50



Rhaponticum scariosum.

<i>Rhazia orientalis</i> (D. C.)	0.50
<i>Rheum</i> , v. pl. vivaces	
<i>Rhizobotrya alpina</i> (Tausch.)	1.50
<i>Rhodiola linifolia</i> (D. C.)	0.50
» var. <i>rubra</i> (Rgl.)	1.—
» <i>ovata</i> (Rgl.)	0.50
» <i>rosea</i> (L.), <i>Sedum Rhodiola</i>	0.50
» <i>Scopolini</i> (Kern)	1.—

<i>Rhododendron chamæcistus</i> (L.)	5.—
» <i>ferrugineum</i> (L.), pl. fortes	5.—
Absolument acclimatées et couvertes de boutons.	
» <i>hirsutum</i> (L.)	5.—
» <i>Kamtschaticum</i> (Pall.)	10.—
» <i>myrtifolium</i> (Lodd.)	5.—

Pour les autres espèces v. arbustes.

Les Rhod. des Alpes (Rose des Alpes ou Rosage) sont des plus difficiles à acclimater par le transport de leurs stations naturelles dans les jardins. Il faut les élever par semis ou marcottes si l'on veut obtenir des sujets dont la reprise et la floraison sont assurées. Ceux que nous offrons sortent des pépinières d'un spécialiste qui les élève pour nous; ils sont absolument acclimatés.

<i>Rodgersia podophylla</i> (A. Gr.)	1 —
Curieuse Saxifragée japonaise très rustique, à feuillage décoratif; mi-ombre et fraîcheur.	

<i>Romanzoffia Sitchensis</i> (Bong.)	1.50
Petite Hydrophyllée à fl. blanc pur, des confins de l'Alaska, fleurissant tout l'été; fraîcheur; mi-ombre.	

<i>Roripa pyrenaica</i> (Spach.)	0.50
<i>Rosa</i> , v. <i>Arbustes</i> .	

<i>Roscoeæ purpurea</i> (Sm.)	2.50
» var. <i>Sikkimensis</i> (Elwes)	2.50

<i>Rubia Aucheri</i> (Boiss.)	1.—
» <i>tinctorum</i> (L.), <i>Garance</i>	0.50
Pl. envahiss., propre à garnir les lieux chauds arides.	

<i>Rubus arcticus</i> (L.), <i>Framboise du Cap Nord</i>	1.—
» v. <i>folcundus</i> (Rgl.)	1.50
» <i>nutans</i> (Wall.)	1.50
» <i>saxatilis</i> (L.)	0.50
» <i>Xanthocarpus</i> (Bur. et Fr.)	1.50

Pour les autres Ronces v. arbustes ou pl. grim-pantes.

<i>Rumex alpinus</i> (L.), « <i>Lappis</i> »	0.50
» <i>flexuosus</i> (Sol.)	1.50
» <i>nivalis</i> (Heg.)	1.50
» <i>salicifolius</i> (Weinm.), de <i>Californie</i>	0.50
<i>Sagina Boydei</i> (Hort. Angl.)	0.50
» <i>Linnæi</i> (Presl.)	0.50
» v. <i>major</i>	0.50
» <i>procumbens</i> (L.)	0.50
» <i>subulata</i> (Presl.)	0.50

Petites Carioph. rampantes à l'aspect de Mœhringiens ou d'Alsines, tapissant rapidement le sol; fl. blanches, nombreuses; été; mi-ombre.

<i>Salix</i> , v. <i>arbustes</i> .	
<i>Salvia acaulis</i> (Vahl.)	0.50
» <i>acetabulosa</i> (L.)	1.—
» <i>armena</i> (Koch.)	1.—
» <i>austriaca</i> (L.)	0.50
» <i>Beckeri</i> (Trautv.)	1.—
» <i>dominica</i> (L.)	1.—
» <i>grandiflora</i> (Esling.)	1.—
» <i>Hyans</i> (Royle)	1.—
» <i>japonica</i> (Thunb.)	0.50
» <i>Monthretii</i> (Benth.)	1.—
» <i>officinalis</i> (L.)	0.50
» à fl. blanches	1.—
» <i>pratensis</i> (L.)	0.50

	fr. c.
Salvia pratensis à fl. blanches	1.50
» » à fl. roses	1. —
» Przewalskyi (Maxim.)	1. —
» Regeliana (Trautv.)	0.50
» sylvestris (L.)	0.50
» verbascifolia (Bieb.)	0.50
» virgata (Ait.)	0.50

Pour les grandes espèces voir pl. vivaces.



Salvia pratensis.

Samolus floribundus (Kunth.)	0.50
» repens (Pers.)	2.50
» » <i>var. littoralis</i>	2.50
» Valerandi (L.)	0.50

Petites Primulac. à fl. blanches, recherchant l'humidité.

Sanguinaria canadensis (L.)	0.50
Sanguisorba canadensis (L.)	0.50
» dodecandra (Mor.)	0.50
Sanicula arctopioides (Hook.)	0.50
» bipinnatifida (Dougl.)	0.50
» europæa (L.)	0.50
» Marylandica (L.)	1.50
» Menziesii (Hook.)	0.50

Pl. pour sous-bois.



Santolina.

	fr. c.
Santolina chamæcyparissus (L.)	0.50
» incana (Lam.)	0.50
» pinnata (Viv.)	0.50
» rosmarinifolia (L.)	0.50

Excellentes pl. buissonneuses pour constituer des bordures.

Saponaria bellidifolia (L.), fl. jaunes	0.50
* » cæspitosa (D. C.)	0.50
» glutinosa (Bieb.)	1.50
* » lutea (L.), fl. jaunes	2.50
* » ocymoides (L.), la douzaine 5 francs	0.50
* » » splendens	0.50
» officinalis (L.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. blanches pleines	0.50
* » pulvinaris (Boiss.)	2.50

Les espèces marquées d'un * sont à port nain et rampant ; *S. ocymoides* est l'une des meill. pl. de rocailles ; fl. rose vif. très nombr. ; mai-juin.



Saponaria ocymoides.

Satureya diffusa (Benth.)	0.50
» illyrica (Host.)	0.50
» montana (L.)	0.50
» pygmæa (Sibt.)	0.50

Petites Labiées aromatiques en arbustes nains et serrés, aux rameaux et aux fl. innombrables. Été et automne.

Saussurea albens (Hook.)	1.50
» alpina (D. C.)	0.50
» candicans (Clark.)	2.50
» decurrens (Wink.)	1.50
» depressa (Gren. God.)	1.50
» denticulata (Wall.)	2.50
» discolor (D. C.)	1.50
» hypoleuca (Spr.)	2.50

	fr. c.
Saussurea Maximowiczii (Herd.)	1.50
» pygmæa (Spr.)	2.50
» sordida (Kar. et Kit.)	2.50
» Tanakæ (Franch.)	2.50
» uniflora (Wall.)	2.50

Jolies Composées à fl. bleues et roses, en capitules serrés.



Saxifraga cordifolia.



Saxifraga crassifolia.



Saxifraga ligulata.

Saxifraga.

Section *Bergenia* ou *Megasea*.

Saxifraga ciliata (Wall.)	0.50
» cordifolia (Haw.)	0.50
» crassifolia (Haw.)	0.50

	fr. c.
Saxifraga ligulata (Wall.)	0.50
» purpurascens (Hort.)	0.50
» Stracheyi (Hook.)	0.50

Cette section renferme des espèces à larges feuilles, épaisses, souvent luisantes et poilues sur les bords. Fl. généralement rose vif, ramassées en grappes serrées et apparaissent chez plusieurs espèces de très bonne heure au printemps.

Section *Boraphyla*.

Saxifraga Forbesii (Vasey)	2.50
» erosa (Pursh.)	2.50
» Hieracifolia (W. K.)	1.50
» integrifolia (L.)	2.50
» nivalis (L.)	1.—
» pennsylvanica (L.)	2.50
» stellaris (L.)	1.—
» Virginensis (Michx.)	1.—

Ce groupe comprend des espèces qui aiment la fraîcheur et l'humidité. R.; mi-s. Les nos 1 et 5 sont des plantes des Hautes Alpes, croissant près des sources et ne s'élevant pas à plus de 5 ou 10 cm.; les nos 3 et 5 sont des plantes du nord, à f. épaisses et spatulées, à petites fl. d'un blanc rougeâtre; nos 2 et 4 sont des espèces curieuses, à f. entières et allongées, à fleurs rougeâtres. Avril-mai.

Section *Cymbalaria*.

Saxifraga Cymbalaria (L.)	0.50
» Huettiana (Boiss.)	0.50

Petites pl. annuelles ou bisannuelles à fleurs nombreuses, d'un jaune vif, à feuillage luisant et gai, formant de petites touffes très élégantes qui fleurissent de mai en automne. R. ou vieux murs; o. et fraîcheur.

Section *Dactyloides*.

Saxifraga adscendens (L.)	0.50
» ajugæfolia (L.)	1.—
» Allionii (Gaud.)	0.50
» androsacea (L.)	0.50
» aquatica (Lap.)	1.50
» atropurpurea (Sternb.), à fl. rouge foncé	2.50
» Blavii (Beck.)	1.—
» cæspitosa (L.)	0.50
» Camposii (Boiss.)	1.50
» canaliculata (Boiss.)	0.50
» cantabrica (Boiss.)	0.50
» capitata (Lap.)	0.50
» citrina (Heg.)	1.—
» coniferæ (Coss.)	1.50
» ceratophylla (Dryand.)	0.50
» Corbariensis (Timb.)	2.50
» cuneata (Willd.)	5.—
» cymosa (W. K.)	2.50
» decipiens (Ehr.)	0.50
» densa (Willd.)	0.50
» exarata (Vill.)	0.50
» geranioides (L.)	0.50
» Gibraltarica (Boiss.)	1.50

	fr. c.
Saxifraga globosa (Hort.)	0.50
» globulifera (Desf.)	1.50
» hibernica (Haw.)	0.50
» hypnoides (L.)	0.50
» islandica (Sternb.)	0.50
» lævis (Haw.)	0.50
» moschata (Wulf.)	1. —
» Mureti (Ramb.)	2.50
» muscoides (All.)	0.50
» pedata (Kam.)	0.50
» pedatifida (Ehr.)	0.50
» pedemontana (All.)	2.50
» planifolia (Lap.)	2.50
» polyphilla (Rgl.)	0.50
» Prostii (Sterub.)	1. —

Très belle espèce à croissance lente.

» pubescens (D. C.)	0.50
» pulchella (Don.)	0.50
» recurvifolia (Lap.)	1. —
» Seguieri (Spr.)	1.50
» Sponhemica (Gmel.)	0.50
» Sternbergii (Willd.)	0.50
» stenopetala (Gaud), à fl. jaune citron	2.50
» trifida (Haw.)	0.50
» varians (Sieb.)	0.50

Les plantes de cette section sont des espèces moussues et cespitueuses, à rameaux étalés sur le sol qu'ils recouvrent à la manière des mousses; feuillage finement divisé; fleurs blanches ou roses. R. ou pl. t.; o. ou mi-seuil. Excellentes pour bordures. Mai-juin.




Saxifraga hypnoides.

Section *Diptera*.

Saxifraga cortusæfolia (Sieb. Zucc.)	2.50
* » cuscutæformis (Lodd.)	2.50
» Fortunei (Hook.)	1.50
* » Japonica (Hort.)	1. —
* » sarmentosa (L.)	0.50
» Tellimoides (Maxim.)	1.50
» Tosænsis (Matsum.)	1.50

Ces espèces sont chinoises ou japonaises et celles marquées d'un * présentent le port de pl. sarmenteuses, tombantes, formant de longs filaments grêles au bout desquels se développent de nouvelles plantes; rustiques ou mi-rustiques; position abritée.




Saxifraga sarmentosa.

Section *Euaizoonia*.

	fr. c.
Saxifraga aizoon (L.)	0.50
» » atropurpurea , à fl. rose vif	5. —
» » brevifolia (Sternb.)	0.50
» » bulgarica	2.50
» » Churchilli (Huter.)	0.50
» » dubia (Hort.)	0.50
» » Malyi (Schott.)	0.50
» » minor (Hort.)	0.50
» » robusta (Hort.)	0.50
» altissima (Kern.)	1. —
» australis (Moric.)	1. —
» Balcana (Keller)	2.50
» carinthiaca (Schott.)	1. —
» cartilaginea (Willd.)	1. —
» catalaunica (Boiss.)	1. —
» cochlearis (Reich.)	1. —
» cotyledon (L.)	0.50
» crustata (Vest.)	1. —
» cultrata (Schott.)	1. —
» demissa (Schott.)	5. —
» elatiior (Mert. Kit.)	0.50
» Fosteri (Hort.)	1. —
» Gaudini (Brüg.)	1. —
» Hostii (Tausch.)	0.50
» intacta (Willd.)	0.50
» Kolenatiana (Rgl.)	1.50
» Lagraveana (Hort.)	1.50
» Lantoskana (Boiss.)	1. —
» lingulata (Bell.)	1. —
» linguæformis (Hort.)	1. —
» longifolia (Lap.)	1. —

Position verticale entre les pierres d'une rocaille ou dans un vieux mur; soleil.

» longifolia-cotyledon	2.50
» longifolia-cochlearis	2.50
» » var. major	2.50
» mutata (L.)	0.50
» notata (Schott.)	0.50
» pectinata (Schott.)	0.50
» Portæ (Stein.)	0.50
» pyramidalis (Lap.)	1. —
» pyrenaica (Vill.)	1. —



Saxifraga longifolia dans un mur du Jardin alpin d'acclimation.

	fr. c.
Saxifraga recta (Lap.)	1.—
» robusta (Schott.)	1.—
» rhætica (Kern.)	1.—
» rosularis (Schleich.)	1.—
» sempervivum (Koch.)	1.—
» Stabiana (Ten.)	0.50
» Stenoglossa (Tausch.)	0.50
» sturmiana	0.50
» transylvanica (Fuss.)	0.50
» Vochinensis (Hort.)	1.50
» Zimmererii (Kern.)	1.50
» Zeileborii (Schott.)	1.50
» » sp. Vénétie	2.50

Originaires des lieux rocheux et ensoleillés des montag. de l'Eur. ; le feuillage, durci par la chaleur, crustacé, d'un vert grisâtre, souvent recouvert d'une poussière blanchâtre, offre un aspect très particulier et une grande résistance qui permet de les considérer comme très robustes ; soleil, rocher ; le *S. mutata* seul recherche un sol frais, et, tandis que les fleurs des autres espèces sont blanches, souvent pointillées de pourpre, celles-ci sont d'un rouge brun vif. Mai-août.



Saxifraga aizoon.



Saxifraga cotyledon.

Section Hirculus.

	fr. c.
Saxifraga Hirculus (L.)	1.50
» » grandiflora	2.50

Pl. marécageuses, aimant la tourbe et les lieux frais ; fleurs jaune orangé ; mai-juillet.

Section Isomeria.

Saxifraga aconitifolia (Field.)	1.50
--	------

R. ; lieux frais et mi-ombragés ; fleurs blanches.
Mai-juin.

Section Kabschia.

Saxifraga apiculata (Engl.)	1.50
» aretioides (Lap.)	1.50
» Boydei (Hort.)	2.50
» » à fl. blanches	2.50
» Burseriana (L.)	1.50
» » grandiflora	2.50
» cæsia (L.)	2.50
» calyciflora (V. media)	2.50
» coriophylla (Gris.)	2.50
» diapensioides (Bell.)	2.50
» Ferdinand-Coburgi (Kell.)	5.—
» Friedrich-Augusti (Bias.)	5.—
» juniperifolia (Adans.)	1.50
» Kotschy (Boiss.)	2.50
» luteo-viridis (S. et K.)	2.50
» marginata (Sternb.)	2.50
» media (Gouan.)	2.50
» pseudo-sancta (Janka)	2.50
» Rocheliana (Sternb.)	2.50
» Salomoni (Vel.)	2.50
» Scardica (Gris.)	2.50
» patens (Gaud.)	2.50
» sancta (Gris.)	2.50
» squarrosa (Sieber.)	2.50
» Tombeanensis (Boiss.)	1.50
» Tyrolensis (Kern.)	2.50
» Valdensis (D. C.)	2.50
» Vandelli (Sternb.)	1.50

C'est ici la plus jolie, la plus intéressante section du genre ; les espèces qui la composent forment toutes de petites touffes en boules ou en pelotes, à feuillage serré, composées d'une infinité de petites rosettes serrées, les unes contre les autres, et émettant au printemps (de mars en juin suivant les espèces) un gr. nombre de fleurs blanches ou jaunes. Roc. Sol.

Section Miscopetalum.

Saxifraga Græca (Boiss.)	1.—
» Heucherifolia (Kern.)	1.—
» lasiophylla (Schott.)	0.50
» repanda (Willd.)	1.—
» Melliana (Boiss.)	1.—
» rotundifolia (L.)	0.50
» Taygetæa (Boiss.)	1.—

Feuilles généralement orbiculaires, dentées sur les bords ; fleurs blanches souvent ponctuées de pourpre et disposées sur des tiges paniculées, hautes de 10 à 80 cm. R. ou pl. t. ; fraîcheur et mi-o. ; Mai-août.

Section Nephrophyllum.

	fr. c.
Saxifraga bulbifera (L.)	0.50
» carpathica (Reich.)	2.50
» cernua (L.)	1.50
» corsica (Gr. God.)	2.50
» granulata (L.)	0.50
» » à fl. doubles.	1.50
» irrigua (Bieb.)	0.50
» odontophylla (Wall.)	2.50

Position humide ou les lieux frais ; fl. blanches.
R. ou pl. t. ; mi-soleil. Mai-juin.

Section Peltiphyllum.

Saxifraga Peltata (Torr. Gr.)	1.50
--	------

Bell. et grand. esp. de Californie ; feuil. en parasol retourné, mesurant parfois 60 cm. de diamètre, à fl. roses disposées en grappe au sommet d'une tige épaisse, charnue et garnie de poils bruns, haute de près d'un mètre. Sol profond et très poreux, frais et riche en humus. Mi-soleil. Juin-juillet.

Section Porphyron.

Saxifraga biflora (All.)	1.50
» blepharophylla (Kern.)	2.50
» oppositifolia (L.)	0.50
» » à fl. blanches.	2.50
» » v. <i>grandiflora</i>	1.50
» » v. <i>pyrenaica</i>	1.50
» retusa (Gouan.)	2.50
» Rudolphiana (Horn.)	2.50

Touffes naines et étalées sur le sol, formant des gazons plus ou moins épais et denses, se recouvrant en mars-avril-mai de fleurs sessiles d'un rose vif, carmin foncé ou clair, ou rouge brique suivant les espèces, et produisant le plus charmant effet. R. O. ou mi-sol.

Section Robertsonia.

Saxifraga apennina (Bert.)	0.50
» Andrewsi (Harw.)	0.50
» Colvillei (Hort.)	1.—
» cuneifolia (L.)	0.50
» » v. <i>multicaulis</i>	1.—
» » v. <i>subintegra</i>	1.—
» Forsteri (Stein.)	1.50
» Geum (L.)	0.50
» Geum v. <i>Doni</i> (Stern.)	1.—
» » v. <i>Linnæi</i> (Sternb.)	1.—
» » v. <i>reniformis</i> (Hort.)	1.—
» hirsuta (L.)	0.50
» serratifolia (Hort.)	1.—
» umbrosa (L.), <i>London Praide</i>	0.50

Bonnes plantes connues sous le nom de « Désespoir du peintre » à cause de la finesse de leurs fleurs blanches pointillées de pourpre et disposées en épis ou panicules dressés ; feuillage très élégant. Excellentes pour bordures ou pour garnir les niches de roc à l'ombre ou au mi-s. Mai-juin.



Saxifraga Andrewsii.



Saxifraga umbrosa.

Section Trachyphyllum.


	fr. c.
Saxifraga aspera (D. C.)	0.50
» aizoides (L.)	0.50
» bronchialis (L.)	1.—
» bryoides (L.)	0.50
» Haussmanni (Kern.)	1.50
» Regelii (Kern.)	1.50
» Stelleriana (Mert.)	1.—
» tenella (Wulf.)	1.—
» tricuspidata (Retz.)	1.—
Pl. cespitueuses formant des touffes, à feuilles velues-ciliées ou nues, à fl. blanches, jaunes ou rougeâtres, recherchant les sols humides et mi-ombragés ; R. Mai-août.	
Scabiosa caucasica (Bieb.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» graminifolia (L.)	0.50
» japonica (Miq.)	0.50
» lucida (Vill.)	0.50
» ochroleuca (L.), fl. jaunes	0.50
» silenifolia (W. K.)	0.50
» vestina (Facch.)	1.50

Le Scab. Caucas. est une pl. superbe, à grands capitules bleu lilas ou blanc pur ; graminifolia a les f. étroites et argentées et les capitules lilas clair ; c'est une excell. pl. de rocail., qui fleurit tout l'été et l'aut., et tapisse sur un grand espace ; soleil.



Scabiosa caucasica.

	fr. c.
Schivereckia (<i>Alyssum</i>) Bornmülleri (Haussk.)	0.50
» podolica (And.)	0.50
Scilla , v. pl. bulbeuses.	
Scirpus , v. pl. paludéennes.	
Scopolia carniolica (Jacq.), mars-avril	1.50
» japonica (Maxim.)	1.50
» lurida (Don.)	1.50
» viridiflora (Frey.)	1.50
Curieuses Solanées aux fl. en cloches, rouge brun ou verdâtre; mi-o.	
Scorodosma foetidum , v. <i>Ferula Asafoetida</i> .	
Scorzonera austriaca (Willd.)	2.50
» purpurea (L.)	0.50
» rosea (W. K.)	2.50
Scrophularia alata (Gilib.)	0.50
» canina (L.)	0.50
» Hoppii (Koch.)	0.50
» juratense (Schleich.)	0.50
» marylandica (L.)	0.50
» pyrenaica (Benth.)	0.50
» vernalis (L.)	0.50



Scutellaria alpina.

	fr. c.
Scutellaria albida (L.)	0.50
» alpina (L.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » v. <i>bicolor</i>	0.50
» » <i>lupulina</i>	0.50
» altissima (L.)	0.50
» japonica (Morr.)	0.50
» macrantha (Fisch.), à très gr. fleurs	1.50
» orientalis (L.)	0.50
» resinosa (Torr.)	1.50
» splendens (Link.)	1.50

Labiées à fl. plus ou moins grandes et nombr., en épis plus ou moins serrés; pl. généralement touffues et basses; Sc. alpina est une plante naine et saxatile pouvant constituer des bordures; mai-septembre; soleil.



Scutellaria macrantha.

Sedum.

I. ESPÈCES NAINES, CESPITEUSES ET ESSENTIELLEMENT SAXATILES :

Sedum acre (L.)	0.50
» » à feuil. dorées	0.50
» Alberti (Rgl.)	0.50
» albescens (Haw.)	0.50
» album (L.)	0.50
» » v. <i>pallesces</i> (Hartm.)	0.50
» » v. <i>turgidum</i> (D. C.)	0.50
» » v. <i>virens</i>	0.50
» Alberti (Hance.)	1.50
» algidum (Ld.)	0.50
» altissimum (Poir.)	0.50
» amplexicaulis (D. C.)	0.50
» Anacampseros (L.), fl. pourpre foncé	0.50
» Andersonnii (Don.)	0.50
» anglicum (Huds.)	0.50
» annuum (L.)	0.50
» anopetalum (D. C.) <i>ochroleucum</i>	0.50
» athoum (D. C.)	0.50
» atratum (L.)	0.50
» Beyrichianum (Mich.)	1 —
» bithynicum (Boiss.)	1. —
» Boloniense (Lois.)	0.50



Sedum album.

	fr. c.
Sedum brevifolium (D. C.)	1. —
» cœruleum (Vahl.)	0.50
» corsicum (Duby)	1. —
» crista Galli (Hort.)	0.50
» dasiphyllosum (L.), jolie esp. murale	0.50
» Douglasii (Hook.)	1.50
» glaucum (W. K.)	0.50
» hybridum (L.)	0.50
» Kamtschaticum (Fisch.), jaune-brill.	0.50
» » à feuell. panach. de jaune et vert.	0.50
» Lydium (Boiss.)	0.50
» magellense (Ten.) <i>Olympicum</i>	0.50
» Maweanum (Hort.)	1.50
» montanum (Perr. et Song.)	0.50
» multiceps (Dur.)	1.50
» Newii (A. Gr.)	1. —
» nicaense (All.)	1. —
» obtusatum (A. Gr.)	2.50
» oppositifolium (Sims.)	0.50
» Oreganum (Nutt.)	1. —
» ovatum (Rgl.)	1.50
» oxypetalum (H. B.)	2.50
» pruinatum (Brot.)	0.50
» pulchellum (Mich.), fl. rose-chair.	1.50
» reflexum (L.)	0.50
» » v. cristatum (Hort.)	1. —
» repens (Schleich.)	0.50
» Rhodantum (A. Gr.)	1.50
» rubens (D. C.), <i>Crassula rubens</i>	0.50
» rupestre (L.)	0.50
» sarmentosum (Bunge.)	1. —
» sexangulare (L.)	0.50
» Sieboldi (Don.) (type)	0.50
» » (Hort.)	0.50
» spathulifolium (Hook.)	2.50
» Stahlia (v. <i>Solms</i> ¹)	
Très bell. esp. nouvelle des hautes mont. mexic.	
» stellatum (L.)	0.50

¹ Im Samenkatalog des K. K. Bot. Gart. Strassburg, 1900.

	fr. c.
Sedum stenopetalum (Pursh.)	2.50
» stoloniferum (Gmel.) belles fl. roses.	0.50
» tenellum (Bieb.)	0.50
» ternatum (Mich.)	2.50
» trifidum (Wall.)	5. —
» turkestanicum (Rgl.)	0.50
» Verloti (Gren. God.)	0.50
» verticillatum (L.)	2.50
» villosum (L.)	1. —


Tous ces Orpins, à fl. jaunes, blanches ou roses, sont d'entre les plus solides et les meill. pl. pour garnir les roch. et les murs au soleil ou les pentes arides. Ils fleurissent longtemps et résistent aux plus fortes sécheresses.




Sedum dasiphyllosum.



Sedum Kamtschaticum.



Sedum pulchellum.



Sedum stoloniferum.

II. ESP. A TIGES DRESSÉES, FORMANT DES TOUFFES PLUS OU MOINS ÉLEVÉES :

	fr. c.
Sedum Aizoon (L.)	0.50
» v. <i>Scabrum</i> (Maxim.)	0.50
» asiaticum (D. C.)	2.50
» atropurpureum (Hort.), feuillage brun foncé	1.50
» atrosanguineum (Hort.)	1.50
» carpathicum (Reuss.)	1.—
» Carrioni (Bor.)	1.—
» Euphorbioides (Schlecht)	2.50
» Fabaria (Koch)	0.50
» Fabaria × carpathica	2.50
» Kirilowi (Rgl.)	1.50
» Maximowiczii (Rgl.)	0.50
» maximum (Sut.)	0.50
» Middendorffianum (Maxim.)	0.50
» populifolium (L.), petit arbuste dressé	0.50
» Rhodiola , v. <i>Rhodiola rosea</i> et vars.	
» spectabile (Bor.), belles fl. roses	0.50
» telephioides (Mich.)	2.50
» Telephium (L.)	0.50
» v. <i>Carrioni</i> (Bor.)	1.50
» v. <i>haematodes</i> (Mill.)	1.50
» v. <i>purpurascens</i> (Hort.)	0.50

Ces esp. sont fortes et solides, général. très flor., à fl. roses, jaunes ou blanches, et propres à garnir les grands rochers et les plates-bandes; sol. ou mi-soleil.



Sedum Maximowiczii.



Sedum maximum.



Sedum spectabile.

	fr. c.		fr. c.
Selaginella, v. au chap. <i>Fougères</i> .		<i>Sempervivum glaucum</i> (Ten.)	0.50
Selliera radicans (Cav.), <i>Goodenia radicans</i>	2.50	* » <i>globiferum</i> (L.)	1.—
<i>Sempervivum</i> ¹ .		» <i>grandiflorum</i> (Hampe)	1.—
» <i>acuminatum</i> (Schott)	1.—	» <i>Greenii</i> (Hort.)	2.50
» <i>admontensis</i> (Defr.)	1.—	» <i>Haussmanni</i> (Schnittsp.)	1.—
» <i>affine</i> (Lamot.)	1.—	» <i>heterotrichum</i> (Schott.)	1.—
* » <i>albidum</i> (Schnittsp.)	1.—	* » <i>Heuffelii</i> (Schott)	1.—
» <i>alpestre</i> (Lamot.)	1.—	* » <i>hirtum</i> (L.)	0.50
» <i>alpinum</i> (Gris.)	1.—	» <i>Huteri</i> (Schnittsp.)	1.—
» <i>angustifolium</i> (Kern.)	1.—	» <i>hybridum</i> (Brüg.)	1.—
» <i>anomalum</i> (Lag.)	1.—	» <i>juratense</i> (Jord.)	0.50
» <i>arachnoideum</i> (L.)	0.50	* » <i>Kapaornikense</i> (Panc.)	2.50
» » v. <i>Gnaphalium</i>	1.—	» <i>Laggeri</i> (Schott)	1.—
» » v. <i>minimum</i>	1.—	» <i>Laharpaii</i> (Corr.)	1.—
» <i>arvernense</i> (Lec. et Lamot.)	1.—	» <i>Lamottei</i> (Bor.)	1.—
» <i>assimile</i> (Schott)	2.50	» <i>latifolium</i> (Hoffm.)	0.50
» <i>atlanticum</i> (Ball.)	2.50	» <i>Mettenianum</i> (Schnittsp.)	1.—
» <i>atropurpureum</i> (Hort.)	1.—	» <i>Moggrigei</i> (de Smett)	1.—
» <i>atroviolaceum</i> (Hort.)	0.50	» <i>montanum</i> (L.)	0.50
» <i>austriacum</i> (Nym.)	1.—	» <i>murale</i> (Bor.)	0.50
» <i>barbulatum</i> (Schott)	1.—	» <i>Murithi</i> (Lag.)	2.50
» <i>blandum</i> (Schott)	1.—	* » <i>Neilreichii</i> (Schott)	1.—
» <i>Boissieri</i> (Baker)	1.—	» <i>obscurum</i> (Hort.)	1.—
» <i>Bourgeanum</i> (Lamot.)	1.—	» <i>ornatum</i> (Hort.)	1.—
» <i>Boutignianum</i> (Bill.)	0.50	* » <i>patens</i> (Griseb.)	1.—
» <i>Braunii</i> (Funk.)	1.—	» » var. <i>glaucum</i>	2.50
» <i>brevifolium</i> (Hort.)	1.—	» <i>penninum</i> (Lag.)	1.—
» <i>bryoides</i> (Schnittsp.)	1.—	» <i>piliferum</i> (Jord.)	1.—
» <i>Bungeanum</i> (Led.)	1.—	» <i>pilosella</i> (Schnittsp.)	1.—
» <i>calcareum</i> (Jord.) <i>Californicum</i> ²	0.50	* » <i>Pittonii</i> (Schott)	2.50
» <i>Caucasicum</i> (Rupr.)	1.—	» <i>Pomelii</i> (Lam.)	1.—
» <i>Chavini</i> (Lag.)	2.50	» <i>pumilum</i> (Bieb.)	1.—
* » <i>ciliatum</i> (Schur) <i>ciliosum</i> Panc.	1.—	» <i>pyrenaicum</i> (Jord.)	1.—
» <i>cinarescens</i> (Panc.)	2.50	* » <i>Reginæ Amaliæ</i> (Heldr.)	1.—
» <i>Comolii</i> (Rotta)	1.—	» <i>Requienii</i> (Lehm.)	1.—
» <i>commutatum</i> (Hampe)	1.—	» <i>Rhæticum</i> (Brüg.)	2.50
* » <i>cornutum</i> (Schnittsp.)	0.50	» <i>robustum</i> (Hampe)	1.—
» <i>Cottetti</i> (Lag.)	2.50	» <i>rubellum</i> (Timbal-Lag.)	1.—
» <i>debile</i> (Schott)	1.—	» <i>rubicundum</i> (Lehm.)	1.—
» <i>Delassoiei</i> (Schnittsp.)	1.—	» <i>rupicolum</i> (Kern.)	2.50
» <i>Delponti</i> (Lag.)	1.—	» <i>ruthenicum</i> (Koch.)	1.—
» <i>Doëllianum</i> (Lehm.)	1.—	» <i>sanguineum</i> (Hort.)	0.50
» <i>dolomiticum</i> (Facch.)	1.—	» <i>Schlehani</i> (Schott)	1.—
» <i>elegans</i> (Lag.)	2.50	» <i>Schottii</i> (Lehm.)	1.—
» <i>Fauconnetti</i> (Reut.)	2.50	» <i>Seguieri</i> (D. C.)	1.—
» <i>fimbriatum</i> (Schnittsp.)	1.—	» <i>serpyllifolium</i> (Hort.)	1.—
» <i>flagelliforme</i> (Fisch.)	1.—	* » <i>soboliferum</i> (Sims.)	0.50
» <i>Fontanæ</i> (Brüg.)	2.50	» <i>speciosum</i> (Lamot.)	1.—
» <i>frigidum</i> (Lamot.)	1.—	» <i>spinulosum</i> (Lag.)	1.—
» <i>Funkii</i> (Braun)	0.50	» <i>spinulifolium</i> (Hort.)	1.—
* » <i>Gaudini</i> (Christ)	1.—	» <i>Studeri</i> (Kern.)	1.—
» » à fl. roses (<i>Christii</i>)	2.50	» <i>tectorum</i> (L.), <i>Joubarbe</i> , la douz. 5 fr.	0.50
		» » v. <i>bicolor</i>	1.—
		» » v. <i>densum</i>	1.—
		» » v. <i>glaucum</i>	1.—
		» » v. <i>pulchrum</i>	1.—
		» » v. <i>violaceum</i>	1.—
		» <i>tenellum</i> (Hort.)	1.—
		» <i>Theobaldi</i> (Brüg.)	2.50
		» <i>Thomayeri</i> (Corr.)	2.50
		» <i>Tissieri</i> (Lag.)	2.50
		» <i>tomentosum</i> (Lehm.)	1.—

¹ Nous avons collectionné depuis 20 ans toutes les esp. et var. de *Sempervivum* qu'il nous a été possible de rencontrer dans les jardins ou dans la nature. Malheureusement la nomenclature de ce genre si embrouillé est très compliquée. Nous nous livrons à une étude spéciale de ces pl. et serons reconnaissants à tous ceux qui voudraient nous aider à compléter cette collection.

² Ce nom de *Semp. californicum*, très répandu en horticulture, est un pur paradoxe. Il n'existe pas de *Sempervivum* en Californie, ni même en Amérique.

Sempervivum triste (Hampe)	fr. c.
» Valesiacum (Lehm.)	1.—
» Velenowsky (Kell.)	2.50
» Verloti (Lamot.)	2.50
» Webbianum (Hort.)	1.—
* » Wulfeni (Hoppe)	1.—
» Zeilebori (Schott)	1.—

Les Joubarbes sont extrêmement précieuses pour la garnit. des roc. et des vieux murs, comme aussi pour faire des bordures ou des décor. dans les plates-bandes. Ce sont les plus solides d'entre toutes les pl. et on en cultive des collections en godets, en vases japonais, etc., sur les fenêtres ou balcons; elles s'accoutument de toutes les situations et leurs jolies fl. mais surtout leur feuillage à l'aspect de petits artichauts, les font rechercher par beaucoup d'amateurs. Il y a un plaisir très grand à les collectionner et à les cultiver. Les esp. marquées d'un * sont à fl. jaunes; les autres ont des fl. de différents roses.

Senecillis, v. Senecio.



Sempervivum arachnoideum.



Sempervivum tectorum.

Senecio.

GROUPE I. ESPÈCES ALPINES, NAINES ET CESPITEUSES :

	fr. c.
Senecio abrotanifolius (L.), fl. orangé vif	0.50
» adonidifolius (Lois.)	0.50
» aurantiacus (Less.), <i>Cineraria aurantiaca</i>	1.—
* » carniolicus (Willd.)	1.—
» Doronicum (L.), <i>Aster orangé</i>	0.50
* » incanus (L.)	1.—
* » leucophyllus (D. C.)	5.—
» tirolensis (Kern.), fl. rouge orangé très vif	2.50
* » uniflorus (All.)	2.50

Les espèces marquées d'un * sont à feuillage argenté.

GROUPE II. ESPÈCES SUBALPINES OU MONTAGNARDES, A PORT PLUS ÉLEVÉ, EN TOUFFES DRESSÉES OU ÉTALÉES :

* Senecio adenostyloides (Maxim.)	2.50
* » alpinus (Scop.)	0.50
» Bigelowi (A. Gr.)	2.50
» cacaliæformis (Reich.), <i>Ligularia cac.</i>	2.50
» campestris (D. C.), <i>Cineraria campestris</i>	1.—
» Carpathicus (Herb.), <i>Ligularia carp.</i>	2.50
* » cordifolius (L.)	0.50
» Correvonianus (Alb.)	2.50
* » diversifolius (Wall.)	2.50
» Doria (L.)	0.50
» doriæformis (D. C.)	2.50
* » Douglasii (D. C.)	2.50
* » erraticus (Bert.)	1.—
* » erubescens (Panc.)	0.50
* » Eversii (Huter)	1.—
» flosculus (Gilib.)	1.—
* » Jacquinianus (Reich.)	0.50
* » Japonicus (Sch. Bip.), <i>Erythrochæte palmat.</i>	1.—
* » Kämpferi (D. C.)	1.—
» Ledebourii (Sch. Bip.)	1.—
» Ligularia (Hook.), <i>Ligularia sibirica</i>	1.—
» macrocephalus (D. C.)	1.—
* » macrophyllus (Bieb.)	0.50
* » nebrodensis (L.)	0.50
* » Othonæ (Bieb.)	0.50
* » palmatus (Pall.)	2.50
* » platiphyllus (D. C.)	1.—
* » Reisachii (Gremb.)	1.—
* » sibiricus (L.)	1.—
» spathulæfolius (D. C.), <i>Cinerar. spath.</i>	
» stenocephalus (Boiss.)	0.50
* » subalpinus (Koch.)	0.50

Les esp. du groupe *Ligularia* et le *S. macrophyllus* sont très élevées et hautement ornementales; il leur faut un sol profond et meuble; celles du groupe *Cineraria* craignent les limaces; il leur faut un sol calcaire et le soleil. Les espèces marquées d'un * préfèrent la mi-ombre et un peu de fraîcheur.

	fr. c.
Serratula nudicaulis (D. C.), rare	2.50
» radiata (Bieb.)	1.50
» tinctoria (Bieb.)	1.50
» Vulpii (Fisch.)	0.50
Seseli caespitosum (S. S.), de l' <i>Olympe</i>	1.—
» gummiferum (Pall.), du <i>Taurus</i>	1.—
» tortuosum (L.)	1.—
Ombellif. orientales, à fl. glauques, propr. à garnir roch. Soleil.	
Sesleria cœrulea (Ard.)	0.50
Shortia galacifolia (Torr.)	2.50
» uniflora (Maxim.)	5.—
Sibbaldia parviflora (Willd.)	0.50
» procumbens (L.)	0.50
Sidalcea candida (A. Gr.)	0.50
» delphinifolia (A. Gr.)	0.50
» malvæflora (A. Gr.)	0.50
» oregana (A. Gr.)	0.50
» parviflora (Greene.)	0.50
» spicata (Greene.)	0.50
Jolies Malvacées aux fl. roses ou blanches, en épis; été; roc. ou pl. terre; soleil ou mi-sol.	
Sideritis candicans (Ait.)	2.50
» hyssopifolia (L.)	0.50
» Libanotica (Lab.)	2.50
» montana (L.)	2.50
» Taurica (Willd.)	2.50
Labiales aux fl. jaunes, excellent. pour roc.; été et aut.; pl. soleil.	
Sieberta cherlerioides (Hoppe.)	2.50
Silene.	

GROUPES I. ESP. ALPINES OU SAXATILES, NAINES ET CESPITEUSES.

* Silene acaulis (L.) . . . les douze 5 fr.	0.50
» » fortes touffes de 5 à 6 ans	1.50
» » à fl. blanches	2.50
* » » v. <i>bryoides</i>	2.50
* » » v. <i>elongata</i> ; grand. fl. rose-carmin, pédonculées	2.50
* » » v. <i>Correvontiana</i> , la même à fl. très doubles	2.50

Excell. var. très florifère, trouvée dans la Haute Maurienne; les fl. offrent l'aspect de petites roses (mai-juin).

» alpestris (Jacq.) . . . les douze 5 fr.	0.50
* » » v. à fl. roses	0.50
» cæsia (S. S.)	0.50
» ciliata (Pourr.)	1.50
* » Elisabethæ (Jan.)	1.50
* » exscapa (All.)	1.—
» » à fl. blanches	2.50
» Grisea (Boiss.)	2.50
» Kitabelii (Vis.)	1.—
» Lerchenfeldiana (Baumg.)	1.—
» maritima (With.)	0.50
» » à fl. pleines	1.—
» Monachorum (Vis.), espèce minuscule	1.—
» multicaulis (Guss.)	0.50
* » Pumilio (Wulf.)	1.—
» pusilla (W. K.), aime la fraîcheur	1.—
» quadrifida (L.), »	0.50
» Reichenbachiana (Vis.)	1.—

	fr. c.
Silene rupestris (L.), craint la chaux	0.50
» Saxifraga (L.)	0.50
* » Schafta (Gmel.)	0.50
» Valesia (L.), rampante et stolonifère	0.50
» Zawedskyi (Herb.)	0.50

Les espèces marquées d'un * sont à fl. rose ou carmin plus ou moins vif; les autres à fl. blanches ou blanc rosé. Toutes aiment les fentes des rochers et demandent peu de sol.



Silene alpestris.



Silene Schafta.

GROUPES II. ESPÈCES À TIGES DRESSÉES PLUS OU MOINS BUISSONNEUSES.

Silene Fabaria (S. S.)	1.50
» fimbriata (Bieb.), très belle et grande pl. à fl. blanches, très finement laciniées	1.—
» Græfferi (Ten.)	1.—
» nutans (L.)	0.50
» paradoxa (L.)	1.—
Ces esp. vont indiff. sur les roc. ou dans la pl. terre; soleil.	
Silybum Marianum (Goertn.)	0.50
Smilacina dahurica (Turcz.)	2.50
» racemosa (Desf.)	2.50
» stellata (Desf.)	0.50

Petites Liliacées à fl. blanches, pour les sous-bois et les lieux ombragés.

	fr. c.
<i>Solanum dulcamara</i> (L.), <i>Douce-amère</i> .	0.50
<i>Soldanella alpina</i> (L.) ¹ . les douze 5 fr.	0.50
» à fl. blanches .	2.50
» <i>Ganderi</i> (Hut.) .	5.—
» <i>hybrida</i> (Kern.) .	5.—
» <i>minima</i> (Hoppe) .	2.50
» à fl. blanches .	5.—
» <i>montana</i> (Willd.), très grande espèce .	2.50
» <i>pusilla</i> (Baumg.) .	2.50
» <i>pyrolæfolia</i> (S. N. K.) .	5.—

Les Sold. fleurissent bien si l'on a soin de leur donner une posit. fraîche mais ensoleillée; il leur faut, non point un sol mouillé mais l'air humide, en février-mars, alors que leurs boutons se forment et se développent; cultiv. dans du Sphagnum elles fleurissent très bien.



Soldanella alpina.



Soldanella montana.

¹ Une monographie illustrée du genre *Soldanella*, par H. Correvon, a paru dans le *Garden* (printemps 1902).

	fr. c.
<i>Solenanthus cerinthoides</i> (Boiss.) .	1.50
» <i>mollissimus</i> (D. C.) .	1.50
<i>Solidago alpestris</i> (W. K.), <i>Verge d'or</i> .	0.50
Pour les autres esp. v. pl. vivaces.	
<i>Sonchus</i> , v. <i>Mulgedium</i> .	
<i>Spergularia rubra</i> (Presl.) .	0.50
<i>Spigelia marylandica</i> (L.) .	2.50



Spigelia marylandica.



Spiræa Aruncus.



Spiræa filipendula fl. pl.

	fr. c.
Spiræa Aruncus (L.), <i>Barbe de bouc</i>	0.50
» filipendula (L.)	0.50
» » à fl. doubles	0.50
» Ulmaria (L.)	0.50
» » à fl. doubles	0.50
» » à feuilles panachées	1. —
Voir pl. vivaces.	




Spiræa Ulmaria fl. pl.

Stachys lanata (L.), f. laineuses; fl. roses. bonne pl. pr. bordures et garnit. des lieux secs. Les douze 5 fr.	0.50
» lavandulæfolia (Vahl.)	1. —
» Libanotica (Benth.)	2.50
» plumosa (Gris.)	1. —
Jolies Labiées ornementales; rocaille; soleil.	



Stachys lanata.

Stæhelinia uniflosculosa (S. S.)	2.50
Statice (v. pl. vivaces).	
Stellaria radicans (Lap.)	0.50
Excellente pl. rampante et stolonif; propre à gar- nir roch. à mi-ombre; nombr. fl. blanches. Juin-août.	
Sternbergia , v. pl. bulbeuses.	
Stipa Calamagrostis (Wahl.)	0.50
» gigantea (Lag.)	1. —
» pennata (L.) Panache valaisan.	0.50
Belles graminées ornementales; soleil.	



Stipa pennata.

	fr. c.
Stobæa Radula (Haw.)	2.50
Streptopus amplexifolius (D. C.)	0.50
Sullivantia ohiensis (Torr. Gr.)	2.50
Swertia connata (Schrenk.)	2.50
» longifolia (Boiss.)	2.50
» perennis (L.)	0.50
» punctata (Baumg.)	2.50




Swertia perennis.



Symphyandra pendula.

	fr. c.
Symphyandra Armena (D. C.)	2.50
» Hoffmanni (Pant.)	0.50
» Ossetica (D. C.)	2.50
» pendula (D. C.)	2.50
Jolies Campanules des Balkans ou du Caucase; roc. ou murailles; sol. ou demi-sol.; juin-sept.	
Symphytum bulbosum (Schimp.)	1.—
*» caucasicum (Bieb.)	1.—
» cordatum (W. K.)	1.50
» officinale (L.) <i>Consoude officinale</i>	0.50
*» peregrinum (Led.), grande espèce	1.—
» tauricum (Willd.), belles et nomb. fl. blanches	0.50
» tuberosum (L.)	1.—
Les esp. marquées d'un * sont à fl. bleues ou pur- purines; les autres à fl. blanches ou jaunes. Les Consoudes sont de bonnes pl. de pl. terre; mai-oct.; sol. ou demi-sol.	
Synthisis pinnatifida (Wats.)	2.50
» reniformis (Benth.)	2.50
Scrophulariées américaines à beau feuillage; pl. naines.	
Tamus communis (L.)	1.50
Le Tamier est une Asparaginée dont les tiges vo- lubliles se couvrent de baies rouge vif à l'au- tomne; ombre ou demi-ombre.	
Tanacetum argenteum (Willd.)	2.50
*» Balsamita (L.) <i>Toute bonne</i>	0.50
» boreale (Fisch.)	1.—
» Herderi (Rgl.)	2.50
*» vulgare (L.), <i>Tanaisie odorante</i>	0.50
*» » var. crispum	0.50
Pl. balsamiques recherchées et ornementales; les esp. marquées d'un * sont élevées et buis- sonneuses et ont des panicules de fl. jaunes.	
Taraxacum albidiflorum (Matsam.)	2.50
Dent de Lion à fl. blanches.	
» dissectum (Led.)	1.—
Telekia speciosissima (D. C.), <i>vrai</i>	2.50
Telephium Imperati (L.)	0.50
» orientale (Boiss.)	2.50
Tellima grandiflora (R. Br.)	0.50



Teucrium Chamædrys.

Teucrium aureum (Schreb.)	0.50
» capitatum (L.)	1.—



Symphytum peregrinum.


	fr. c.
Teucrium Chamædrys (L.). <i>Germandrée</i>	
Les douze 5 fr.	0.50
Excell. pl. à feuil. décoratif et à très nombreuses fl. rose et rouge; juillet-novembre; va partout et excelle pour garnir les lieux secs et arides.	
» divaricatum (Sieber.)	2.50
» montanum (L.)	0.50
» orientale (L.)	1.50
» polium (L.)	0.50
» pyrenaicum (L.)	0.50
» Scorodonia (L.). <i>Pl. des bois</i>	0.50
Labiées odorantes, à fl. en capitules ou en grappes, très nombreuses et se succèdent long- temps sur la pl.; soleil et sec; roc. ou pl. terre.	
Thalictrum alpinum (L.)	1.—
*» anemonoides (Michx.)	1.—
*» » à fl. doubles	2.50
*» aquilegifolium (L.). <i>Pigamon des Bois</i>	0.50
*» » à fl. blanches	0.50
» Baikalense (Turcz.)	0.50
» Cornuti (L.). <i>Grand. esp. améric.</i>	0.50
*» Delavayi (Franch.)	2.50
» dioicum (L.)	2.50
» elegans (Wall.)	2.50
» Fendleri (Engelm.)	1.—
» fœtidum (L.)	0.50
» galioides (Nestl.)	0.50
» minus (L.)	0.50
*» petaloideum (L.)	1.50
» purpurascens (L.)	1.—
» saxatile (Vill.)	0.50
» sibiricum (L.)	0.50
*» tuberosum (L.)	2.50

fr. c.

Charmanes Renonculacées aux feuillages élégants, s'approchant, chez les esp. naines, des *Adiantum* qu'ils remplacent fréquemment pour les bouquets parce qu'ils offrent sur ces délicates fougères l'avantage de durer très longtemps. Les esp. marquées d'un * sont en général à fl. légères et élégantes et recherchent le mi-ombre et la pleine terre tandis que les autres, aux fl. moins voyantes, sont des pl. de roc. et de soleil. Le *Th. aquilegifolium* est l'une des meill. plantes pour sous-bois ou orner les bords des taillis, les grands rochers, etc.

Thlaspi alpestre (L.)	0.50
» Avellanæ (Bat.)	1.50
» bulbosum (Sprun.)	0.50
» cochleariæforme (D. C.)	0.50
» Kowatzii (Henf.)	0.50
» microstylum (Boiss.)	0.50
» rotundifolium (Gaud.)	1.50
» violascens (Schott)	0.50
Thymus bracteosus (Vis.)	0.50
» collinus (Bieb.)	0.50
» comosus (Heuf.)	0.50
» Herba-Barona (Lois.)	1.—
» lanuginosus (Desf.)	0.50
» marginatus (Kern.)	2.50
» nicænsis (Hort.)	0.50
» nummularius (Bieb.)	0.50
» pannonicus (All.)	0.50
» rotundifolius (Schur)	0.50
» serpyllum (L.), <i>Serpolet</i>	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. carmin vif	0.50
» » v. <i>latinus</i>	0.50
» » v. <i>pulchellum</i>	0.50
» villosus (L.)	1.50
» vulgaris (L.)	0.50
» Zygis (L.)	1.50

Bonnes pl. p. soleil, pl. t. ou roc.; longue floraison.



Thymus serpyllum.

Tiarella cordifolia (L.)	0.50
» poliphylla (Don)	0.50
Tiofieldia borealis (Wahl.)	1.50
» calyculata (Wahl.)	0.50
» » v. <i>capitata</i>	2.50
» rubescens (Hoppe)	2.50



Tiarella cordifolia.

Towsendia sericea (Hook.)	2.50
» Wilcoxiana (Wood.)	2.50
Tricystis , v. pl. vivaces.	
Trientalis europæa (L.)	1.50
Jolie petite Primulacée aux fl. blanches, propre à garnir les sous-bois.	
Trifolium alpestre (L.)	0.50
» alpinum (L.)	2.50
» atrosanguineum (Hort.), feuillage brun noir	0.50
» poliphyllum (C. A. M.)	2.50
Trillium , v. pl. bulbeuses.	
Trollius abschasicus (Rgl.)	1.50
» acaulis (Lindl.)	1.50
» altaicus (C. A. M.)	1.50
» americanus (Mühl.)	1.50
» asiaticus (L.)	1.—
» aurantiacus (Rgl.)	1.50
» caucasicus (Stev.)	1.—
» dschungaricus (Rgl.)	1.50
» europæus (L.), <i>Globeflower</i> , la douzaine 5 francs	0.50
» » v. <i>giganteus</i>	2.50
» patulus (Salisb.)	1.—
» polysepalus (Rgl.)	2.50
» transylvanicus (Schur.)	1.—

Les Trollies sont de gros boutons d'or aux fl. globuleuses et odorantes, qui recherchent les sols frais et humides mais ensoleillés. Mai-juin.

Tropæolum pentaphyllum (Lam.)	2.50
» poliphyllum (Cav.)	2.50
Tschihatcheffia Isatidæa (Boiss.)	5 —
Tunica illyrica (Boiss.)	0.50
» Olympica (Boiss.)	0.50
» saxifraga (L.)	0.50
Umbilicus Semenowi (Herd.)	1.—

Pour autres Umbilicus v. *Cotyledon*.

Uniola latifolia (Mich.)	0.50
Uvularia grandiflora (Smith.)	1.—
» perfoliata (L.)	1.—
Curieuses Colchicacées à fl. jaune citron.	
Vaccinium Myrtillus (L.), <i>Myrtille</i>	2.50
» uliginosum (L.)	2.50
» Vitis Idæa (L.), <i>Airelle</i>	2.50



Uvularia grandiflora.

	fr. c.
Valeriana Alliariæfolia (Vahl.)	0.50
» alpestris (Stev.)	0.50
* » celtica (L.), <i>Nard celtique</i>	2.50
» exaltata (Mik.)	0.50
» dioica (L.)	0.50
» edulis (Nutt.)	2.50
* » globulariæfolia (Ram.)	2.50
» integrifolia	1.50
» montana (L.)	0.50
» officinalis (L.)	0.50
» Phu (L.)	0.50
» pyrenaica (L.)	2.50
* » rotundifolia (Vill.)	2.50
* » Saliunca (All.)	1.—
» sambucifolia (M. K.)	0.50
* » saxatilis (L.)	2.50
» septentrionalis	2.50
* » supina (L.)	1.—
» tripteris (L.)	0.50

Les Valérianes sont bien connues pour les propr. odorantes de leurs racines ; fl. blanc-rosé, persistant longtemps ; mi-soleil et fraîcheur. Les esp. marquées d'un * sont naines et rampantes et plus spécialement de rocailles.



Valeriana officinalis.

	fr. c.
Vancouveria hexandra (Morr.)	2.50
Vella pseudocytisus (L.)	2.50
» spinosa (Boiss.)	2.50
Petits arbustes espagnols de la famille des Crucifères ; très rares ; soleil et rocaille.	
Veratrum album (L.)	1.—
» Lobelianum (Bern.)	1.—
» nigrum (L.)	1.—
Belles Colchicacées au feuillage architectural ; sol profond et frais.	



Veratrum nigrum.

Verbascum , v. pl. vivaces.	
Verbena venosa (Hook.)	1.50



Verbena venosa.

Veronica.

GROUPE I. ESPÈCES ALPINES, NAINES OU SAXATILES.

Veronica Allionii (Vill.)	1.50
» alpina (L.)	0.50
» aphylla (L.)	0.50
» arenaria (Cunn.)	2.50
» bellidifolia (L.)	0.50

	fr. c.
Veronica cæspitosa (Boiss.)	2.50
» canescens (Kirk.), minuscule espèce	2.50
» caucasica (Bieb.)	0.50
» dentata (Schmidt)	1.50
» dychrus (Schott)	1.50
» filiformis (Sm.)	1.—
» fruticulosa (L.)	0.50
» Kotschyana (Benth.)	1.50
» montana (L.)	0.50
» multifida (L.)	1.—
» neglecta (Vahl.)	1.—
» nivalis (Schur.)	0.50
» officinalis (L.), des bois	0.50
» orientalis (Mill.)	1.50
» peduncularis (Bieb.)	1.50
» Ponæ (Gouan.)	0.50
» prostrata (L.), bleu intense	0.50
» saturejoides (Vir.)	0.50
» saxatilis (L.)	0.50
» » à fl. blanches	1.50
» serpyllifolia (L.)	0.50
» spicata (L.)	0.50
» » à fl. roses	1.—
» telephiifolia (Vahl.)	1.—
» Waldsteiniana (Schott.)	0.50

Excell. pl. pour rochers; fl. bleues ou roses;
soleil.



Veronica prostrata.

GROUPÉ II. ESPÈCES EN TOUFFES ÉRIGÉES, PLUS OU MOINS ÉLEVÉES.

Veronica austriaca (L.)	0.50
» carnea (Hort.)	0.50
» Chamædrys (L.)	0.50
» corymbosa (Hort.)	0.50
» crassifolia (Sweet.)	0.50
» crispifolia	2.50
» elegans (Hort.)	0.50
» Gentianoides (Wah.)	0.50
» » <i>v. stenophylla</i> (Wirk.)	0.50
» incana (L.)	0.50
» incisa (Willd.)	0.50
» longifolia (L.)	0.50
» maxima (Hort.)	0.50
» paniculata (Pall.)	0.50
» rupestris (Tard.)	0.50

Veronica subsessilifolia	0.50
» Teucrium (L.)	0.50
» urticæfolia (L.)	0.50
» virginica (L.)	0.50


Plantes de plates-bandes ou de rochers, à fl. bleues ou roses, en épis dressés, très recherchées des abeilles, florifères (juillet-octobre) et excellentes pour les bouquets; sol. ou mi-ombre.



Veronica Gentianoides.



Veronica longifolia.



Veronica virginica.

	fr. c.
Vesicaria cretica (Poir.)	1.50
» montana (A. Gr.)	1.50
» sinuata (Cav.)	0.50
» utriculata (L.)	1.50



Vesicaria utriculata.

Vicia Orobus (D. C.)	1.50
» pyrenaica (Pourr.)	2.50
» sp. <i>Andes du Chubu</i> (Chili)	2.50
Vinca acutiflora (Bert.)	0.50
» Herbacea (W. K.)	0.50
» Libanotica (Zucc.)	2.50
» v. pl. vivaces.	

La Pervenche des Carpathes *V. herbacea* est une pl. curieuse, à longs rameaux couvrant le sol et portant sur une grande partie de leur longueur des fl. bleues, opposées l'une à l'autre. Elle diffère sensiblement de notre pervenche ordinaire et fleurit beaucoup plus longtemps (mai-juillet). Sous bois, rocaillies, pl. terre, etc. O. ou sol.



Vinca Herbacea.

Vincetoxicum alpinum (Schott.)	0.50
» medium (Desne.)	0.50
» nigrum (Möench)	0.50



Viola biflora.

Viola.

GROUPE I. ESPÈCES DU GENRE VIOLETTES.

	fr. c.
Viola alba (Bess.)	1.—
» arenaria (D. C.), fl. roses, très odorant.	1.50
* » biflora (L.), fl. jaune vif, la douz. 5 fr.	0.50
» canadensis (L.)	1.—
* » canina (L.), bonne pour sous-bois	0.50
» Chelmea (Boiss.)	2.50
» cognata	2.50
* » cucullata (Ait.)	0.50
* » » à fl. blanches.	0.50
» cyanea (Celak)	2.50
» delphinifolia (Nutt.)	2.50
» elatior (Fries)	0.50
» hirta (L.)	0.50
» Jooi (Janka), très odorante.	1.50
» lancifolia (Thore)	2.50
» mirabilis (L.)	0.50
» » à fl. blanches.	1.—
» Nuttalli (Pursh)	2.50
* » odorata (L.), la douz. 5 francs	0.50
Pour variétés v. pl. vivaces.	
» palmata (L.)	1.—
» palustris (L.)	2.50
* » Patrini (D. C.)	1.—
* » » chinensis (Rgl.)	2.50
» pedata (Pursh)	2.50
» » bicolor	2.50
» pinnatifida (All.)	2.50
» pinnata (L.), esp. alpine rare	1.—
* » primulifolia (L.)	1.50
» pubescens (Ait.) fl. jaunes	2.50
» Riviniana (Reich.)	1.—
» Ruppii (All.)	2.50
* » sagittata (Ait.)	1.—
» sciaphylla (Koch.)	1.—
» stagnina (Kit.)	1.—
* » striata (Ait.)	1.—
» stricta (Horn.)	0.50
» suavis (Bieb.)	1.—
» sulfurea (Hort.), fl. jaune soufre, odorantes.	0.50
* » sylvestris (Lam.)	0.50

Viola Thomasiana (Perr. Song.), très odorante; fl. roses	fr. c. 2.50
» Venanzi ?	1.50
Les espèces marquées d'un * sont celles qui recherchent l'ombre ou la fraîcheur.	

GROUPE II. ESP. DU GENRE PENSÉES :

Viola alpina (Jacq.)	2.50
» altaica (Pall.) vrai	2.50
» atlantica (Pomel.)	2.50
» calcarata (L.), <i>Pensée des Alpes</i> ; la douzaine 5 francs	0.50
» » à fl. blanches.	1.—
» » à fl. jaunes	1.—
» » lilas clair	1.—
» cenisia (L.), dans pierrier calcaire	2.50
» cornuta (L.), la douzaine 5 francs	0.50
» » à fl. blanches, la douzaine 5 francs	0.50
» » <i>Hybrides</i> de différentes couleurs	0.50
» declinata (W. K.), très belle	2.50
» heterophylla (Bert.)	2.50
» latisepala (Rgl.)	1.—
» lutea (Hud.)	0.50
» » <i>v. grandiflora</i>	1.—
» Munbyana (Boiss.)	0.50
» polychroma (Kern.)	2.50
» rothomagensis (Desf.)	1.—



Viola cornuta à fl. blanches.



Viola rothomagensis.



Viola Munbyana.

Viola Sudetica (Willd.)	fr. c. 1.—
» Zoyzii (Wulf.)	1.—
Wahlenbergia , <i>v. Hedraeanthus</i> .	
Waldsteinia geoides (Willd.)	0.50
Wittadenia triloba (D. C.)	0.50
Wulfenia Amherstiana (Benth.)	2.50
» Carinthiaca (Jacq.)	0.50
Wyetia mollis (A. Gr.)	2.50



Zauschneria californica.

Zauschneria californica (Presl.), fl. rouge vermillon	1.—
Zwackia aurea (Sendt.)	2.50

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX :

100 plantes alpines diverses	40.—
50 »	20.—
25 »	12.—
12 »	5.—

Plantes vivaces.

Nous comprenons, sous ce titre, celles des pl. de pleine terre rustiques sous le climat de Genève et Paris qui sont plus spécialement des fleurs décoratives, des pl. propres à orner les plates-bandes, les massifs, les pelouses, etc. Le style naturel qui prévaut en ce moment et qui consiste à imiter la nature alpestre et montagnarde, à remplacer le conventionnel par le naturel, ce style qu'on a admiré aux villages suisses de Genève et de Paris, exige la présence de nombreuses pl. vivaces. Celles-ci, isolées ou groupées dans les gazons, artistiquement disposées suivant leurs couleurs, leur époque de floraison, leur taille, leurs formes aussi, forment de véritables tableaux qui enfoncent carrément l'ancien système des corbeilles unies ou multicolores d'espèces exotiques qu'il faut rentrer à l'automne et soigner l'hiver sous verre. Les pl. vivaces, elles, se conservent indéfiniment et n'exigent d'autres soins que ceux de la propreté de leur souche et d'arrosage plutôt modéré — surtout si elles sont plantées dans le gazon qui leur constitue un admirable cadre et un merveilleux décor. Comme fleurs à bouquets, propres à garnir les tables, les salons et les maisons, elles sont incomparables et les livrent en grande abondance. C'est pourquoi le Jardin alpin d'acclimatation a transformé son champ d'activité et, depuis plusieurs années, s'occupe à collectionner, à acclimater, à cultiver, multiplier et répandre toutes les pl. vivaces susceptibles d'être introduites dans les jardins du centre européen. Nos collections de *Floraire* sont peut-être les plus complètes qui existent, au point de vue des espèces, s'entend, car nous donnons moins d'importance aux variétés horticoles.

	fr. c.
Abronia fragrans (Nutt.) ¹	2.50
Acanthus latifolius (Hort.), <i>A. lusitani-</i>	
<i>cus</i> , <i>A. niger</i>	1.—
» mollis (L.)	1.—
» spinosissimus (Desf.)	2.50
» spinosus (L.)	1.—
L'Acanthe, dont le beau feuillage a donné le cha- piteau corinthien, est, dans ses diff. formes et esp., l'une des plus ornement. d'entre les pl.; ses fl. roses, dispos. en longs épis dressés, sont relevées par le plus élégant des feuillages; sol profond; soleil et position plutôt abritée. Juillet-sept.	
Achillea filipendulina (Lam.), fl. jaune vif, juillet-sept.	0.50
» Millæfolium roseum (Hort.)	0.50
» nobilis (L.)	0.50
» Ptarmica (L.)	0.50
» » à fl. pleines	0.50
» » v. <i>The Pearl</i>	0.50
» serrata (Retz), à fl. pleines	0.50
» tanacetifolia (All.)	0.50
Aconitum , v. chapitre précédent.	
Actinomeris helianthoides (Nutt.)	0.50
» pauciflora (Nutt.)	0.50
» squarrosa (Nutt.)	0.50
Composées à fl. jaunes, voisines des Coreopsis.	
Adenophora , v. chap. précédent.	
Adonis , »	
Allium , v. pl. alp. ou pl. bulbeuses.	



Acanthus latifolius.

¹ Pour ce chapitre-ci nous adoptons la nomenclature la plus courante dans le monde horticole tout en donnant la préférence dans beaucoup de cas à celle de l'*Index Kewensis*.

fr. c.

Alstrœmeria, v. pl. bulbeuses.**Althœa cannabina** (L.) 0.50* » **ficifolia** (Cav.), fl. jaune soufre 0.50» **officinalis** (L.), *Guimauve officinale* 0.50* » **rosea** (Cav.), *Rose trémière*, *Passerose* 0.50

Le type à fl. simples, dans toutes les couleurs.

* » **rosea**, v. à fl. pleines, multicolores 0.50* » **sulfurea** (Boiss.) 0.50

Les esp. marquées d'un * sont les passeroses, pl. extrêmement décoratives et élégantes, qui fleurissent de juin en automne; soleil; sol plutôt maigre si l'on veut éviter la rouille qui s'attaque volontiers à leurs feuilles.

Alyssum saxatile (L.), *Corbeille d'or* 0.50

» » à fl. doubles 0.50

» » à feuilles panachées 0.50

Excell. pl. à bordures; mai-juin; soleil.

Amaryllis, v. pl. bulbeuses.**Amphycome arguta** (Royle) 2.50**Amsonia angustifolia** (Mich.) 0.50» **elliptica** (Rœm. et Schult.) 2.50» **latifolia** (Mich.) 0.50» **salicifolia** (Pursh.) 0.50*Amsonia salicifolia.***Anaphalis Margaritacea** (Benth. et Hook.) 0.50

Immortelle blanche à couronnes.

Anchusa Barrelieri (Vis.) 0.50» **italica** (Retz) 0.50» **officinalis** (L.) 0.50» **sempervirens** (L.) 0.50» **tinctoria** (L.), *Orcanette* 0.50

Boraginées aux fl. bleues, très intense chez *Italica*; sortes de gigantesques *Myosotis*. Été.

Androsæmum officinale (All.) 0.50**Anemone japonica** (S. Z.) 0.50» » à fl. blanches, *Honore Jobert* 0.50

» » à fl. blanches, doubles 1.—

» » v. *elegans* (Decsne) 0.50» » v. *Lady Ardilaun* 1.—**Angelica Archangelica** (L.), *Angélique* 1.—**Antennaria margaritacea**, v. *Anaphalis*.**Anthericum ramosum** (L.), petit lis des

montagnes 0.50

Anticlea glauca (Kunth.) 0.50*Anemone japonica alba.*

fr. c.

Antirrhinum majus (L.), *Muflier*, *Gueule de Loup*; angl. : *Snapdragon* 0.50

Pl. murale excellente, très florif. et dont on possède de nombreuses variétés.

Antirrhinum majus atropurpurea (Hort.), fl. presque noire 0.50**Aplopappus ericoides** (D. C.) 2.50» **Fremonti** (A. Gr.) 2.50**Apocynum androsæmifolium** (L.) 1.—» **sibiricum** (Pall.) 1.50**Aquilegia californica** (A. Gr.) 1.—» » **hybrida** 1.—» **chrysantha** (A. Gr.) 0.50» » v. *bicolor* 1.—» » v. *grandiflora* 1.—» » v. *nana* 1.—» **cœrulea hybrida** 1.—» **Haylodgensis** (Hort.) 1.—» **hybrida** (var. anglaises) 1.—» **Jæschkani** (*Chrysantha* × *Skinneri*) 1.—» **truncata** (Fisch. et Mey.), rouge vif 1.—

V. pl. alpines.

Les Ancolies sont excell. pour garnir les massifs ombragés, émailler les lieux frais et les gazons et fleurir la pl. terre.


Arabis albida (Stev.), *Corbeille d'argent*, la douzaine 5 francs 0.50» **albida**, à fl. pleines, la douzaine 5 fr. 0.50

Très belle var. à grand effet; forme des touffes très larges, se recouvrant de fl. blanches d'avril en juin.

Aralia cachemiriana (Desne.) 2.50» **chinensis** (L.) 2.50» **racemosa** (L.) 2.50

Pl. vivaces élevées, très ornementales, qui sont des lierres mais très différents de celui qui grimpe à nos murs.

	fr. c.
Archangelica officinalis , v. <i>Angelica</i> .	
Arisæma , v. pl. bulbeuses.	
Aristolochia Clematitis (L.)	0.50
» rotunda (L.)	2.50
Armeria vulgaris (Willd.), <i>Gazon</i> d' <i>Olympe</i> ou d' <i>Espagne</i>	0.50
Arnebia echioides (D. C.), <i>Fleur du pro-</i> <i>phète</i>	1. —
Arum Arisarum (L.)	1. —
» Dioscoridis (S. S.)	1.50
» Dracunculus (L.), <i>Serpentaire</i>	1. —
* » italicum (Mill.), <i>Gouet panaché</i>	1. —
* » maculatum (L.), <i>Gouet</i> ; <i>Pied de veau</i>	0.50
» palæstinum (Boiss.), <i>Sanctum</i>	1. —
Les esp. marquées d'un * sont des pl. d'ombre et de sous-bois, au feuillage ornemental.	
Arundo Donax (L.)	0.50
Asclepias Cornuti (Dcsne), <i>A. syriaca</i>	0.50
» incarnata (L.)	0.50
» purpurascens (L.)	0.50
» speciosa (Torr.)	1.50
» tuberosa (L.)	1.50
» verticillata (L.)	1.50
L'A. Cornuti (<i>Pl. aux oiseaux</i> ou <i>Herbe à la</i> <i>Ouate</i>) à cause de ses graines soyeuses, con- tenues dans des fruits qui ont la forme d'oi- seaux, est des meilleures pl. mellifères con- nues; ses nombreuses fl. rose brunâtre, très odorantes, renferment une quantité considé- rable de miel qui est très recherché des abeil- les; cette esp. est stolonif. et très envahissante, elle réussit dans les plus mauvais sols. L'A. <i>tuberosa</i> est l'une des plus brillantes plantes vivaces; esp. basse, à nombreuses fl. orangé vif; été; soleil.	



Asclepias Cornuti.

Asparagus acutifolius (L.)	1.50
» tenuifolius (Lam.)	1.50
» verticillatus (L.)	1.50

La première est cette asperge si gracieuse qui grimpe aux buissons et aux vieux murs dans le Midi; elle est parfaitement rustique chez nous, mais exige cependant une position un peu abritée; A. tenuif. est l'une des plus délicieuses verdure qu'on puisse imaginer; elle

	fr. c.
fait admirablement dans les rochers, les plates- bandes et surtout comme verdure à bouquets. C'est une pl. des Alpes méridionales.	
Asphodelina cretica (L.), <i>Asphodelus cre-</i> <i>ticus</i>	0.50
» lutea (Reich.), <i>Asphodelus luteus</i>	0.50
» » à fl. doubles	1 —
Jolies Asphodèles très rustiques, à fl. jaunes; la dernière est connue sous le nom de <i>Bâton de</i> <i>Jacob</i> ; sol-profond, soleil.	



Asphodelina lutea.

Asphodelus albus (Willd.)	0.50
» cerasiferus (Gay)	0.50
» fistulosus (L.)	0.50
» Liburnicus (Scop.)	0.50
» ramosus (L.)	0.50

Les belles Asphodèles ou Lis de Provence, réus-
sissent bien chez nous dans une situation
sèche et ensoleillée.



Asphodelus ramosus.

Aster acuminatus (Michx.)	0.50
» amelloides (Hoffm.)	0.50
* » amellus (L.), la douzaine 5 francs.	0.50
Excellente pl. naine pour pentes sèches.	

PLANTES VIVACES

	fr. c.
Aster amethystinus (Nutt.)	0.50
» Andersonii (Forst non A. Gr.)	0.50
» angustus (Torr. Gr.)	0.50
» azureus (Lindl.)	0.50
* » Bessarabicus (Bern.), belle esp. à gr. fl.	0.50
» Bigelowi (A. Gr.), lilas clair	0.50
* » cæspitosus (Forst.)	0.50
» Chapmanni (Torr. Gr.)	0.50
» cordifolius (L.)	0.50
» coridifolius (Michx.)	0.50
» corymbosus (Ait.)	0.50
» Curtisii (Torr. Gr.)	0.50
» cyaneus (Hoffm.)	0.50
* » Datschy (Hort.), blanc pur	0.50
» diffusus (Dryand)	0.50
* » diplostephioides (Wall.)	0.50
» dumosus (L.)	0.50
» ericoides (L.), <i>Larme du jardinier</i>	0.50
» eminens (Willd.)	0.50
» Fendleri (A. Gr.)	0.50
» firmus (Nees)	0.50
» floribundus (Willd.)	0.50
» formosissimus (Hort.)	0.50
» Fremonti (A. Gr.), fl. blanches	0.50
» gramineus (Hort.)	0.50
» grandiflorus (L.), espèce tardive	1.—
» grandis speciosa (Hort.)	0.50
» Hauptii (Led.)	0.50
» Harveyi (A. Gr.), <i>Biotia commixta</i>	0.50
» horizontalis (Desf.)	0.50
» incisus (Fisch.), <i>Calimeris incisa</i>	0.50
» japonicus (Less.), fl. blanches	0.50
» lævigatus (Willd.), <i>A. lucidus</i>	0.50
» lævis (L.)	0.50
» leucanthemus (Rafin.)	0.50
» Lindleyanus (Torr. Gr.)	0.50
» longifolius (Lam.), fl. blanches	0.50
» » <i>v. Formosus</i>	0.50
» Maacki (Rgl.)	0.50
» molliusculus (Wall.)	0.50
* » Nan Shanicus (Hort.)	0.50
* » nanus (Hort.)	0.50
» niveus (Hort.), fl. blanc pur	0.50
» Novæ Angliæ (Ait.)	0.50
» » Belgii (L.)	0.50
» » » à fl. blanc pur	0.50
» patens (Dryand)	0.50
» polyphyllus (Willd.)	0.50
» Porteri (A. Gr.)	0.50
» præcox (Willd.)	0.50
» Ptarmicoides (Torr. Gr.), fl. blanches	0.50
* » pumilus (Hort.)	0.50
» puniceus (L.)	0.50
» pyrenæus (D. C.), très beau et très rare	2.50
» radula (Ait.)	0.50
» roseus (Desf.), fl. beau carmin vif	0.50
» rubricaulis (Lam.)	0.50
» sagittæfolius (Wed.)	0.50
» salignus (Willd.)	0.50
» scaber (Thumb.)	0.50
» scapulorum (A. Gr.)	0.50
» Shortii (Ridd.)	0.50

	fr. c.
Aster sibiricus (L.)	0.50
» simplex (Willd.)	0.50
» squarrosus (Walt.)	0.50
» stellaris (Hort.)	0.50
* » suffruticulosus (C. Wink.)	1.—
» tenuifolius (Willd.), fl. blanches	0.50
» Tradescanti (L.)	0.50
» trinervis (Desf.)	0.50
» Trifolium (L.)	0.50
» turbinellus (Lindl.), l'un des plus gracieux	0.50
» versicolor (Willd.)	0.50
» vimineus (Torr. Gr.)	0.50
* » sp. nov. Colorado , belle esp. très florif.	0.50
* » sp. nov. Montagnes Rocheuses	0.50

Bonnes pl. d'automne qui se contentent de peu et résistent aux plus mauvais sols; très florifères elles constituent un bel ornement des massifs, plates-bandes, pelouses vertes et sont bonnes comme fl. coupées. Les esp. marquées d'un * sont naines et propres à la rocaille.

Baileya pauciradiata (Haw.), <i>Aster paucir.</i>	0.50
Bambusa aurea (Sieb.)	2.50
» flexuosa (Hort.)	2.50
* » gracilis (Hort.)	2.50
» Metake (Hort.), <i>Arundinaria japonica</i>	2.50
* » minima (Hort.)	2.50
» mitis (Poir.)	2.50
» nigra (Lodd.)	2.50
* » pumila (Hort.)	2.50

Les Bambous ci-dessus mentionnés sont absolument rustiques chez nous; il leur faut cependant, dans les pays où le vent du Nord est violent et brûle les feuilles en hiver, une situation plutôt abritée contre eux; ils préfèrent les sols humides et le bord des pièces d'eau. Ce sont des pl. hautement ornementales mais un peu envahissantes. Le B. Metake forme des touffes relativement basses (2 à 3 m.) et a de larges feuilles; les B. aurea, nigra et surtout le flexuosa prennent de très grandes proportions et atteignent parfois 5 à 6 m. de haut, donnent des cannes superbes qui sont d'un usage très apprécié pour le jardinage; les esp. marquées d'un * sont basses et naines et propres à garnir les rochers.




Baptisia australis.

Baptisia australis (R. Br.)	fr. c.
» exaltata (Sweet)	1.—
» leucantha (Torr. Gr.)	1.—
» minor (Lehm.)	1.—
» tinctoria (R. Br.)	1.—

Sortes de Lupins vivaces.

Bocconia (Maclaya) cordata (Willd.)	0.50
» v. Japonica (Hort.)	1.50
» microcarpa (Max.)	0.50

Belles Papavéracées ornementales, à feuell. glauque et denté très élégant, à tiges élevées et à fl. blanc rosé très nombreuses; juill.-sept.; le B. microcarpa, la plus belle du genre, atteint 3 et même 3½ m. de haut. Excellentes pl. à isoler dans les gazons; très solides.



Bocconia microcarpa.

Boltonia asteroides (L'Hérit.)	0.50
» glastifolia (L'Hérit.)	0.50
» incisa (Benth.)	0.50
» indica (Benth.)	0.50
» latisquama (A. Gr.)	0.50

Sortes d'Asters très florifères, aux innombrables capitules lilas rosé ou bleu lilas, très propres à orner les jardins et les grands rochers; les B. glastif. et latisq. atteignent 2 à 2½ m. de haut.



Boltonia glastifolia.

Borago orientalis (L.)	fr. c.
	0.50
L'une des premières fl. du printemps; fl. bleu et rose; ombre ou mi-ombre; pl. ornementale.	
Buphtalmum grandiflorum	1.—



Buphtalmum grandiflorum.



Buphtalmum speciosum.

Buphtalmum (Telekia) speciosum (Schr.) fr. c. 0.50

Belle pl. d'ornement à grandes f. cordiformes, à capitules jaune vif, au disque brun, répandant une agréable od. de résine; été; culture très facile. Très belle quand isolée dans les parterres.

Caltha palustris (L.), à fl. doubles 1.—

Très belle renoncule à grosses fl. très pleines, d'un jaune orangé vif; aime la fraîcheur ou l'humidité. Le type à fl. simples est également très ornemental.

Calystegia dahurica (Fisch.) 0.50

Grand liseron vivace à fl. roses simples.

» **pubescens (Link), fl. pl. Liseron vivace** 0.50
à fl. roses très pleines 0.50

» **sylvestris (R. Sch.), à fl. blanc pur.** 0.50

Ces liserons vivaces sont très solides, envahissants et propres, surtout le premier, à garnir et à orner les taillis, les lieux ombragés ou ensoleillés, n'importe; ses tiges s'enlacent partout, retombent gracieusement et fournissent, de juin en automne, de belles fl. roses, extrêmement élégantes.

Camassia, v. pl. bulbeuses.

Campanula, v. p. 13.

Celsia cretica (L.) 0.50

» **pontica (Boiss.)** 1.50

Centaurea atropurpurea (W. K.) 0.50

» **Babylonica (L.), pl. géante à fl. jaunes** 1.—

» **macrocephala (Muss.), gr. capitules jaunes** 0.50



Centaurea macrocephala.

Centranthus ruber (D. C.) 0.50

» v. **atrorubens** 0.50

» v. **à fl. blanches** 0.50

La Valériane rouge ou Barbe de Jupiter est l'une des meill. pl. vivaces; elle anime de ses fl. de feu les murailles des vieux châteaux, les talus pierreux des chemins de fer; c'est l'une des plus brillantes d'entre les fleurs mérid. et elle s'est naturalisée un peu partout chez nous. Elle fleurit tout l'été et même l'aut.; il lui faut le soleil.

Cephalaria, v. pl. alpines.

Cheiranthus Cheirii (L.), Viollier 0.50

» v. **semperflorens** 0.50



Centranthus ruber.

Chelone barbata (Cav.), Penstemon barb. fr. c. 0.50

» v. **Hybrida** 0.50

» **Lyoni (Pursh.)** 1.—

» **nemorosa (Dougl.)** 1.—

» **obliqua (L.)** 1.—

» à fl. blanches 1.—

» **purpurea (Mill.), Penstemon purp.** 0.50

Très belles pl. d'ornement et excell. pour la fl. coupée; le Ch. barbata et ses var. hybrides sont d'entre les plus brillantes des pl. viv.; fl. rouge très ardent chez le type, passant par différ. teintes et jusqu'au carmin chez ses var.; bonne terre meuble; soleil; été et automne.



Chelone barbata.

Chelonopsis moschata (Miq.) 2.50

Chrysanthemum lacustre (Brot) 0.50

» **marginatum (N. E. Br.)** 0.50

» **maximum (Ram.)** 0.50

» **Niponicum (Franch.)** 1.50

» **uliginosum (Pers.)** 0.50

	fr. c.
Clematis Davidiana (Dcne)	1.—
» integrifolia (L.), fl. bleu foncé	0.50
» » <i>v. grandiflora</i> (Rgl.)	2.50
» Heracleifolia (D. C.)	2.50
» recta (L.), <i>C. erecta</i>	0.50
» stans (S. Z.)	2.50
» tubulosa (Turcz)	1.—

Ces Clématites sont herbacées et mi-ligneuses ; elles forment de fortes touffes de 60 cm. à 1 m. 50 de haut ; leurs fl. sont bleues (blanches et très nombreuses chez *recta*) et très ornementales ; soleil ; sol profond et léger ; été.



Clematis integrifolia.

Clerodendron foetidum (Bunge), *Cl. Bungei*

1.—

Très belles pl. dont les feuilles répandent, quand on les froisse, une mauvaise odeur mais dont les très belles fl. carmin vif, disposées en larges ombelles (de juillet en octobre), répandent un parfum exquis ; soleil ; endroit abrité ; sol léger.

Convallaria majalis (L.), la douz. 2 fr.	0.50
» » <i>grandiflora</i>	0.50
Convolvulus cantabricus (L.), fl. roses	0.50
» luteolus (A. Gr.)	2.50
» mauritanicus (Boiss.), fl. lilas-violet	0.50

Cette dernière n'est pas entièrement rustique.

Coptis asplenifolia (Salisb.)	1.50
Coreopsis auriculata (L.)	0.50
» diversifolia (D. C.)	1.50
» grandiflora (Nutt.)	0.50
» lanceolata (L.)	1.—
» palmata (Nutt.)	1.—
» philadelphicus (Hort.)	1.—
» rosea (Nutt.), à fl. roses	1.—
» senifolia (Mich.)	1.—
» tenuifolia (Ehrh.)	1.—
» trichosperma (Michx.)	1.—
» tripteris (L.)	0.50
» verticillata (L.)	1.—

Les Coreopsis vivaces sont extrêmement précieux pour la décoration des jardins et pour la confection des gerbes et bouquets ; leurs fleurs très brillantes, très nombreuses, ornementales, se gardent longtemps dans l'eau ; ils n'exigent aucun soin et demandent seulement un sol sain et un peu de soleil.

	fr. c.
Crambe cordifolia (Stev.)	1.—
» grandiflora (D. C.)	1.—
» maritima (L.), <i>Chou marin</i>	0.50
» orientalis (L.)	1.—
» Sewerzowi (Rgl.)	1.—

Grandes Crucifères dont les immenses panicules de fl. blanches, très ornementales surtout chez *cordifolia* et *grandiflora*, sont extrêmement belles à voir.



Crambe cordifolia.



Delphinium elatum.

Cucurbita perennis (A. Gr.)	5.—
Courge vivace et rustique.	
Cynanchum acutum (L.)	1.—
Datisca cannabina (L.)	1.—

	fr. c.
Delphinium albiflorum (Hort.)	1.—
» altissimum (Wall.)	0.50
» amœnum (Stev.)	0.50
» azureum (Hort.)	0.50
» » <i>v. Belladonna</i>	0.50
» Brunonianum (Royle)	2.50
» caucasicum (C. A. M.)	0.50
» cheilanthum (Fisch.)	0.50
» cœlestris (Hort.)	0.50
» crassicaule (Gmel.)	0.50
» Formosum (Boiss.-Huet), très beau	1.—
» grandiflorum (L.), bleu céleste superbe	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» » à fl. roses	1.—
» hybridum (Hort.)	0.50
» intermedium (Ait.)	0.50
» magnificum (Paxt.)	1.—
» nudicaule (Torr. Gr.)	1.—
» speciosum (Bieb.)	0.50
» splendens (Hort.)	0.50
» sulfureum (Boiss.), <i>Zakil</i>	1.—
» Tatsianense (Hort.)	1.50

Les Pieds d'alouettes vivaces sont excellents pour la décor. des jardins; les fleurs d'un bleu souvent superbe, passant, suivant les espèces, de l'azur du ciel au bleu très foncé, sont extrêmement belles et décoratives. *D. nudicaule* est rouge écarlate et *sulfureum* jaune clair.

Dianthus (Œillets).

Nous possédons une collection d'entre les plus beaux œillets doubles des balcons et fenêtres des montagnes de Suisse et d'Italie. C'est dans les vallées des Alpes italiennes qu'on voit les plus beaux œillets (*Garofani*) doubles, depuis les Malmaison jusqu'aux anciens œillets flamands. Nous les avons collectionnés et pouvons en fournir de jeunes plantes aux prix de 1 franc et 10 francs la douzaine (variées). Les superbes œillets de Poschiavo, qu'on cultive et vend en Engadine, se vendent 2 fr. 50 la pièce. Nous les recevons directement de la vallée de Poschiavo.



Dicentra spectabilis.

	fr. c.
Dianthus Plumarius , var. <i>Œillets mignardises</i> , dans les différentes variétés à fl. doubles ou simples, la douz. 5 fr.	0.50
» semperflorens (Hort.), <i>Œillet flon</i>	1.—
» Zonatus (Hort.), <i>Œillet cyclope</i>	0.50
Pour les autres <i>Dianthus v. pl. alpines</i>	
Dicentra eximia (Torr.)	0.50
» spectabilis (D. C.), <i>pl. d'ancre; Diclytra</i>	1.—
» » à fl. blanches	2.50
Le <i>D. spectabilis</i> est l'une des plus belles pl. que nous ait fourni le Japon; ses innombrables fl. rose carmin en forme de cœur avec, au centre, comme une ancre nacré, sont suspendues en dessous des tiges et des rameaux gracieusement arqués et s'y succèdent d'avril en juillet; ombre ou mi-ombre, sol léger.	



Dictamnus Fraxinella.

Dictamnus albus (L.), angl. <i>Dictame</i>	1.—
» angustifolius (Sweet)	2.50
» Fraxinella (Pers.), <i>Fraxinelle</i>	1.—
» obtusiflorus (Koch)	2.50
Rutacées à forte odeur balsamique très saine, à fl. roses ou blanches, en épis dressés; c'est le <i>Burning Bush</i> des Anglais; dans les soirs calmes de l'été, si l'on approche une allumette enflammée de la grappe en fleurs, le gaz qu'elle exhale de ses glandes résineuses prend feu et il se produit une flamme qui entoure toute la grappe (expérience bien connue de tous les étudiants en sciences). Soleil; mai-juin.	
Digitalis purpurea (L.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
V. pl. alpines pour Digit. jaunes.	
Dioscoræa , v. pl. grimpantes ou pl. alpines.	
Diplostegium umbellatum (D. C.), <i>Aster umbellatus</i>	1.—
Dipteracanthus canescens (Nees), <i>Ruellia canescens</i>	2.50
Dodartia orientalis (L.)	1.—
Doronicum , v. pl. alpines.	
Dracocephalum , v. pl. alpines.	

Echinacea angustifolia (D. C.), <i>Rudbeckia angust.</i>	fr. c.
» purpurea (Moench.), <i>Rudbeckia purp.</i>	1.50
» nana	0.50
	2.50

Excell. pl. à capitules rouge pourpre, à très longs ligules retombants chez angustif. ; fl. excellentes pour bouquets chez purpurea et qui se conservent plus. semaines dans l'eau. Cette dernière est l'une des plus belles et l'une des plus florifères d'entre les pl. vivaces ; sol. ou mi-sol. ; sol léger ; juin-novembre.

Echinops nanaticus (Rochel)	1.—
» humilis (Bieb.)	0.50
» Ritro (L.), <i>Boule bleue</i>	0.50
» ruthenicus (Fisch.)	1.—
» sphaerocephalus (L.), <i>Boule azurée</i>	0.50

Ce sont les *Globe Thistle* des Anglais ; Composées à fl. réunies en boules absolument sphériques, bleu clair ou grisâtre chez sphaeroceph., bleu intense chez Ritro, le meilleur de tous. Pl. vivace de première valeur, fleurissant longtemps (juillet-sept.) et se conservant l'hiver (pour bouquets secs) ; c'est une pl. ornementale, très solide, qui n'exige qu'un sol sain et du soleil ; réussit dans les situations les plus sèches et les sols arides.

Elymus arenarius (L.), <i>Graminée à fl. bleuâtres</i>	0.50
---	------

Eomecon chionantha (Hauce)	2.50
-----------------------------------	------

Epheda, v. arbustes.

Epilobium, v. pl. alpines.



Epimedium alpinum.

Epimedium , v. pl. alpines.	
Eremostachys diversifolia (Rgl.)	2.50
» laciniata (Bunge)	2.50
» v. Iberica	2.50

Très belles Labiées géantes, aux nombreux étages de fl. jaune et brun ; soleil.

Eremurus, v. pl. bulbeuses.

Erigeron, v. pl. alpines.

Eryngium cœruleum (Bieb.), <i>E. dichotomum</i>	0.50
» creticum (Lam.)	0.50
» giganteum (Bieb.)	0.50
» maritimum (L.), verdure gris plomb	1.—
» Oliverianum (Del.)	0.50
» planum (L.), <i>Panicaut du désert</i>	0.50
» Rothenbergi (Hort.)	1.—

Voir en outre, pl. alpines.

Ces divers Panicauts appartiennent tous au même genre que le Chardon bleu de nos Alpes ; moins élégants dans leur découpure ils ont cependant tous une certaine valeur ornementale ; fleurs, t. involucres (qui sont souvent très finement découpés) et tiges, presque jusqu'à la base, bleuisant au moment de l'anthèse et deviennent, en été, d'un bleu intense ; on en confectionne des bouquets d'hiver car ils conservent bien leur teinte et leur forme quand on a soin de les sécher à l'ombre. Ce sont d'ailleurs d'excellentes pl. décoratives et qui offrent l'avantage de réussir dans les plus mauvais sols et les pentes les plus arides.



Eryngium planum.

Erythrochæte palmatifida (S. Z.), <i>Senecio japonicus</i>	1.—
Eulalia japonica (Tsin)	1.—
» fol. aurea variegata	1.—
» zebrina	1.—

Graminées ornementales.



Eupatorium purpureum.

Eupatorium ageratoides (L.)	0.50
» album (L.)	0.50
» altissimum (L.)	0.50
» aromaticum (L.)	0.50

	fr. c.
Eupatorium cannabinum (L.)	0.50
» » à fl. blanches.	1.—
» japonicum (Thunb.)	1.—
» Kirilowii (Turcz.)	1.—
» perfoliatum (L.)	0.50
» purpureum (L.)	0.50
» verticillatum (Mühlb.)	0.50
Composées à fl. serrées, en capitules dressés, blanches ou roses; juillet-sept., soleil.	

Ferula, v. pl. alpines.

Francoa appendiculata (Cav.)	1.—
---	-----

» ramosa (Don.)	1.—
V. pl. non rustiques.	

Fraseria speciosa (Dougl.)	2.50
---	------

Fritillaria, v. pl. bulbeuses.

Funkia (*Hemerocallis*).

» Fortunei (Bak.)	0.50
» glauca (Sieb.)	1.50
» grandiflora (S. Z.), fl. blanches, très odorantes.	0.50
» lancifolia (Spreng.)	0.50
» ovata (Spreng.), <i>F. caerulea</i>	0.50
» » <i>v. marginata</i>	1.50
» Sieboldiana (Hook.), <i>F. cucullata</i>	0.50
» » variegata	1.50
» subcordata (Spreng.), fl. blanc., très odorantes, <i>F. alba</i>	0.50
» undulata (Otto et Diet.)	1.50

Ces pl., connues sous le nom d'Hémérocalles, sont des esp. d'ombre très résistantes; ce sont les seules pl. qui puissent résister dans les cours et jardins du centre de la ville de Londres; leurs superbes feuillages sont un ornement de premier ordre pour les jardins et la culture en vases ou en bacs. Ils résistent aux hivers les plus rigoureux et fleurissent, de juin en automne, suivant les esp. Les *F. grandif.* et *subcord.* ont de grandes fl. blanc pur répandant le parfum du Lis blanc des jardins.



Funkia ovata.

Gaillardia aristata (Pursh)	0.50
» aurantiaca (Hort.)	0.50
» grandiflora (Hort.)	0.50
» » <i>v. J. Kelway</i>	1.—
» » <i>v. Distinction</i>	1.—
» » <i>v. Maxima</i>	1.—

	fr. c.
Gaillardia pulchella (Foug.)	0.50
» » <i>v. picta</i>	0.50
» » <i>v. Lorenziana</i>	1.—
Les Gaillardes sont de belles Composées aux gr. fl. rouge et jaune; juin-sept.; soleil; excell. pour bouquets.	
Galatella (<i>Aster</i>) canescens (D. C.)	0.50
» racunculoides (D. C.)	0.50
» hyssopifolia (Nees)	0.50
» punctata (Nees)	0.50

Ce sont des Asters aux capitules réunis en ombelles serrées; très belles pl. fleur. de juillet en octobre.



Galega officinalis.

Galega officinalis (L.)	0.50
» orientalis (Lam.)	0.50
» persica (Pers.), <i>G. officinalis albiflora</i>	0.50
Papilionacées vigoureuses et très florifères (juin-novembre), aux innombrables fl. lilas et violet ou blanches, très robustes et se contentant de toutes les situations.	

Galtonia candicans, v. pl. bulbeuses.

Gaura Lindheimeri (Engelm.)	0.50
Grande pl. aux tiges élancées, garnies de fl. très élégantes, blanc et rose, très propre à agré- menter les pelouses de verdure, les plates- bandes, les grands rochers; soleil; juillet- octobre.	

Gazania, v. pl. non rustiques.

Geranium , v. pl. alpines.	
Geum chilense (Balb.), <i>Benoite rouge</i>	0.50
» coccineum (S. S.)	0.50
» » <i>v. grandiflorum</i>	1.—
» » <i>v. grandiplenum</i>	1.—
» » <i>v. miniatum</i>	1.—

Ces Benoites sont à fl. rouge écarlate très vif chez Chil. et Grandifl.; sol frais et léger; soleil; fleuriss. de mai en automne.

Gillenia stipulacea (Nutt.)	1.50
» trifoliata (Moench)	1.50

Ce sont des Spirées à gr. fl. blanches avec des tiges rouge brun; mai-août.

Gladiolus, v. pl. bulbeuses.

Glaucium corniculatum (Curt.), <i>Pavot cornu</i>	0.50
» luteum (Scop.), <i>Pavot marin</i>	0.50
» rubrum (S. S.), fl. rouge brique	0.50


fr. c.

Pavots aux feuilles gris bleu, très élégamment découpées, aux fl. jaunes, fauves ou rouges; juin-novembre. Lieux arides et secs, graviers, etc.; les f. qu'on cueille tout l'hiver sur la pl. constituent une merveilleuse décoration dans les bouquets.

Glycyrrhiza glabra (L.), *Réglisse* . . . 1.—
Gnaphalium Margaritaceum, v. *Ana-*
phalis.

Grindelia glutinosa (Dun.) . . . 0.50
 » **humilis** (Hook.) . . . 0.50
 » **integrifolia** (D. C.) . . . 0.50
 » **inuloides** (Willd.) . . . 0.50
 » **patens** (Greene) . . . 0.50
 » **robusta** (Nutt.) . . . 0.50
 » **rubricaulis** (D. C.) . . . 0.50
 » **squarrosa** (Dun.) . . . 0.50

Composées à fl. jaunes très brillantes, nombreuses, à involucre élégant; sept.-nov.; sol. ou mi-sol.; très bonnes pour bouquets.



Gypsophila paniculata.

Gypsophila paniculata (L.) . . . 1.—
 » **Steveni** (Fisch.) . . . 0.50
 » **Scorzoneraefolia** (Seringe) . . . 0.50

La *G. panicul.* est l'une des meill. d'entre les fl. à bouquets et une excell. pl. d'ornement; ses myriades de petites fl. blanches, portées sur des tiges capillaires et diffuses lui donnent l'air d'un voile de gaze entourant la pl.; on l'utilise beaucoup pour donner de la grâce et de l'élégance aux groupements de fl. coupées car elle se maintient bien et même se sèche pour les bouq. d'hiver; isolée dans un gazon elle fait un effet superbe; soleil et sol profond. Les autres ont de plus grandes fl., roses.

Habitzia tamnoides (Bieb.), v. pl. grim-pantes.

Harpalum rigidum, v. *Helianthus*.
Heleniastrum puberulum (Kuntze) . . . 1.50
Helenium autumnale (L.) . . . 0.50
 » » v. *cupreum* . . . 1.—
 » » v. *striatum* . . . 1.—
 » **Bigelowi** (A. Gr.) . . . 1.—
 » **Hoopesi** (A. Gr.) . . . 0.50
 » **pumilum** (Willd.) . . . 0.50

fr. c.

Composées à fl. jaunes ou rouge cuivre, très florif. et bonnes pour bouquets; soleil. Juillet-octobre.



Helenium autumnale.

Helianthella quinquænervis (A. Gr.) . . . 0.50
 » **uniflora** (Torr. Gr.) . . . 0.50
Helianthemum, v. pl. alpines.




Helianthus multiflorus à fl. doubles.

Helianthus angustifolius (L.) . . . 0.50
 » **atrorubens** (L.) . . . 0.50
 » **californicus** (D. C.), ¹*Soleil d'automne* . . . 0.50
 » **doronicoides** (Lam.), très grandes fleurs . . . 0.50
 » **lætiflorus** (Pers.) . . . 0.50
 » **Maximiliani** (Schrad.), *Soleil d'été* . . . 0.50
 » **mollis** (Lam.) . . . 0.50
 » **multiflorus** (L.) . . . 0.50
 » » à fl. doubles . . . 0.50
 » » à fl. pleines . . . 0.50
 » **Orgyalis** (D. C.) . . . 0.50

¹Nous l'avons vendu longtemps sous le faux nom d'*H. Maximiliani* sous lequel nous l'avons reçu il y a 12 ans qui est, d'ailleurs, celui qui court les jardins. L'*H. Max.* est une toute autre plante aux capitules jaunes très clairs, fleurissant en juillet-août.

Helianthus pumilus (Nutt.)	fr. c.
» rigidus (Desf.), <i>Harpalum rigidum</i>	0.50
» » v. <i>Météore</i>	0.50
» » v. <i>Miss Nelly</i>	0.50
» » v. <i>Ligeri</i>	0.50
» strumosus (L.)	0.50
» tuberosus (L.), <i>Topinambour</i>	0.50

Les *Soleils* ou *Tournesols* vivaces ont été nommés avec raison les *rois des jardins*; leurs nombreux et brillants capitules jaunes au cœur brun, sont un ornement précieux pour les bouquets et gerbes de fl.; leurs grandes formes produisent le plus bel effet dans les parterres, les parcs et jardins, surtout quand on les isole dans les pelouses. L'H. californicus est la merveille de l'automne; ses nombreux capit. oranges et presque séniles forment une guirlande qui court le long des tiges gracieusement arquées et élevées de près de 3 cm.; il fleurit à l'arrière-automne. H. rigidus, qui fleurit de juillet en sept., est une excell. fl. à couper, de même que multiflorus et doronicoides. Ils ne demandent aucuns soins, se contentent de tout sol pas trop argileux et sont par excellence des pl. « bon enfant. »



Helianthus Orgyalis.



Helianthus rigidus.

Heliopsis lævis (Pers.), <i>Helianthus lævis</i>	fr. c.
» » v. <i>scabra</i>	0.50
Voisin des soleils; capitules orangé vif; juillet-sept.	



Hellebores hybrides.

Helleborus hybridus (Hort.)	0.50
------------------------------------	------

Les *Hellebores* hybrides, voisins de la Rose de Noël, ont été obtenus par le croisement des H. abschasicus, niger, orientalis et viridis; ils offrent des couleurs et teintes très variées dans les tons roses, rougeâtres, cuivrés, verdâtres et blancs et fleurissent de janvier en avril. Leur feuillage est par lui-même très décoratif et leurs fleurs, qui apparaissent à une époque où l'on n'a encore que les fl. du Midi et les perce-neige, sont extrêmement précieuses. Pour les conserver dans l'eau, il faut pratiquer à la base de la tige, 2 ou 3 incisions; sans cela elles flétrissent de suite; ombre ou mi-ombre.

Pour les autres *Hellebores*, v. pl. alpines.

Hemerocallis aurantiaca (Hort.)	1.50
» cruenta (Hort.)	1.50
» Dumortieri (Morr.)	1.50
» flava (L.), <i>Lis jaune</i>	0.50
» fulva (L.)	0.50
» » à fl. doubles	1.50
» Kwanso (Rgl.)	1.50
» Middendorffiana (Trautr.)	0.50
» minor (Mill.)	1.50

Les *Hémérocailles* (angl. Day lilies) sont de beaux lis aux fl. jaunes, parfois très parfumées, qui fleurissent de mai-juin et forment de grosses touffes décoratives et élégantes; soleil.

	fr. c.
Hepatica (<i>Anemone</i>) triloba (Chaix), la	
douz. 5 fr.	0.50
» à fl. blanches	0.50
» bleu clair	0.50
» rose vif	0.50
» rose clair	0.50
» à fl. bleu foncé très pleines . . .	1.—
» à fl. rose foncé très pleines . . .	1.—

Les *Hépatiques*, *Fille avant la mère*, *Trinitaire*, etc., sont les premières fl. qui, avec les *Hellébore*s et les *Perce-neige*, apparaissent dans les jardins; les var. à fl. pleines forment de très belles bordures même en pl. sol., tandis que celles à fl. simples préfèrent l'ombre; toutes sont calcicoles et aiment la chaux dans le sol.



Heracleum giganteum.

<i>Heracleum giganteum</i> (Fisch.), <i>H. villosum</i>	0.50
» <i>lanatum</i> (Mich.)	1.50
» <i>Leichtlini</i> (Hort.)	1.50
» <i>Mantegazzianum</i> (Lev. et Som.) . .	0.50
» » à feuilles panachées jaune et vert .	5.—
» <i>pubescens</i> (Bieb.)	0.50

Pl. très grandes, aux formes architecturales, très propres à isoler dans les gazons ou les grands jardins. L'*H. Mantegazzianum*, dont les graines ont été rapportées du Caucase par MM. Levier et Sommier et données à notre jardin, est la merveille des pl. géantes. C'est l'une des meill. pl. mellifères et sa gigantesque ombelle, qui, dans un sol profond, meuble et gras, peut atteindre 1 m. $\frac{1}{2}$ de diamètre, porte (voir *Nuove Giornale botanico italiano*, vol. VI, 1895), près de 10,000 fleurs, est portée par une hampe pourprée, haute de 2 $\frac{1}{2}$ à 3 m.; les feuilles sont gigantesques et toute la pl. produit un effet superbe.

<i>Hesperis Dinarica</i> (Beck.)	5.—
» <i>matronalis</i> (L.), <i>Girarde</i>	0.50

Crucifères aux fl. odorantes.

<i>Heuchera</i>, v. pl. alpines.	
<i>Hibiscus militaris</i> (Cav.)	2.50
» <i>palustris</i> (L.), <i>Ketmie herbacée</i> . .	2.50
» à fl. blanches	2.50
» <i>roseus</i> (Thore)	2.50

Ces *Ketmies* ont des fl. superbes, de très grandes Mauves ou Althées, d'un très beau car-

min ou rose-clair, ou blanc-rosé avec des macules foncées à la base. Ce sont des fl. brillantes et très décoratives et ces pl. sont d'entre les plus belles qui se puissent voir. Très rustiques sous notre climat elles ne demandent qu'une bonne terre de jardin profonde et une situation un peu chaude.



Hibiscus palustris.

<i>Hoteia (Astilbe) japonica</i> (Desne)	0.50
Jolie Saxifragée à fl. blanches.	
* <i>Hypericum aureum</i> (Bart.)	1.—
» <i>Boissieri</i> (Petr.)	0.50
» <i>calycinum</i> , v. pl. alpines.	
* » <i>densiflorum</i> (Pursh.)	1.—
* » <i>elatum</i> (Dryand)	1.—
» <i>empetrifolium</i> (Willd.)	1.—
» <i>erectum</i> (Thunb.)	0.50
* » <i>galioides</i> (Lam.)	1.—
» <i>Gebleri</i> (Led.)	0.50
* » <i>hircinum</i> (L.), <i>Millepertuis Bouc</i> . .	0.50
* » <i>Hookerianum</i> (Arnh.)	2.50
» <i>japonicum</i> (Thunb.)	1.50
» » <i>microphyllum</i>	1.50
* » <i>Kalmianum</i> (L.)	1.—
* » <i>Moserianum</i> (Hort.), fl. jaunes à anthères rouges.	0.50
* » <i>patulum</i> (Thunb.)	1.—
* » <i>prolificum</i> (L.)	1.—

Les esp. marquées d'un * sont arbustives ou sous-frutescentes; fl. jaunes, très brillantes, se succédant de juin en août; soleil.

***Hyssopus*, v. pl. alpines.**

***Iberis*, v. pl. alpines.**

***Incarvillea*, v. pl. alpines.**

***Inula*, v. pl. alpines.**

<i>Ipomœa leptophylla</i> (Torr.)	5 —
» <i>pandurata</i> (Meyer)	5.—

Liserons vivaces à gros tubercules, à belles et nombreuses fl. blanches, à gracieux rameaux retombants; l'*I. pandurata* est l'une des plus rares et des plus belles d'entre les pl. rustiques chez nous; il lui faut un sol profond, meuble, une exposition chaude et abritée; fleurit de juillet en octobre.

* <i>Iris acoroides</i> (Spach.)	1.—
» <i>albo-purpurea</i> (Matsum.)	1.—

	fr. c.
<i>Iris aurea</i> (Lindl.)	1.—
» <i>Bloudowii</i> (Led.)	1.50
» <i>bracteata</i> (Wats.)	1.50
» <i>Correana</i> (Rgl.)	1.—
» <i>cuprea</i> , v. <i>fulva</i> .	
» <i>Delavayi</i> (Franch.)	1.—
» <i>desertorum</i> (Ker.)	0.50
» <i>dichotoma</i> (Pall.)	0.50
* <i>Douglasiana</i> (Herb.)	1.—
» v. <i>pygmæa</i>	1.—
» <i>ensata</i> (Thunb.)	0.50
» <i>fimbriata</i> , v. <i>Japonica</i> .	
* <i>fulva</i> (Mühl.), <i>I. cuprea</i> ; fl. brunes	1.—
» <i>germanica</i> (L.)	0.50
» » v. <i>albiflora</i>	0.50
» » v. <i>pallida</i>	0.50
» » v. <i>lutescens</i>	0.50
» » horticoles : <i>Actéon</i> , <i>Alvarès</i> , <i>Arlequin</i> , <i>Bossuet</i> , <i>Bridesmaid</i> , <i>Ca-</i> <i>nari</i> , <i>Clio</i> , <i>Darius</i> , <i>Darwin</i> , <i>Du-</i> <i>chesse de Nemours</i> , <i>Fontarabie</i> , <i>Gypsea</i> , <i>Lady Stanhope</i> , <i>Mad.</i> <i>Château</i> , <i>Miralba</i> , <i>Perle</i> , <i>Prince</i> <i>Alexandre</i> , <i>Pénélope</i> , <i>reticulata su-</i> <i>perba</i> , à 50 cent. la pièce.	
* <i>gigantea</i> (Carr.)	1.—
* <i>Gueldenstædtiana</i> (Lap.), <i>J. Halophila</i>	0.50
» <i>Hartwegi</i> (Baker)	1.50
» » à fl. blanches	1.50
» <i>Hookeriana</i> (Fost.)	1.—
» <i>humilis</i> (Bieb.)	1.—
» <i>japonica</i> (Thunb.), <i>chinensis</i> , <i>fimbriata</i>	1.—
» <i>Kämpferi</i> , v. <i>lævigata</i> .	
* <i>lævigata</i> (Fisch.), <i>I. Kämpferi</i>	0.50
L'une des plus belles espèces.	
» <i>lævigata</i> , var. à fl. blanches	2.50
» » var. à fl. doubles	2.50
» » variété japonaise de 1 ^{er} choix	1.50
» <i>longipetala</i> (Herb.)	1.—
» <i>missouriensis</i> (Nutt.)	1.—
* <i>Monnieri</i> (D. C.)	1.—
» <i>moræoides</i> (Ker.)	1.50
» <i>monspur</i> (Foster)	1.—
* <i>ochroleuca</i> (L.)	1.50
» <i>oxypetala</i> (Bunge), odorant	1.50
* <i>pseudo-acorus</i> (L.), <i>paludéen</i>	0.50
» » à feuilles panachées	1.—
* <i>sibirica</i>	0.50
» <i>puria</i> (L.)	0.50
» <i>tenax</i> (Dougl.)	1.50

Voir en outre pl. bulbeuses pour les esp. bulb. et du groupe oncocyclus. Tous ces iris sont des pl. solides, fleurissant de mai en juill., et n'exigeant pas de soins; ils aiment le soleil; les esp. marquées d'un * préfèrent un sol humide.

<i>Kentrophyllum leucocaulon</i> (D. C.)	1.50
<i>Kniphofia aloides</i> (Moench), <i>Tritoma</i> <i>Uvaria</i>	0.50
» <i>comosa</i> (Hochst), très rare	2.50
» <i>Leichtlini</i> (Baker)	1.—
» <i>Mac-Owani</i> (Baker)	0.50
» <i>Nelsoni</i> (Mart.)	1.—

<i>Kniphofia pauciflora</i> (Baker)	0.50
» <i>Tuckii</i> (Leichtl.)	2.50

De très nombr. var. ont été obtenues chez ces pl. superbes, aux fl. rouge et jaune, brique ou jaune, disposées en épis dressés et fleurissant abondamment à partir de juillet. Nous offrons les suivantes aux prix de 1.50 :

Atropos (rouge brique, précoce). — *Aurea* (jaune d'or). — *Benvenuta* (jaune clair). — *Chloris* (jaune abricot). — *Clotho* (écarlate foncé, très beau). — *Corallina* (rouge vif). — *Diana* (jaune, à pistils rouges). — *Floribunda* (très précoce). — *Glaucescens* (à feuil. bleuâtre). — *Grandis* (à grandes foimes). — *H. Cannell* (cramoisi). — *Héroïne* (jaune). — *Lachesis* (jaune). — *Leda* (écarlate). — *Météore* (jaune paille). — *Nobilis* (à très larges épis). — *Obélisque* (jaune foncé). — *Ophir* (jaune orangé). — *Osiris* (très belle coul. orangé vif). — *Saundersi* (rouge et jaune). — *Sirius* (orange, pl. compacte). — *Solfatare* (jaune). — *Star of Bade-Bade* (très grande fl. jaune). — *Surprise* (jaune bronzé). — *Stella* (jaune, très beau). — *Victor Lemoine* (jaune et rouge).

Lathyrus, v. pl. alpines.

Lavandula, v. pl. alpines.

Leucojum æstivum (L.), *Perceneige d'été*. 0.50

V. pl. bulbeuses.

Liatris, v. pl. alpines.

Ligularia, v. pl. alpines.

Lilium, v. pl. bulbeuses.

Linum, v. pl. alpines.



Iris germanica (variétés horticoles).



Iris lævigata.



Iris sibirica.



Kniphofia aloides.

	fr. c.
Lobelia cardinalis (L.)	0.50
» fulgens (Willd.)	0.50
» v. « <i>Queen Victoria</i> »	0.50
» Gerardi (Hort.)	1.—
» v. <i>Lugdunensis</i>	1.—
» v. <i>Rivorei</i>	1.—
» rosea-ardens (Hort.)	1.—
» splendens (Willd.)	0.50
» syphilitica (L.)	0.50
» à fl. blanches	0.50

Très belles pl. d'ornement, à grand effet, fleurissant de juillet en automne; mi-ombre; sol frais et sain.



Lobelia syphilitica.

Lychnis chalconica (L.), <i>Croix de Malte</i>	0.50
» à fl. blanches	0.50
» à fl. rose chair	0.50
» coronaria (L.), <i>Coquelourde</i>	0.50
» à fl. blanches	0.50
» dioica , à fl. doubles	1.50

Excell. pl. pour lieux ensoleillés, plates-bandes, et pour isoler dans pelouses; la Croix de Malte, avec ses capsules de fl. vermillon et la Coquelourde, avec sa masse de grandes fl. carmin vif, sont d'entre les meill. pl. d'ornement; cette dernière fleurit tout l'été.

Lysimachia , v. pl. alpines.	
Lythrum hyssopifolium (L.)	0.50
» Salicaria (L.)	0.50
» v. <i>rosea</i>	0.50
» tomentosum (Mill.)	1.—
» virgatum (L.)	0.50

Pl. des marécages, aux épis de fl. carmin ou roses; été; fraîcheur.

Maclaya , v. <i>Bocconia</i> .	
Megasea , v. <i>Saxifraga</i> , pl. alpines.	
Mertensia , v. pl. alpines.	
Metaplexis Stauntoni (Schult.)	2.50
Michauxia , v. pl. alpines.	
Mimulus , v. pl. alpines.	
Monarda dydima (L.), <i>Thé d'Oswego</i>	0.50
» à fl. blanches; très belle	1.—
» à fl. roses	0.50
» fistulosa (L.), <i>Bergamotte</i>	0.50
» Kalmiana (Pursh.)	0.50
» purpurea (Hort.)	0.50
» Russelliana (Nutt.), <i>Monarde rose</i>	0.50

fr. c.

Très belles pl. à fl. élégantes et décoratives, à feuillage odoriférant, fleurissant de juillet en automne; mi-ombre; bon sol sain; excell. fl. pour bouquets. Le *M. dydima* a les fl. d'un rouge vermillon velouté très brillant; le *M. fistulosa* les a d'un carmin vif et *Russelliana* rose lilas. Ces pl., trop peu connues, méritent d'être dans tous les jardins.



Monarda dydima.

Morine, v. pl. alpines.
Narcissus, v. pl. bulbeuses.
Nardosmia, v. *Petasites*, pl. alpines.
Nepeta, v. pl. alpines.
Onothera, v. pl. alpines.
Ostrowskia, v. pl. alpines.
Pæonia, *Pivoines*.

I. ESPÈCES BOTANIQUES (à fl. simples).

<i>Pæonia albiflora</i> (Pall.), à fl. blanches, odorantes	2.50
» <i>anomala</i> (L.)	2.50
» <i>arietina</i> (Anders.)	2.50
» <i>Banatica</i> (Roch.), <i>P. pubens</i>	2.50
» <i>corallina</i> (Retz.)	1.—
» <i>corsica</i> (Lieber).	2.50
» <i>decora</i> (Anders.), <i>P. romanica</i>	2.50
» <i>Emodi</i> (Wall.), fl. blanc-jaunâtre	2.50
» <i>humilis</i> (Retz.)	1.—
» <i>lobata</i> (Desf.)	1.—
» <i>officinalis</i> (Retz.)	0.50
» » <i>v. rosea</i>	1.—
» <i>paradoxa</i> (Anders.)	1.—
» <i>peregrina</i> (L.)	0.50
» <i>Russi</i> (Bivone)	2.50
» <i>tenuifolia</i> (L.)	1.—
» <i>triternata</i> (Pall.)	2.50
» » à fl. blanches	2.50
» <i>Wittmanniana</i> (Lindl. non Steven), fl. blanc-jaune	2.50

II. VARIÉTÉS HORTICOLES :

P. albiflora, *Pivoines de Chine* à 2 fr. 50 :
 Alice Crousse (rose et blanc). — Abel de Pujol
 (nain, pét. rose foncé violacé et découpés). —

fr. c.

Ambroise Verschaffelt (fl. bombée, rouge-écarlate). — Auguste Mielley (blanc lilacé pâle). — Caroline Allain (grande fl. blanche-lilacée). — Comte d'Osmont (blanche à cœur soufré). — Couronne d'or (blanc crème avec étamines d'or; tardif). — Daubenton (rose pourp. violacé; pétales bordées de blanc). — Duc de Wellington (grande fl., blanc légèrement soufré). — Festiva (pl. naine; fl. blanc-pur, tacheté carmin). — Festiva matina (blanc-pur, pétales bordées de carmin). — Fulgida (cramoisi). — Général Bedeau (rose-pâle). — Henri Demay (rouge cerise pourpré). — Hortense (très beau rose). — Lady Darmouth (blanc-pur). — Léonie (blanc-carné). — L'espérance (rose-carné, strié et pointillé carmin). — Lutea superba (carné tendre, centre ligulé). — Mad. Bollet (rose-carné; pétales liseré-carmin). — Mad. Moreau (rose-vineux). — Mad. Laguet (grande fl. rose-saumoné). — Modèle de perfection (rose lavé blanc). — M. Dupont (blanc-pur; pétales sillonnées de lignes carmin vif, très beau). — M. Gaillard (pourpre-violacé). — M. de Ribert (pourpre-violacé). — Prince Troubetzkoï (fl. bombées, rouge-violacé-vineux). — Richard Petters (carné-tendre). — Rosed'amour (rose-tendre). — Sydonie (grande fl. rose-pâle). — Téniers (grande fl. rose-vif-violacé).



Pæonia Wittmanniana.

<i>Pæonia officinalis</i> , à fl. doubles	0.50
» <i>tenuifolia</i> (L.), à fl. doubles	1.—
<i>Papaver bracteatum</i> (Lindl.), <i>P. involucratum</i>	0.50
» » <i>v. maximum</i> , très grande fl.	2.50
» » <i>v. persicum</i> (Leichtl.)	2.50
» » <i>v. præcox</i>	1.—
» <i>orientale</i> (L.), <i>Pavot vivace</i>	0.50
» <i>splendidissimum</i> (Hort.)	1.—

Les var. suivantes du Pavot d'Orient sont disponibles à 1.50 pièce : Blush Queen, Brillant, Best Scarlet, Duc of Teck, multiflorum, semiplenum, Scarlet géant, Le Shah, hybrida, Salmon Queen.


Ces pavots vivaces sont des pl. vraiment superbes et hautement ornementales; ils donnent à profusion leurs énormes fl. rouge-vermillon, écarlate ou cramoisi et ne demandent qu'un sol profond et un peu de soleil; mai-juin; refleurissant parfois à l'automne.



Pentstemon confertus.



Pentstemon Digitalis.



Pentstemon glaber.



Pentstemon heterophyllus.



Pentstemon hybridus.



Pentstemon Jeffrayanus



Pentstemon ovatus.



Pentstemon pubescens.

	fr. c.
Pentstemon acuminatus (Dougl.), fl. bleues	0.50
» albidus (Nutt.), blanches	1.50
» alpinus (Torr.), blanc-bleuâtre	2.50
» antirrhinoides (Benth.), jaune vif	2.50
» azureus (Benth.), bleu azur	1.—
» barbatus , v. <i>Chelone</i> .	
*» campanulatus (Willd.), rose-pourpre	1.50
» carinatus (Kell.), rose	1.50
*» Cobæa (Nutt.), bleu-rose; très gr. fl.	0.50
» centranthifolius (Benth.), rouge écarlate vif	2.50
*» confertus (Dougl.), basse; fl. bleues	1.—
» cordifolius (Benth.), rouge vif	2.50
» cyananthus (Hook.), violet très foncé	1.—
» deustus (Dougl.), jaunâtre; très beau	2.50
*» diffusus (Dougl.), rose pourpre	0.50
*» Digitalis (Nutt.), blanc-bleuâtre	0.50
» Eatoni (A. Gray), rouge-vermillon	2.50
» Gentianoides (Poir.), versicolore	1.—
*» glaber (Pursh.), violet-rose	0.50
» glandulosus (Dougl.), lilas violacé	1.—
» glaucus (Graham), violet-rougeâtre	1.—
» Hallii (A. Gr.), novell. esp. californ.	2.50
» Hartwegi (Benth.), écarl. chez le type	2.50
» heterophyllus (Lindl.), très beau bleu	2.50

*» Pentstemon humilis (Nutt.), bleu-lilacé	1.—
*» hybridus , var. <i>Newbury gem</i> , rouge ardent	2.50
» Jeffrayanus (Hook.), beau bleu	1.—
» lævigatus (Ait.), blanc teinté bleu	1.—
» Lemmoni (A. Gr.), nov. esp. californ.	2.50
» Menziesii (Hook.), pourpre lilas	1.—
*» ovatus (Dougl.), bleu-rougeâtre	0.50
*» pubescens (Sol.), blanc-bleuâtre, opale	0.50
» puniceus (A. Gr.), rouge minium	2.50
» Richardsonii (Dougl.), bleu-violacé	1.—
» rubricaulis (Greene), rouge-pourpre	0.50
» Scouleri (Dougl.), rose-violacé	1.—
» virgatus (A. Gr.), nov. esp. du Nouv. Mexique	2.50
» Wrightii (Hook.), rouge-violacé	1.—

Les *Pentstemon* (*Beard tongue* des Américains) sont d'excell. pl. viv. très florifères et extrêm. gracieuses, fleur. l'été et abondamment, très propres à la confect. des bouquets et des gerbes, très élégantes dans les jardins et produisant un effet superbe. Les espèces marquées d'un * sont les plus faciles à cultiver dans un sol ordinaire; tous aiment le sol. ou le demi-sol. et un sol plutôt léger et frais.

Petasites giganteus (Schmidt) . . . 1.—

Pl. à feuil. gigantesques, orbiculaires et très décorat.; propre à garnir les lieux humides et ombragés; traçante. V. pl. alpines.

Phlox vivaces hybrides: il en existe deux groupes différents. Le premier comprend les var. précoces qui proviennent des *suffruticosa* et *glaberrima*; le second, les tardives, odorantes, qui proviennent de croisements entre les *P. maculata* et *paniculata*. Cette dernière catégorie a reçu le nom de *Phlox decussata* (Hort.). Il en existe un grand nombre de variétés dont nous n'avons conservé et multiplié que les meilleures que nous offrons au prix de 50 cts. le pied; les principales sont: *Aurore*, *Alphonse*, *Karr*, *Eclaireur*, *Eclatant*, *Blanc pur*, *Rêve d'or*.

Phygelius capensis (Meyer) . . . 1.—



Phygelius capensis.

Physalis, v. pl. alpines.

Physostegia virginiana (Benth.) . . . 0.50
 » à fl. blanches . . . 0.50

Très belle Labiée à fl. roses, disposées en épis dressés et se succéd. de juill. en automne; très décorative et propre pr. bouquets; la var. à fl. blanc pur est également très belle; mi-soleil ou soleil.



Physostegia virginiana.

Phytolacca decandra (L.) . . . 0.50
Platycodon autumnale (Decsne) . . . 1.50
 » **glaucum (D. C.)** . . . 1.50
 » **grandiflorum (D. C.)** . . . 0.50
 » à fl. blanches . . . 0.50
 » **v. nanum** . . . 0.50
 » **Mariesi (Hort.)** . . . 0.50

Excell. Campanules à très grandes fl. bleu-violacé, très foncé, blanc pur chez la variété bl., très ornementales et fleurissant de juillet en oct.; sol sain et profond; soleil.



Platycodon grandiflorum.

Polygonum cuspidatum (S. Z.) (P. Sieboldi) . . . 0.50
 » **cuspidatum, var. à feuilles panachées** . . . 1.—
 » **molle (Don.)** . . . 0.50

Polygonum Sacchalinese (Schmidt) . . . 0.50
 » **Weyrichii (Schmidt), à feuilles panachées** . . . 1.—

Ces Renouées vivaces sont de belles pl. d'ornement grâce à leurs tiges élégantes et feuillées, à la vigueur de leur croissance (les cuspid. et Sacchal. atteignent dans leurs tiges annuelles près de 3 m. de haut) et au fait qu'elles réussissent dans les plus mauvaises conditions. Le P. molle est moins décoratif, mais il offre, à l'arrière-automne (oct.-novembre), des grappes dressées de fl. blanc pur sur tiges pourpres qui sont charmantes et excell. pour bouquets.



Polygonum cuspidatum.



Auricules des jardins.

fr. c.
Potentilla, v. pl. alpines.
Primevères des jardins, *Auricules*, *Primevères doubles*, etc. 0 50
Primula, v. pl. alpines.
Psoralea, v. pl. méditerranéennes, etc.
Pulmonaria, v. pl. alpines.



Pyrètre à fl. pleines.

Pyrethrum roseum (Lindl.) 0.50

Variétés horticoles à fl. souples et doubles, rose, clair ou vif, carmin foncé ou clair, écarlate, cramoisi, pourpre, blanc pur, etc., à 1 fr.
 Les Pyrêtres fleurissent tout l'été; ce sont d'excellentes fl. à bouquets, se conservant longt. dans l'eau et de bonnes pl. de décoration; soleil; sol meuble.

Ranunculus asiaticus, v. pl. bulbeuses.

* **Rheum Collinianum** (Baillon) 5.—

* » **Emodi** (Wall.), *Rhubarbe de l'Himalaya* 1.50

* » **officinale** (Baillon), *Rh. palmat. v. Tanguticum* 1.50

* » **palmatum** (L.) 1.50

* » » fl. roseis 2.50

* » » rubrum 2.50

* » **Rhaponticum** (L.), *Rhubarbe alimentaire* 1.—

* » » variétés : *Paragon*, *Prince Albert*, *Queen Victoria*, à 1.—

* » **Ribes** (L.) 1.—

* » **undulatum** (Lam.), alimentaire 1.—

Les Rhubarbes se cultivent dans un sol profond et riche en humus; les esp. décoratives (très propres à isoler dans les gazons) sont munies d'un *; Rh. offic. fournit la vraie var. de Rhub. des officines; les esp. et var. alimentaires (qu'on utilise aussi comme pl. de décoration) exigent, pour donner des pétioles bien fournis, un sol très gras, très profond, remué et beaucoup d'arrosage; soleil.

Rosmarinus officinalis (L.), *Romarin* 0.50

» » à fl. blanches 1.50



Rheum officinale.



Rudbeckia speciosa.



Rudbeckia hirta.

Rudbeckia californica (A. Gr.) . . .	fr. c. 0.50
» fulgida (Ait.), fl. jaune et noire . . .	0.50
» hirta (L.) . . .	0.50
» laciniata (L.) . . .	0.50
» » à fl. pleines . . .	0.50
» maxima (Nutt.) . . .	1.50
» moschata (Lodd.) . . .	1.50
» Newmanni (Hort.) . . .	0.50
» purpurea (L.), <i>Echinacea purp.</i> . . .	0.50
» » nana . . .	2.50
» speciosa (Wend.) . . .	0.50

Les Roubecques sont des Composées de toute beauté, très ornementales et excell. pour la fl. coupée, se maintenant très longtemps dans l'eau; ce sont de grandes marguerites aux ligules jaune plus ou moins vif, entourant un disque brun ou noir; chez *Purpurea* ces lig. sont d'un rouge vineux très beau, et chez *Maxima*, la plus brillante esp., ils sont jaune vif et très longs, retombant le long de la tige. *R. lacin.*, à fl. doubles, est l'une des meill. pl. viv., très élég., très brillante, s'élevant à plus de 2 m. et se couvrant de gros capitules en forme de roses d'un jaune orangé très vif et qui se conservent 15 jours au moins dans l'eau. Isolées dans les gazons, les Roubecques font un effet superbe; elles aiment le soleil et fleurissent de juin en automne.

Ruta graveolens (L.), *Rue* . . . 0.50

V. en outre pl. méditerranéennes.

Salpichroa rhomboideum (Mieess.) . . 1.—



Salvia argentea.

Salvia argentea (L.), feuilles argentées; fl. blanches . . .	0.50
» azurea (Lam.) . . .	1.—
» » <i>v. grandiflora</i> . . .	1.50
» ringens (S. Sm.), <i>Sauge grecque</i> . . .	1.—
» Sclarea (L.), <i>Sclarée</i> . . .	0.50

Ces Sauges sont des pl. aromatiques propres à planter au soleil; *S. azurea* a les fleurs d'un azur superbe (sept.-nov.) et fait grand effet; c'est une pl. de premier mérite.

Sanguinaria, **Sanguisorba**, **Santolina**, **Saponaria**, **Saxifraga**, **Scutellaria**, **Sedum**, **Sempervivum**, **Senecio**, **Serratula**, **Shortia**, **Sidalcea**, **Silene**, voir pl. alpines.



Salvia azurea.



Salvia Sclarea.



Silphium perfoliatum.

Silphium albiflorum (A. Gr.), très rare, à fl. blanches.	5.—
» doronicæfolium (Kunze)	1.50
» laciniatum (L.), <i>Herbe du pilote</i>	1.50
» perfoliatum (L.), <i>Plante au compas</i>	0.50
» terebinthaceum (L.)	1.50
» trifoliatum (L.), <i>S. ternatum</i>	1.50

Grandes Composées formant de fortes touffes, s'élevant parfois à plus de 2 m. et produisant, de juillet en octobre, des capitules jaunes (sauf chez albifl.); très propres à isoler dans gazons à cause de leurs formes architecturales.



Solidago canadensis.

Solidago arguta (Ait.)	0 50
» cæsia (L.), <i>S. flabellata</i>	0.50
» canadensis (L.), <i>Verge d'or</i>	0.50
» graminifolia (Elliot)	0.50
» humilis (Herb.)	0.50
» leiocarpa (D. C.)	0.50
» lithospermifolia (Willd.)	0.50
» odora (Ait.)	0.50
» puberula (Cham.)	0.50
» reflexa (Ait.)	0.50
» Riddellii (Franck.)	0.50
» rigida (L.)	0.50
» scopularia (Hort.)	0.50
» Shortii (Torr. Gr.)	0.50
» spectabilis (A. Gr.)	0.50
» virgaurea (L.)	0.50
» virginiana (Mill.), très tardif	0.50

Les Verges d'or sont de bonnes pl. décoratives, très solides; formant des touffes dressées, plus ou moins élevées, à plus ou moins grands et élégants capitules, de fl. innombrables, jaune vif, orangé ou pâle, très élégantes; juillet-octobre. Sol quelconque; soleil ou mi-ombre. Le *S. canadensis* s'est vulgarisé dans certaines contrées de l'Europe centrale (entr'autres dans les environs de Fribourg) et embellit considérablement le paysage auquel il donne une teinte or et orange, très chaude.

Spiræa aruncus (L.)	0.50
» astilboides , v. <i>Hotteya japonica</i>	
» gigantea (Hort.), <i>S. Kamtschatika</i> , var.	1.—

Spiræa lobata (Jacq.), <i>S. venusta</i> , rose vif	1.—
» palmata (Thunb.), rose-pâle	1.—
» » à fl. blanches.	1.—
» » v. <i>maxima</i>	1.50

Un sol frais et humide convient spéc. à ces belles Spirées qu'on a nommées avec raison les *Reines des prairies*.

Sachys affinis (Fras.), <i>Crosnes du Japon</i>	0.50
--	------



Statice incana.

Statice elata (Fisch.)	1.50
» Gmelini (Willd.)	1.—
» latifolia (Sm.)	1.—

Bonnes pl. aux innombrables fl. bleu et rose, qu'on sèche pour les bouquets d'hiver; sol profond; soleil. V. en outre pl. méditerranéennes.



Statice latifolia.

Symphitum, Tanacetum, Thalictrum,
v. pl. alpines.

Telekia, v. *Buphtalmum*.

Thermopsis fabacea (D. C.)	1.—
» montana (Nutt.)	1.—

Sortes de Lupins vivaces très beaux.

	fr. c.
Thladiantha dubia (Naud.), <i>Cucurbitacée</i>	
vivace et grimpante	1.50
Tradescantia brevicaulis (Rafin.)	1.50
» <i>virginica</i> (L.), <i>Ephémère</i>	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. pourpres	1.—
Curieuses fl. construites sur le plan de 3; pl. solides (juill.-sept.).	



Tradescantia virginica.

Tricyrtis hirta (Hook.)	0.50
» <i>macropoda</i> (Miq.)	0.50
» <i>pilosa</i> (Wall.)	1.50
Uniola latifolia , Midi	0.50



Uniola latifolia.

Verbascum Blattaria (L.)	0.50
» <i>Chaixii</i> (Vill.)	0.50
» <i>Gnaphalodes</i> (Bieb.)	0.50
» <i>Hinkei</i> (Friv.)	1.—
» <i>Lychnitis</i> (L.)	0.50

Verbascum montanum (Schrad.)	0.50
» <i>Olympicum</i> (Boiss.)	0.50
» <i>Phlomoides</i> (L.)	0.50
» <i>Phoeniceum</i> (L.), fl. violet sombre	0.50
» » var. à fl. blanches ou roses	0.50
» <i>simplex</i> (Labill.)	1.—
» <i>Thapsus</i> (L.), <i>Bonhomme</i> , <i>Bouillon blanc</i>	0.50
» » à fl. blanches	1.50
» Wiedemannianum (Fisch.)	0.50

Bonnes pl. propres à garnir les lieux arides; fl. sessiles, en épis dressés; V. Phœn. et ses var. recherchent la mi-ombre.



Verbascum Phoeniceum.

Verbesina virginica (L.)	1.50
---	------



Vernonia prœalta.

Vernonia angustifolia (Mich.)	1.50
» <i>Arkansana</i> (D. C.)	1.50
» » à fl. blanches	2.50

	fr. c.
Vernonia Baldwini (Torr.)	1.50
» Drummondoides (Hort.)	1.50
» eminens (Bisch.)	1.50
» fasciculata (Mich.)	1.50
» gigantea (Spreng.)	2.50
» glauca (Willd.)	1.50
» præalta (Mich.)	1.—

Ce sont de belles Composées à formes élevées,
fleurissant à l'automne.

Veronica, v. pl. alpines.



Vinca major.

Vinca major (L.), <i>Grande Pervenche</i> , la douzaine 2 francs	0.50
» » à f. panachées	0.50
» » à f. réticulées, veinées de jaune	0.50
» » à f. marginées de blanc	0.50
» minor (L.), <i>Petite Pervenche</i> , la douz. 2 francs	0.50
(A fl. blanches, bleues ou rouge-violet.)	
» minor , à fl. bleues doubles	0.50
» » à fl. rouges doubles	0.50

V. en outre pl. alpines.

Viola odorata, var. des IV saisons, *Sulfurea*, *The Czar*, *The Czar*, à fl. blanches, *Violette de Parme*, *Princesse de Galles*, *Queen Victoria*, *Princesse Béatrice*, à 50 centimes la plante.

V. en outre pl. alpines.

	fr. c.
Vittadenia triloba (D. C.)	0.50



Vinca minor.

Yucca filamentosa (L.)	0.50
» gloriosa (L.)	1.—
» Whipplei (Torr.)	2.50



Yucca filamentosa.

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX :

100 plantes vivaces diverses fr. 40.—	
50	20.—
25	10.—
12	5.—

Plantes bulbeuses rustiques.

Allium azureum (Led.), bleu clair	0.25
» Moly (L.), jaune vif	0.25
» neapolitanum (Cyr.), blanc	0.25
» Ostrowskianum (Rgl.), rose carmin	0.25
» roseum (L.)	0.25
» Schuberti (Zucch.)	1.—
» sphærocephalum (L.)	0.25

V. en outre pl. alpines.

Alstrœmeria chilensis (Lem.)	0.50
Amaryllis Belladonna (L.), <i>Belladone d'automne</i>	1.—
» longifolia (L.)	0.50
Anemone apennina (L.), <i>Sylvie bleue</i> , la douzaine 2 francs	0.25
» apennina , à fl. blanches	0.25
» blanda (Schott), bleu céleste	0.25

	fr. c.
Anemone coronaria (L.), <i>A. du Midi</i> , la douz. 2 francs	0.25
» » variété simple ou double, la douz. 2 francs	0.25
» » v. <i>de Caen</i> , à grandes fl., la douzaine 2 francs	0.25
» <i>fulgens</i> (Gay), écarlate brillant	0.25
» <i>palmata</i> (L.), jaune brillant	0.50
» <i>Robinsonniana</i> (Hort.)	2.50
» <i>stellata</i> (Lam.), <i>A. hortensis</i> , la douz. 2 francs	0.25
Anomatheca cruenta (Lindl.), rouge sang	0.25
Arisæma ringens (Schott), <i>A. præcox</i>	0.50
» <i>triphyllum</i> (Schott.)	1.50



Chionodoxa.

Camassia Cusickii (Hort.)	0.50
» <i>esculenta</i> (Lindl.), <i>Paradisie bleue</i>	0.25
» » v. <i>major</i>	0.75
» <i>Fraseri</i> (Torr.)	0.50
» <i>Leichtlini</i> (Wats.), <i>C. alba</i>	1.—



Camassia esculenta.

Chionodoxa Alleni (Hort.), la douz. 2 fr.	0.25
» <i>Forbesi</i> (Bak.)	0.50
» <i>gigantea</i> (Hort.), la douz. 2 francs.	0.25

	fr. c.
Chionodoxa Luciliæ (Boiss.), <i>Gloire des neiges</i> , la douz. 2 francs	0.25
» » à fl. blanc pur	1.50
» » v. <i>Boissieri</i> , très florifère	0.25
» <i>Sardensis</i> (Bak.), la douz. 2 francs.	0.25
» <i>Tmolusi</i> (Hort.), la douz. 2 francs	0.25



Colchicum variegatum.

Colchicum Agrippinum (Bak.), fl. en damier	0.50
» <i>autumnale</i> (L.), la douz. 2 francs	0.25
» » v. <i>major</i> , la douz. 5 francs	0.50
» » v. à fl. blanc pur, la douz. 2 fr.	0.25
» » v. à fl. doubles roses, la douz. 5 fr.	0.50
» » v. à fl. blanches doubles	2.50
» <i>Bivonæ</i> (Guiss.)	0.75
» <i>byzantinum</i> (Ker. Gawl.)	0.75
» <i>cilicicum</i> (Bak.)	1.—
» <i>crociflorum</i> (Sims).	0.75
» <i>luteum</i> (Bak.), fl. jaune vif; printemps	2.50
» <i>speciosum</i> (Stev.)	0.75
» <i>variegatum</i> (L.), rose et violet foncé	0.50
Commelina cœlestis (Willd.)	0.50



Crocus sativus.

* Crocus albiflorus (Kit.), la douz. 5 fr.	0.50
» <i>alatavicus</i> (Rgl.), la douz. 5 fr.	0.25
*» <i>ancyrensis</i> (Maw.), la douz. 2 fr.	0.25
» <i>asturicus</i> (Herb.), la douz. 5 fr.	0.50
*» <i>aureus</i> (S. S.), la douz. 2 fr.	0.25

	fr. c.
* Crocus biflorus (Mill.), la douz. 2 fr.	0.25
* » candidus (Clarke), la douz. 5 fr.	0.50
» cilicicus (Kotschy), la douz. 5 fr.	0.50
* » etruscus (Parl.), la douz. 2 fr.	0.25
» hadriaticus (Herb.), la douz. 6 fr.	0.75
* » Imperati (Ten.), très beau, la dz. 2 fr.	0.25
» iridiflorus (Henf.), la douz. 2 fr.	0.25
* » Korolkowi (Rgl.), la douz. 5 fr.	0.50
» longiflorus (Rafin.), la douz. 2 fr.	0.25
» pulchellus (Herb.), la douz. 2 fr.	0.25
» sativus (L.), <i>Safran</i> , la douz. 2 fr.	0.25
* » Sieberi (Gay), la douz. 2 fr.	0.25
» speciosus (Bieb.), la douz. 2 fr.	0.25
* » Tommasinianus (Herb.), la douz. 2 fr.	0.25
» zonatus (Gay), la douz. 2 fr.	0.25

Les espèces marquées d'un * sont vernales; les autres fleurissent à l'automne.

Cyclamen, v. pl. alpines.

Eremurus altaicus (Stev.), jeunes pieds	2.50
» Bungei (Bak.), jeunes pieds	2.50
» himalaicus (Bak.)	5.—
» robustus (Rgl.), jeunes pieds	2.50
» tauricus (Stev.), »	2.50



Erythronium dens Canis.

Erythronium albidum (Nutt.)	1:—
» americanum (Gawl.)	0.50
» citrinum (Hort.), rare et nouv.	1.—
» dens Canis (L.), <i>Dent de chien</i> , la douz. 2 fr.	0.25
» » v. <i>majus</i>	0.50
» » v. à fl. blanches, la douz. 2 fr.	0.25
» » v. <i>purpureum</i> , la douz. 2 fr.	0.25
» giganteum (Lindl.), la douz. 5 fr.	0.50
» grandiflorum (Pursh), la douz. 5 fr.	0.50
» Hartwegi (Wats.), la douz. 5 fr.	0.50
» Hendersonni (Hort.), la douz. 5 fr.	0.50
» Howelli (Hort.), la douz. 5 fr.	0.50
» Johnsoni (Hort.), la douz. 6 fr.	0.75
» Nuttallianum (Schult.), fl. jaune d'or.	2.50
» revolutum (Smith), la douz. 5 fr.	0.50
» sibiricum (Rgl.)	0.50
» Watsoni (Hort.)	9.75

	fr. c.
Fritillaria acmopetala (Boiss.)	0.50
» armena (Boiss.), rouge et jaune	0.50
» » v. <i>fusco-lutea</i> , jaune d'or	0.50
» Askhabadensis (Van Tub.), nouvelle.	2.50
» aurea (Schott), superbe; la douz. 5 fr.	0.50
» biflora (Lindl.)	1.—
» citrina (Bak.), jaune citron	0.50
» coccinea (Hort.), rouge orangé	1.—
» Imperialis (L.), <i>Couronne impériale</i>	0.50
» Karelini (Bak.), blanc rosé	2.50
» lanceolata (Pursh.), brune et verte	1.—
» latifolia (Willd.)	0.50
» Meleagris (L.), <i>Fritillaire pintade</i> ; tulipe damier; la douz. 2 fr.	0.25
» » à fl. blanches, la douz. 2 fr.	0.25
» Moggridgei (Boiss.), jaune d'or	1.50
» Oranensis (Bak.), brun et vert	1.—
» pallidiflora (Schränk), jaune pâle	2.50
» persica (L.), brun noir	0.75
» pudica (Sprgl.), jaune d'or, odorant	0.75
» pyrenaica (L.), brun foncé	0.50
» recurva (Benth.), écarlate	0.75
» Thunbergi (Miq.), blanc	0.50
» Whittalli (Hort.), verdâtre et brun	0.50



Fritillaria Meleagris.



Fritillaria Imperialis.

	fr. c.
Galanthus byzantinus (Hort.), la douz. 2 fr.	0.25
» caucasicus (Bak.), la douz. 2 fr.	0.25
» cilicicus (Hort.), très hâtif	0.50
» Elwesii (Hook.), très grandes fl.; la douz. 2 fr.	0.25
» Fosteri (Bak.), la douz. 2 fr.	0.25
» Ikarina (Bak.), la douz. 2 fr.	0.25
» Imperati (Bert.), la douz. 2 fr.	0.25
» latifolius (Salisb.), la douz. 2 fr.	0.25
» nivalis (L.), <i>Perceneige vrai</i> , la douz. 2 fr.	0.25
» » à fl. doubles, la douz. 2 fr.	0.25
» plicatus (Bieb.), <i>Perceneige du Caucase</i>	0.50
» robustus (Hort.), très gr. fl., la douz. 2 fr.	0.25



Galanthus nivalis.

Galtonia candicans (Desne.), *Lis du Cap* 0.50



Galtonia candicans.

	fr. c.
Gladiolus alatus (L.), rouge	0.50
» atroviolaceus (Boiss.), bleu-violet	0.50
» brenchleyensis (Hort.), rouge feu	0.50
» byzantinus (Mill.), rouge-violacé, la douz. 2 fr.	0.25
» Colvillei (Sweet), carmin et violet, la douz. 2 fr.	0.25
» communis (L.)	0.50
» crispiflorus (Herb.)	0.50
» dracocephalus (Hook.)	0.25
» grandis (Thunb.), blanc-crème	0.25
» Leichtlini (Hort.), carmin et jaune	2.50
» palustris (Gaud.), carmin vif	0.50
» Saundersi (Hook.), écarlate	1.50
» segetum (Ker.-Gawl), carmin vif	0.50
» sulfureus (Jacq.), jaune pâle	1.—
» tristis (L.)	1.—
» vinulus (Klatt), blanc, maculé-violet	0.50
» Watsonius (Thunb.), rouge et blanc	1.—



Iris reticulata.

Hyacinthus amethystinus (L.), la douz. 2 fr.	0.25
» » à fl. blanches, la douz. 2 fr.	0.25
» romanus (L.)	0.50

Iris.

SECT. I. ESPÈCES BULBEUSES :

Iris alata (Poir.), la douz. 2 fr.	0.25
» anglica (Hort.), la douz. 2 fr.	0.25
» Bakeriana (Fost.)	1.50
» Boissieri (Henriq.)	1.50
» caucasica (Hoffm.)	0.75
» Danfordiæ (Boiss.)	0.75
» Hispanica (Hort.), la douz. 2 fr.	0.25
» Histrio (Reich.), la douz. 5 fr.	0.50
» histrioides (Foster)	0.50
» junceæ (Poir.), la douz. 2 fr.	0.25
» lusitanica (Ker.-Gawl), la douz. 5 fr.	0.50
» orchiodes (Carr.), sup. esp. très précocæ, à fl. jaune vif	2.50

	fr. c.
<i>Iris palestina</i> (Boiss.), la douz. 5 fr.	0.50
» <i>pavonia</i> (L.), la douz. 2 fr.	0.25
» <i>persica</i> (L.), la douz. 5 fr.	0.50
» <i>reticulata</i> (Bieb.), la douz. 6 fr.	0.75
» <i>sindjarensis</i> (Boiss.), la douz. 5 fr.	0.50
» <i>sisyrinchium</i> (L.), la douz. 2 fr.	0.25
» <i>tingitana</i> (Boiss.), la douz. 5 fr.	0.50
» <i>tuberosa</i> (L.), la douz. 2 fr.	0.25
» <i>Vartani</i> (Foster), la douz. 2 fr.	0.25
» <i>Warleyensis</i> (Hort.)	1.—

SECT. II. IRIS DES GROUPES ONCOCYCLUS ET REGELIA :

<i>Iris atrofusca</i> (Baker)	1.50
» <i>atropurpurea</i> (Baker)	0.50
» <i>Barnumæ</i> (Foster)	1.—
» <i>Bismarkiana</i> (Hort.)	0.50
» <i>Eggeri</i> (Hort.)	1.—
» <i>Gatesi</i> (Foster)	2.50
» <i>iberica</i> (Hoffm.)	0.50
» <i>Korolkowi</i> (Rgl.)	1.—
» <i>Helenæ</i> (Baker), <i>I. Mariæ</i>	0.50
» <i>Leichtlini</i> (Rgl.)	2.50
» <i>Lorteti</i> (Barbey)	1.50
» <i>lupina</i> (Foster)	0.50
» <i>Menissadjiani</i> (Hort.)	0.50
» <i>nigricans</i> (Hort.)	1.—
» <i>paradoxa</i> (Stev.), v. <i>Choschab</i>	1.50
» <i>Suziana</i> (L.), <i>Iris deuil ou de Suze</i>	0.50
» <i>Suwarowi</i> (Rgl.)	1.—
» <i>urmiensis</i> (Hort.)	1.50
» <i>Vaga</i> (Foster)	0.75



Gladiolus communis.

<i>Ixiolirion Pallasii</i> (Fisch. et Mey.)	0.50
<i>Leontice Alberti</i> (Rgl.)	1.—
» <i>Leontopetalum</i> (L.)	2.50
<i>Leucojum æstivum</i> (L.), la douz. 2 fr.	0.25
» <i>autumnale</i> (L.), <i>niwéole d'automne</i>	0.25
» <i>pulchellum</i> (Salisb.)	0.25
» <i>vernum</i> (L.), <i>Niwéole</i> , la douz. 2 fr.	0.25
» » v. <i>carpathicum</i> (Steud.), la douz. 2 fr.	0.25



Leucojum vernum.



Lilium croceum.



Lilium Martagon.

Lilium.

fr. c.

SECT. I. ESPÈCES MONTAGNARDES (à fl. en turban):

<i>Lilium canadense</i> (L.)	1.—
» <i>carniolicum</i> (Bernh.), fl. écarlate	1.—
» <i>chalcedonicum</i> (L.), écarlate vif	2.50
» <i>columbianum</i> (Hort.)	1.50

	fr. c.
Lilium dalmaticum (Vis.), <i>Martagon violet foncé</i>	2.50
» Grayi (Wats.), rouge brique, maculé pourpre	2.50
» Humboldti (Regl.), orangé vif	2.50
» Leichtlini (Hook), jaune, maculé brun	2.50
» Martagon (L.), la douz. 5 fr.	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» monadelphum (Bieb.), <i>L. Szowitzianum</i>	1.50
» pardalinum (Kell.), or et écarlate	0.50
» parvum (Kell.)	2.50
» pomponium (L.), écarlate	2.50
» pyrenaicum (Gouan), <i>Martagon jaune</i>	1.—
» superbum (L.)	1.—
» tenuifolium (Fisch.), vermillon	1.50
» testaceum (Lindl.), <i>L. excelsum</i>	2.50

SECT. II. ESPÈCES DES RÉGIONS FROIDES
ET TEMPÉRÉES :

Lilium auratum (L.), très gros bulbes	2.50
» Batemanniae (Hort.)	1.—
» bulbiferum (L.)	1.—
» candidum (L.), <i>Lis blanc des jardins</i>	0.50
» croceum (Chaix), <i>Lis du Simplon</i>	0.50
» longiflorum (Thunb.)	1.—
» philadelphicum (L.)	1.—
» rubellum (Baker)	2.50
» speciosum (Thunb.), <i>L. lancifolium</i>	1.—
» » à fl. rouge vif	1.—
» » à fl. blanches	1.—
» Thunbergianum (Lindl.)	1.—
» tigrinum (Ker.-Gawl)	0.50
» » v. <i>splendens</i>	0.50
» umbellatum (Baker)	1.—
» Washingtonianum (Dombrain)	2.50



Lilium pyrenaicum.

Merendera Caucasica (Bieb.)	0.75
» sobolifera (Fisch.)	0.50
Muscari Argeai (Hort.), <i>M. atlanticum</i>	0.25
» azureum (Fenzl.)	0.25
» botryoides (Mill.), la douz. 2 francs	0.25
» » à fl. blanc pur	0.25
» comosum (Mill.)	0.25

	fr. c.
Muscari Heldreichi (Boiss.)	0.50
» latifolium (Kirk), très beau et rare	1.—
» moschatum (Willd.), au parfum de <i>Narcisse</i>	1.—
» racemosum (Mill.), la douz. 2 francs	0.25



Muscari botryoides.

Narcissus albicans (Spreng.), très beau	0.25
» biflorus (Curt.), la douz. 2 francs	0.25
» Bulbocodium (L.)	0.50
» cernuus alpinus (Salisb.)	1.—
» Clusii (Dun.)	0.50
» cyclamineus (D. C.)	0.50
» incomparabilis (Mill.)	0.25
» Jonquilla (L.)	0.25
» juncifolius (Reg.), <i>Jonquille miniature</i>	0.50
» major (Curt.)	0.50
» maximus (Don)	0.50
» minimus (Kunth)	0.50
» moschatus (L.)	0.50
» obvallaris (Salisb.)	0.50
» odorus (L.)	0.50
» poeticus (L.), la douz. 2 francs	0.25
» » à très grandes fleurs, la douz. 5 fr.	0.50
» » ornatus , hâtif, la douz. 2 francs	0.25
» » plenus , à fl. de <i>Gardenia</i> , la douz. 2 francs	0.25
» polyanthos (Lois)	0.50
» pseudo Narcissus (L.), la douz. 2 fr.	0.25
» » à fl. pleines	0.50
» triandrus (L.), <i>Larmes des Anges</i> , la douz. 2 francs	0.25
» Verbanensis (Herb.)	1.—
Ornithogalum aureum (Curt.)	0.50
» Balansæ (Boiss.)	0.50
» nanum (S. S.)	0.50
» narbonense (L.)	0.50
» nutans (L.)	0.50
» pater familias (Gort.)	0.50
» pyramidale (L.)	0.75
» pyrenaicum (L.)	0.50

	fr. c.
Ornithogalum thyrsoides (Jacq.)	0.75
» umbellatum (L.), <i>Dame d'onze heures</i> , la douz. 2 francs	0.25
Pancratium Illyricum (L.)	2.50
» maritimum (L.)	1.—
Puschkinia scilloides (Adam.), la douz. 2 francs	0.25
Romulea ramiflora (Ten.)	0.50
» rosea (Eckl.)	0.50
Sanguinaria canadensis (L.), <i>Sanguinaire</i>	0.50
Schizostylis coccinea (Harw.)	0.50



Scilla amoena.



Scilla nutans.

Scilla amoena (L.), la douz. 5 francs	0.50
» autumnalis (L.)	0.50
» bifolia (L.), <i>Scille bleu</i> , la douz. 2 fr.	0.25
» » à fl. blanches	1.—

	fr. c.
Scilla bifolia à fl. roses	0.50
» » v. <i>taurica</i> , fl. bleu sombre	1.—
» campanulata (Ait.), la douz. 2 fr.	0.25
» » blanc pur, la douz. 2 francs	0.25
» » v. <i>excelsior</i> , la douz. 2 francs	0.25
» » v. <i>rosea maxima</i> , la douz. 2 francs	0.25
» hyacinthoides (L.), la douz. 5 francs	0.50
» italica (L.), la douz. 5 francs	0.50
» japonica (Baker)	0.50
» Lilio-Hyacinthus (L.)	0.50
» nutans (L.), <i>Jacynthe des bois</i> , la douz. 2 francs	0.25
» » à fl. blanc pur, la douz. 2 francs	0.25
» » à fl. carnées, la douz. 2 francs	0.25
» » v. <i>rosea grandiflora</i> , la douz. 5 fr.	0.50
» » rubra , à fl. rose foncé, la douz. 5 fr.	0.50
» sibirica (Anch.), la douz. 2 francs	0.25
» » à fl. bleu pur, la douz. 2 francs	0.25



Scilla sibirica.

Sisyrinchium anceps (Cav.), la douz. 2 fr.	0.25
» Bermudiana (L.), la douz. 2 francs	0.25
» grandiflorum (Dougl.)	0.75
» striatum (Sm.)	0.50



Sisyrinchium Bermudiana.

Sternbergia Fischeriana (Rupr.)	0.75
» lutea (Ker.-Gawl.), la douz. 2 francs	0.25
» » v. <i>macrantha</i>	0.75

	fr. c.
Trillium erectum (L.)	1.—
» grandiflorum (Salisb.)	0.50
» sessile (L.)	1.—
» » v. <i>Californicum</i> (Kell.)	1.50
Triteleya uniflora (Lindl.), la douz. 2 fr.	0 25



Triteleya uniflora.

Tropæolum pentaphyllum (Lam.), <i>Capucine vivace</i>	2.50
» polyphyllum (Cav.)	1.—
» tuberosum (Ruiz. et Pav.)	0.50



Tulipa Billietiana.

Tulipa acuminata (Vahl.), <i>T. cornuta</i>	0.25
» armena (Boiss.)	0.25
» australis (Link.), <i>T. Celsiana</i>	0.50
» aximensis (Marjolet)	1.50
» biflora (Pall.)	0.50
» Billietiana (Perr.)	0.50
» Clusiana (Dl.), rouge et blanc, la douz. 5 fr.	0.50

Tulipa Didieri (Jord.), la douz. 2 francs	0.25
» » à fl. blanches, la douz. 2 francs	0.25
» » à fl. jaunâtres, la douz. 2 francs	0.25
» elegans (Baker), la douz. 5 francs	0.50
» fulgens (Baker), la douz. 2 francs	0.25
» Gessneriana (L.), la douz. 2 francs	0.25
» » v. <i>aurantiaca</i> , la douz. 2 francs	0.25
» Greigii (Rgl.), la douz. 5 francs	0.50

La plus brillante et la plus belle de toutes.

» Kaufmanniana (Rgl.), superb. et nouv.	2.50
» Kolpakowskiana (Rgl.)	0.50
» macrospila (Hort.)	0.25
» Mauriana (Jord.), la plus brillante des Tulipes d'Europe	1 —
» Marjoletti (Perr.)	2.50
» oculus solis (D. C.), la douz. 2 fr.	0.25
» Ostrowskyana (Rgl.), la douz. 2 fr.	0.25

Orig. du Turkestan; c'est l'une des plus brillantes.

» persica (Clus.), très tardive, la dz. 2 fr.	0.25
» planifolia (Jord.),	1.—
» præcox (Ten.) la douz. 2 fr.	0.25
» pulchella (Fenzl.), la douz. 5 fr.	0.50
» retroflexa (Baker), la douz. 2 fr.	0.25
» Segusiana (Perr.)	2.50
» spatulata (Bert.), la douz. 2 fr.	0.25
» Sprengeri (Hort.), la douz. 5 fr.	0.50
» sylvestris (L.), <i>Tulipe de Neydans</i> , la douz. 2 fr.	0.25
» triphylla (Rgl.)	1.50
» undulatifolia (Boiss.)	1.50
» viridiflora (Hort.), la douz. 2 fr.	0.25
» vitellina (Hort.)	1.50



Tulipa Greigii.

Tulipes des jardins : Tulipes Perroquet ou Drageonnes, la douz. 1 fr., la pièce 0.10
Superbes, aux formes et teintes des plus artistiques et très solides.



Tulipe Perroquet (T. Draconia).



Tulipa sylvestris.

Tulipes de Darwin, la douz. 1 fr. 50, la
pièce

Très belle race, à flor. tardive, à hampe élevée
et à fl. unicolores.

fr. c.

0.15



Tulipes flamandes.

fr. c.

Tulipes flamandes, avec fl. striées et li-
ganées, la douz. 2 fr., la pièce . . . 0.25

Zephyranthes Atamasko (Herb.), *Ama-
ryllis de Virginie* 0.75

» **candida** (Herb.), *Amaryllis blanche* . . 0.25

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX

100 bulbes en 100 espèces	25.—
100 » 50 »	20.—
50 » 50 »	12.50
50 » 25 »	10.—
25 » 25 »	5.—
25 » 12 »	4.—

Il suffit, pour recevoir des collections convenant
aux conditions d'existence dans lesquelles
elles doivent être placées, de nous indiquer la
nature du sol et quelques données météorolo-
giques.

Orchidées rustiques.

Nous adoptons dans cette liste la nomenclature de Pfitzer suivie dans le volume « Orchidées rustiques et leur culture, par H. Correvon; ce livre, qui traite de toutes les Orchidées pouvant résister dehors sur notre climat, est en vente au Jardin alpin au prix de 4 fr. Il est illustré de 40 figures et contient la description et le mode de culture de toutes les espèces terrestres rustiques. Cet ouvrage a eu un certain succès dans le monde horticole.

L'*Album des Orchidées de l'Europe centrale et septentrionale* est un recueil de 60 planches coloriées (parfaitement dessinées et reproduites), très artistiquement rendues par le célèbre dessinateur-botaniste Walther Müller, et contenant en outre 60 pages de texte (description des espèces représentées, détails sur la fécondation si curieuse des Orchidées par les insectes, etc., etc., par M. H. Correvon. Il est en vente au Jardin alpin pour le prix de 20 fr. (port en sus).

	fr. c.
Aceras anthropophora (R. Br.), <i>Orchis</i> <i>Homme pendu</i>	1.—
Anacamptis pyramidalis (Rich.), <i>Orchis</i> <i>pyramidal</i>	1.—
Aplectrum hyemale (Nutt.), <i>Adam et Eve</i>	1.50


	fr. c.
Arethusa bulbosa (L.), <i>Orchis Aréthuse</i>	1.50
Bletilla hyacinthina (Reich.), <i>Jacynthe</i> <i>du Japon</i>	1.50
Calopogon pulchellus (R. Br.), <i>Orchis Ca- lopogon</i>	1.—

fr. c.



Calypso borealis.

Calypso borealis (Salisb.), *Sabot de Vénus arctique* 1.50
Cœloglossum viride (Hart.), *Orchis grenouille* 1.50



Cypripedium Calceolus.

Cypripedium acaule (Ait.), *Cypripède sans tige* 1.50
 » **arietinum** (R. Br.), *Cyprip. des béliers* 1.50
Cypripedium Calceolus (L.), *Sabot de Vénus*, les douze 10 fr., la pièce 1.—
 » **candidum** (Mühl.), *Cypripède blanc* 1.50
 » **fasciculatum** (Kell.), nouveau, de Californie 3.—
 » **montanum** (Don.), *Cyp. de montagnes* 1.50
 » **parviflorum** (Salisb.), *Cyp. à petites fl.* 1.50
 » **pubescens** (Willd.), *Sabot de Vénus américain* 1.50
 » **spectabile** (Sw.), *Cypripède superbe* 2.50

Epipactis atrorubens (Schult.), *Epipactis pourpre* 1.—
 » **gigantea** (Dougl.), *E. géant* 2.50
 » **palustris** (Sw.), *E. des marais* 1.—
Goodiera Menziesi (Lindl.), *Godière américaine* 2.50
 » **pubescens** (R. Br.), *Godière pubescente* 2.50
 » **repens** (R. Br.), *Godière rampante* 2.50
Gymnadenia albida (R. Br.), *Orchis miel* 1.50
 » **conopea** (R. Br.), *Orchis parfumé* 1.—
 » **odoratissima** (Rich.), *Orchis suave* 1.—
Habenaria, v. *Platanthera*.
Herminium Monorchis (R. Br.) 2.50
Himantoglossum hircinum (Sprgl.), *Orchis bouc* 2.50

Liparis Lœselii (Rich.), *Liparide des tourbières* 2.50
 » **liliifolia** (Rich.), *Liparide américaine* 2.50
Listera cordata (R. Br.), *Listère cordée* 2.50

Listera ovata (R. Br.), *Listère à f. ovales* 1.—
Nigritella angustifolia (Rich.), *Orchis vanillé* 1.—
Ophrys apifera (Huds.), *Ophrys abeille* 1.—
 » **arachnites** (Murr.), *O. frêlon* 1.—
 » **aranifera** (Huds.), *O. araignée* 1.—
 » **atrata** (Reich.), *O. foncé* 2.50
 » **Bombilifera** (Bert.), *O. Bombyx* 1.—
 » **lutea** (Cav.), *O. jaune* 1.—
 » **muscifera** (Huds.), *O. mouche* 1.—
 » **Scolopax** (Cav.), *O. bécasse* 2.50
 » **speculum** (Link.), *O. miroir* 1.—
 » **tenthredinifera** (Reich.), *O. Porte-scie* 1.—
Orchis Branciforti (Biv.), *Orchis de Brancifort* 1.—
 » **fusca** (Jacq.), *O. brun* 1.—
 » **galeata** (Lam.), *O. casque* 1.50
 » **globosa** (L.), *O. globuleux* 1.50
 » **incarnata** (L.), *O. incarnat* 1.—
 » **latifolia** (L.), *O. à f. larges* 1.—
 » **laxiflora** (Lam.), *O. à fleurs lâches* 2.50
 » **longicornu** (Poir.), *O. à long éperon* 1.—
 » **maculata** (L.), *O. maculé* 1.—
 » à fl. blanches 2.50
 » **mascula** (L.), *O. mâle* 1.—
 » **militaris** (L.), *O. militaire* 1.—
 » **morio** (L.), *O. bouffon* 1.—
 » à fl. blanches 2.50
 » à fl. roses 2.50

	fr. c.
Orchis morio à fl. violet-noir	2.50
» » à fl. lilas pâle	2.50
» » v. <i>picta</i>	2.50
» <i>pallens</i> (L.), <i>O. soufre</i>	1.—
» <i>palustris</i> (Jacq.), <i>O. des marais</i>	1.50
» <i>papilionacea</i> (L.), <i>O. papillon</i>	1.—
» <i>provincialis</i> (Balb.), <i>O. de Provence</i>	1.—
» <i>Robertiana</i> (Lois.), <i>O. de Robert</i>	1.—
» <i>sambucina</i> (L.), <i>O. sureau</i>	1.—
» » à fl. rouges	1.—
» <i>Simia</i> (Lam.), <i>O. singe</i>	1.—
» <i>tridentata</i> (Scop.), <i>O. dentelé</i>	1.50
» <i>undulatifolia</i> (Biv.), <i>O. à f. ondulées</i>	1.—
» <i>ustulata</i> (L.), <i>O. brûlé</i>	1.50
Platanthera bifolia (Rich.), <i>Orchis à deux</i> <i>feuilles</i>	1.—
» <i>Chlorantha</i> (Cust.), <i>Orchis verdâtre</i>	1.—
» <i>ciliaris</i> (R. Br.), <i>Habénaire ciliée</i>	1.50
» <i>dilatata</i> (A. Gr.), <i>H. dilatée</i>	1.50
» <i>fimbriata</i> (Lindl.), <i>H. laciniée</i>	1.50

	fr. c.
Serapias cordigera (L.), <i>Sérapie cordée</i>	1.50
» <i>lingua</i> (L.), <i>S. à langue</i>	1.—
Spiranthes æstivalis (L.), <i>Spiranthe</i>	2.50
Tipularia discolor (Nutt.), <i>Crane-fly</i>	1.50

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX :

Nous faisons des collections d'Orchidées rustiques, composées d'après les conditions de culture qui nous sont indiquées et de telle façon qu'elles réussissent dans de telles conditions, aux prix de :

50 Orchidées de plein air, en 50 espèces				fr. 50.—
50	idem	en 25 espèces	»	35.—
25	idem	en 25	»	20.—
25	idem	en 10	»	12.—
12	idem	en 12	»	10.—
12	idem	en 6	»	5.—

Fougères rustiques.

Pour la description et le mode de culture des Fougères de plein air, voir le vol. *Les Fougères rustiques*, par H. Correvon, ouvrage illustré, couronné par plusieurs jurys; prix : 5 francs. En vente au Jardin alpin. Nous suivons ici encore la nomenclature de Hooker.

Les Fougères dont les noms sont précédés d'un * sont celles dont la verdure persiste l'hiver, c'est-à-dire qui sont *sempervirentes*.

	fr. c.
Adiantum capillus veneris (L.), <i>Cheveux</i> <i>de Vénus</i>	1.—
» <i>pedatum</i> (L.), <i>Capillaire du Canada</i>	1.50

Cette dernière espèce est la plus gracieuse et la plus élégante des Fougères rustiques.



Adiantum pedatum.

Allosorus , v. <i>Cryptogramme</i>	
* Aspidium acrostichioides (Sw.)	2.50
* » <i>aculeatum</i> (Sw.)	1.—
* » v. <i>Braunii</i> (Spenn.)	2.50
* » <i>angulare</i> (Willd.)	2.50
* » <i>lineare</i>	2.50
* » <i>plumosum</i>	5.—
* » <i>proliferum</i> , l'un des plus gracieux	2.50
* » <i>setosum</i>	2.50


	fr. c.
* Aspidium lobatum (Sw.), beau et très solide	1.—
* » <i>Lonchitis</i> (Sw.), <i>Holyfern</i>	1.—
* » <i>munitum</i> (Kaulf.)	5.—
* Asplenium adiantum-nigrum (L.), <i>Fou-</i> <i>gère de Nice</i>	1.—
* » <i>adulterinum</i> (Milde)	2.50
» <i>angustifolium</i> (Mich.)	2.50
* » <i>Ceterach</i> (L.), <i>Ceterach officinarum</i>	1.—
» <i>crenatum</i> (Rupr.)	2.50
* » <i>ebeneum</i> (Ait.)	2.50
» <i>Filix-fœmina</i> (Bernh.), <i>Athyrium</i> f. f. <i>Foug. femelle</i>	1.—

Nous offrons les var. suivantes du f. f. au prix de 2 fr. 50 : *cristatum*, *Edwardsii*, *Elworthii*, *Frizelliae*, *Howardai* et les *plumosum* et *Victoriæ* au prix de 5 fr.

Asplenium Goringianum pictum (Mett.)	2.50
» <i>lanceolatum</i> (Huds.)	2.50
» <i>Rhæticum</i> (Roth.)	2.50
* » <i>ruta muraria</i> (L.), <i>Rue des murs</i>	0.50
* » » v. <i>elatum</i>	2.50
* » » v. <i>incisum</i>	2.50
* » <i>septentrionale</i> (Hoffm.)	1.—
* » <i>trychomanes</i> (L.), <i>Faux Capillaire</i>	0.50
* » v. <i>incisum</i>	2.50
* » v. <i>bipinnatum</i> (Druery)	5.—
* » <i>virescens</i> (Hort.)	5.—
* » <i>viride</i> (Huds.)	1.—
* » v. <i>digitatum</i>	2.50



Aspidium Lonchitis.



Asplenium Filix-femina.



Aspidium angulare.

	fr. c.
<i>Athyrium</i> , v. <i>Asplenium</i> f. f.	
<i>Blechnum</i> , v. <i>Lomaria</i> .	
<i>Botrychium Lunaria</i> (Sw.), <i>Lunaire</i> . . .	1.50
<i>Ceterach</i> , v. <i>Asplenium</i> .	
<i>Cheilanthes lanuginosa</i> (Nutt.) . . .	5.—
» <i>fragrans</i> (Webb.), <i>Ch. odora</i> . . .	2.50
» <i>vestita</i> (Sw.) . . .	5.—
<i>Cryptogramme crispa</i> (R. Br.), <i>Allosorus</i> <i>crispus</i> . (<i>Parsley fern</i> des Anglais)	2.50
* <i>Cyrtomium caryotideum</i> (Walt.), <i>Aspi-</i> <i>dium cariotideum</i> . . .	2.50
*» <i>falcatum</i> (Sw.), <i>A. falcatum</i> . . .	1.50
*» <i>Fortunei</i> (Smith.), <i>A. Fortunei</i> . . .	1.50
Sup. Foug. du Japon, à belle verdure très orne- mentale; il leur faut une position abritée chez nous; très belles dans les appartements.	
<i>Cystopteris alpina</i> (Desv.) . . .	1.50
» <i>bulbifera</i> (Bernh.), <i>Fougère bulbifère</i>	1.—
» <i>fragilis</i> (Bernh.), l'une des plus gracieu ^{ses}	0.50
» » v. <i>sempervirens</i> (Moore) . . .	2.50
» <i>montana</i> (Bernh.) . . .	2.50
» <i>sudetica</i> (A. Br.) . . .	2.50
<i>Hypolepis millefolia</i> . . .	2.50
<i>Lastrea</i> , v. <i>Nephrodium</i> .	
* <i>Lomaria alpina</i> (Spr.) . . .	2.50
*» <i>magellanica</i> (Desv.) . . .	5.—
*» <i>Spicant</i> (Desv.), craint la chaux. . .	1.—
<i>Nephrodium cristatum</i> (Mich.) . . .	2.50
» <i>æmulum</i> (Brack.) . . .	2.50
» v. <i>Clintonianum</i> (A. Gr.) . . .	5.—
» <i>decursive-pinnatum</i> (Baker) . . .	2.50
» <i>dilatatum</i> (Desv.) . . .	1.—
» <i>filixmas</i> (Rich.), <i>Fougère mâle</i> . . .	0.50
Les variétés suivantes sont à 2 fr. 50 la pièce :	
Bollandiæ, grandiceps et Pinderi.	
» <i>Goldianum</i> (Hook.) . . .	5.—
» <i>marginale</i> (Michx.) . . .	2.50
» <i>montanum</i> (Baker), <i>Oreopteris</i> . . .	2.50
» <i>opacum</i> (Hort.) . . .	2.50
» <i>rigidum</i> (Dew.), <i>Aspid. rigidum</i> . . .	2.50
Très belle esp. pouvant résister au grand soleil; calcaire.	
» <i>spinulosum</i> (Desv.) . . .	1.—
» » <i>genuinum</i> . . .	2.50
» <i>thelypteris</i> (Desv.) . . .	1.—
* <i>Nothochleana Marantæ</i> (R. Br.) . . .	2.50
Exige une couverture chez nous.	



Onoclea germanica.

	fr. c.
<i>Onoclea germanica</i> (Hook.), <i>Struthiopte-</i> <i>ris germ.</i> . . .	1.—
» <i>orientalis</i> (Hook.), <i>Strut. pennsylva-</i> <i>nica</i> . . .	2.50
» <i>sensibilis</i> (L.) . . .	1.50
Esp. traçantes, très propres à garnir rapidement les lieux ombragés.	
<i>Ophioglossum vulgatum</i> (L.) . . .	2.50



Osmunda regalis.

<i>Osmunda cinnamomea</i> (L.) . . .	3.—
» <i>Claytoniana</i> (L.), <i>O. interrupta</i> . . .	3.—
» <i>gracilis</i> (Link.) . . .	2.50
» <i>japonica</i> (Hort.) . . .	3.—
» <i>regalis</i> (L.), <i>Fougère royale</i> ; <i>F. fleurie</i>	1.50
<i>Polypodium alpestre</i> (Hoppe) . . .	2.50
» <i>Dryopteris</i> (L.), <i>Oak fern</i> . . .	1.—
» <i>hexagonopterum</i> (Mich.) . . .	1.50
» <i>Phegopteris</i> (L.), <i>Beechfern</i> . . .	1.50
» <i>Robertianum</i> (Hoffm.), <i>P. calcareum</i> . . .	1.—
*» <i>vulgare</i> (L.), <i>Fougerolle</i> , <i>Régliasse des</i> <i>bois</i> . . .	0.50
La plus solide d'entre les Fougères.	
» » v. <i>cambricum</i> (Willd.) . . .	2.50
» » v. <i>cristatum</i> . . .	2.50
<i>Polystichum</i> , v. <i>Aspidium</i> .	
<i>Pteris aquilina</i> (L.), <i>Fougère impériale</i> . . .	1.50
*» <i>cretica</i> (L.) . . .	1.50



Scolopendrium undulatum.

* <i>Scolopendrium vulgare</i> (Sm.), <i>Langue</i> <i>de cerf</i> , la douz. 5 fr.	0.50
--	------

fr. c.

fr. c.

Nous livrons aux prix de 2 fr. 50 à 5 fr. les variétés suivantes du *Scolopendium vulgare*, qui sont la plupart de superbes formes de Fougères: angustifolium, capitatum, conglomeratum, cornutum, cristatum, densum, digitatum, marginatum, ramosissimum, undulatum.

Woodsia glabella (R. Br.)	2.50
» hyperborea (R. Br.)	2.50
» ilvensis (R. Br.)	2.50
» obtusa (Torr. Gr.)	2.50
Woodwardia angustifolia (Smith)	5.—
» radicans (Smith)	5.—

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX :


50 Foug. en 50 esp. ou variétés	50.—
50 » 25 »	35.—
25 » 25 »	25.—
25 » 10 »	15.—
12 » 12 »	10.—
12 » 6 »	6.—

Plantes exotiques, méditerranéennes ou orientales, mi-rustiques ou rustiques dans l'Ouest et le Midi.

Acæna cylindrostachia (R. et P.)	0.50
» macrostemon (Hook.)	0.50
» myriophylla (Lindl.)	0.50
» ovalifolia (R. et P.)	0.50
» ovina (Cunn.)	0.50
» Sanguisorbæ (Vahl.)	0.50
» splendens (Hook.)	2.50
Andes, régions antarctiques.	
Acanthosonchus cervicornis (Forsk.)	2.50
Palestine, Arabie, Egypte.	
Acanthus arboreus (Forsk.), Egypte	5.—
» hirsutus (Boiss.), Orient	5.—
Achillea oxyloba (Sch. Bip.)	2.50
Afrique australe.	
Aciphylla colensoi (Hook.)	2.50
Adenostoma fasciculata (Hook.), Californie	1.50
Aloë Hanburyana (Bak.)	5.—
Amphycome arguta (Royle), Himalaya	2.50
Andrachne colchica (Fisch.), Caucase	1.—
» telephioides (L.), Orient	1.—
Anemone Fannini (Harvey), Natal	10.—
Anoda Wrightii (A. Gray), Nouv. Mexique	5.—
Anthemis ætnensis (Schouw.), Sicile	0.50
» punctata (Vahl.), <i>Marguerite blanche</i>	1.50
de Sicile	
Aphananthe aspera (Planch.), Japon	1.50
Aphyllanthes monspeliensis (L.), Midi	1.50
Aplopappus ericoides (D. C.), Amérique sept.	1.50
» Fremonti (A. Gr.), Amérique sept.	1.50
Arenaria balearica (L.), Baléares et Corse	0.50
Aristolochia altissima (Desf.)	5.—
Artemisia mexicana (Willd.), Mexique	1.50
Arundinaria falcata (Nees), <i>Bambusa falc.</i>	5.—
Berkheya purpurea (Bent. et Hook.), Transwaal et Cap	1.50

fr. c.

Brachycome Sainclairii (Hook.), Nouv. Zélande	1.50
Cæsalpinia japonica (S. Zucch.), Japon	5.—
Calandrinia grandiflora (D. C.), Andes	0.50
» pilosiuscula (D. C.), Andes	1.—
» umbellata (D. C.), Andes	0.50
Petites pl. à f. succulentes, à fl. d'un carmin vif.	



Arenaria balearica.

Callicarpa japonica (Thunb.)	2.50
» mollis (S. et Z.)	2.50
» purpurea (Juss.), Chine	2.50
» sinensis (Stend.), Chine	2.50
Calicotome spinosa (Link.), Rég. méditerranéenne	1.50
Campanula fragilis (Cyr.), Italie méridionale	1.50
» isophylla alba , Italie	1.50
» primulæfolia (Brot.), du Portugal	1.—

	fr. c.
Camphorosma monspeliaca (L.) . . .	1.50
Capparis spinosa (L.), <i>Câprier</i> . . .	2.50
Carex Buchanani (Beggr.), Nouv. Zélande . . .	2.50
» Gaudiniana (Kunth.), Nouv. Zélande . . .	2.50
» gracilis (R. Br.), Australie . . .	2.50
» Petriei (Chees), Nouv. Zélande . . .	2.50
» Rasoulia (Boot), Nouv. Zélande . . .	2.50
» subdola (Boot) Nouv. Zélande . . .	2.50
Les Lèches néozélandaises offrent un aspect curieux, grâce à leurs feuillages frisés, tordus et de couleur généralement brune qui leur donne un cachet très particulier. Elles sont rustiques sous couverture à Genève.	
Carmichaelia australis (R. Br.) . . .	2.50
» compacta (Petrie) . . .	2.50
Cassia mimosoides (L.) . . .	2.50
Cassinia leptophylla (R. Br.), Nouv. Zélande . . .	2.50
Cedronella triphylla (Möench), <i>Beaume of Gilead</i> . . .	2.50
Celtis caucasica (Willd.) . . .	2.50
Celsia cretica (L.) . . .	2.50
» pontica (Boiss.) . . .	0.50
Chamaepeuce Casabone (D. C.), Midi . . .	1.50
» diacantha (D. C.), Midi . . .	0.50
Cheiranthus mutabilis (L'Hérit.), Canaries . . .	1.50
Chilopsis saligna (Don), Mexique . . .	2.50
Chironia floribunda (Paxton), Afrique australe . . .	2.50
Chloranthus brachystachys (Blume), Japon, Chine . . .	2.50
Chrysanthemum Niponicum (Franchet) . . .	1.50
Cinnamomum pedunculatum (Presl.) . . .	2.50
Cissus antarctica (Vent.), <i>Vigne d'Australie</i> ; feuillage persistant . . .	5.—
Cistus albidus (L.), grandes fl. carmin . . .	1.—
» creticus (L.) . . .	1.—
» formosissimus (Schnew.) . . .	2.50
» ladaniferus (L.), feuil. parfumé; grandes fl. blanch. maculées de pourpre; esp. superbe, rustique à Genève . . .	1.50
» laurifolius (L.), grandes fl. blanches; presque rustique . . .	1.50
» monspeliensis (L.) . . .	1.—
» salvifolius (L.), fl. blanches . . .	1.—
Clematis brachyata (Thunb.) . . .	2.50
» cirrhusa (L.) . . .	2.50
Cleyera japonica (S. et Z.) . . .	2.50
Cneorum tricozum (L.) . . .	1.50
Colletia spinosa (Lam.), <i>C. Horrida</i> , Amérique australe . . .	1.50
» Subul (Auran), Patagonie . . .	5.—
Collinsia Torreyi (A. Gr.), Californie . . .	1.—
Convolvulus althæoides (L.) . . .	1.—
Superbe Liseron du Midi, à fl. carmin, pourpre vif à la gorge, rampant sur le sol; grand soleil.	
» Dorycnium (L.), Grèce . . .	2.50
» incanus (Vahl), Montagnes-Rocheuses . . .	2.50
» Libanoticus (Boiss.), Syrie . . .	5.—
» lineatus (L.), Orient . . .	5.—
» mauritanicus (Boiss.), bleu violacé . . .	0.50
» Soldanella (L.), rose vif . . .	2.50
Coprosma Pehai (Ch.), Nouvelle Zélande . . .	5.—

	fr. c.
Cordyline indivisa (Steud.), Nouv. Zél. . .	2.50
Coris monspeliensis (L.) . . .	2.50
Corokia cotoneaster (Raoul). . . .	5.—
Coronilla Valentina (L.) . . .	2.50
Cosmos sulfureus (Cav.), gracieux petit Dahlia jaune de Californie, annuel . . .	0.50
Cotula pyrethrifolia (Hook.), Nouvelle Zélande . . .	2.50
» squalida (Hook.), Nouvelle Zélande . . .	0.50
Cotyledon amœnum (de Smet), <i>Echeveria amœna</i> . . .	0.50
» glauca (Ref.), <i>Echeveria glauca</i> . . .	0.50
» Pachyphitum (Bak.), Mexique . . .	2.50
» Pfersdorffii (Hort.) . . .	2.50
» racemosa (C. Mey.), Afrique australe . . .	2.50
» secunda (Bak.), <i>Echeveria S.</i> , Mexique . . .	0.50
» spuria (L.), Afrique australe . . .	2.50
Pl. succulentes, à fl. rouges ou roses, à jolis feuillages.	
Craspedia uniflora (Forst.), Nouvelle-Zélande . . .	5.—
Crassula Cooperi (Rgl.) . . .	1.—
» cordata (Sol.) . . .	1.—
» glomerata (Berg.) . . .	1.—
» gracilis (Hort.) . . .	1.—
» lactea (Ait.) . . .	1.—
» Lycopodioides (Lam.), charmant arbuste gracieux, aux rameaux de Sélaginelles . . .	1.—
» marginalis (Ait.) . . .	1.—
» perfoliata (L.) . . .	1.—
» spathulata (Thunb.) . . .	1.—
» tetragona (L.) . . .	1.—
» verticillaris (L.) . . .	1.—
Petites pl. succulentes à rameaux trainants ou dressés, à fl. blanches ou rose plus ou moins vif, non rustiques à Genève et provenant de l'Afrique australe; dans le Midi et l'Ouest de la France et de l'Angleterre elles résistent aux hivers. Rocailles; soleil.	
Crythmum maritimum (L.) . . .	0.50
Cyclamen africanum (Boiss.) . . .	1.50
Cyperus strigosus (Hook.), Amérique tempérée . . .	1.—
Delphinium californicum (Torr. et Gr.) . . .	2.50
» cardinale (Hook.) . . .	2.50
» Menziesii (D. C.) . . .	2.50
» occidentale (Wats.) . . .	2.50
» Parryi (Gray) . . .	2.50
Toutes ces esp. app. aux Montagnes-Rocheuses.	
» sulfureum (Boiss.), Turkestan . . .	1.—
Desmanthus brachylobus (Benth.), Amérique sept. . .	2.50
Dianthus arboreus (L.), Archipel grec . . .	1.50
» rupicola (Biv.), Sicile . . .	1.50
Diplotaxis viminea (D. C.), Midi . . .	1.—
Dipteracanthus canescens (Nees), Californie . . .	2.50
Très bel arbuste nain, presque rustique ici, à fl. d'or, décoratives et propre à garnir les rochers.	
Discaria longispina (Miers.), République Argentine . . .	2.50
Disporum (Prosarthes) Hookeri (Nich.), Californie . . .	2.50

	fr. c.		fr. c.
<i>Dodonaea viscosa</i> (Jacq.), Japon, Chine, etc.	2.50	port rampant, qui se couvre de fleurs roses, tout l'été durant.	
<i>Dorycnium latifolium</i> (Willd.), Orient	1.50	<i>Felicia abyssinica</i> (Sch. Bip.), Mont. d'Abyssinie.	1. —
<i>Echeveria amœna</i> (De Smett), presque rustique ici	1. —	» <i>fragilis</i> (Cass.), Transvaal	1. —
<i>Echeveria</i> , v. <i>Cotyledon</i> .		<i>Ferula Narthex</i> (Boiss.), Baltistan	2.50
<i>Edgeworthia Gardneri</i> (Meissn.), <i>E. chrysanthra</i> ; Chine, Japon	5. —	<i>Francoa appendiculata</i> (Cav.)	1. —
Délicieux Daphné à fl. jaune-pâle, fleur. de mars-avril; rustique à Genève sous couverture légère.		» <i>ramosa</i> (Don.)	1. —
<i>Ehretia elliptica</i> (D. C.), Mexique	5. —	» » v. <i>picturata</i>	1. —
» <i>macrophylla</i> (Wall.), Himalaya	5. —	» <i>sonchifolia</i> (Cav.),	1. —
» <i>serrata</i> (Roxb.), Asie chaude	5. —	Jolies Saxifragées à fl. roses, en grappes dressées, rustiques sous légère couv. à Genève.	
<i>Ephedra alata</i> (Desne), Arabie, Perse, etc.	2.50	<i>Frankenia hirsuta</i> (L.), Midi et Orient	0.50
» <i>altissima</i> (Desf.), Egypte, Tripoli, etc.	2.50	» <i>lævis</i> (L.), Midi et Orient	0.50
» <i>americana</i> (Humb.), Amérique australe	2.50	<i>Frasera speciosa</i> (Dougl.), Californie	2.50
» <i>Andina</i> (Poepp.), Amérique australe	2.50	<i>Fumana</i> (<i>Helianthemum</i>) <i>lævipes</i> (Spach)	2.50
» <i>distachya</i> (L.), déserts asiatiques	2.50	Midi	2.50
» <i>fragilis</i> (Desf.), Arabie, Syrie, Orient	2.50	» <i>glutinosa</i> (Boiss.), Crête	2.50
» <i>monostachya</i> (L.), Asie centrale et occidentale	2.50	<i>Garrya elliptica</i> (Dougl.), Californie	5. —
» <i>nebrodensis</i> (Tineo), régions méditerranéennes	2.50	<i>Gaura coccinea</i> (Nutt.), Amérique du Nord	5. —
» <i>nevadensis</i> (Wats.), Californie	2.50	<i>Gazania ringens</i> (Mœnch), Cap.	1. —
» <i>Sikkimensis</i> (Hort.), Himalaya	2.50	Grandes fl. jaune-orangé vif.	
» <i>viridis</i> (Coville), Mexique	5. —	» » v. <i>couronnée</i>	1.50
<i>Epilobium luteum</i> (Pursh.), Amérique	2.50	Très belles fl. blanches à macules noires.	
» <i>obcordatum</i> (A. Gray), Amérique	2.50	» » v. <i>gloriosa</i>	1.50
<i>Erica mediterranea</i> (L.)	1.50	Très belles fl. blanches à macules noires. Bien supérieures au <i>Gazania splendens</i> des jardins, les 3 espèces et variétés méritent d'être très cultivées et font un effet superbe. Il faut, l'hiver, les rentrer sous couche froide ou dans l'orangerie.	
» <i>stricta</i> (Don.)	1.50	<i>Genista ætnense</i> (D. C.)	2.50
<i>Eriobotrya japonica</i> (Lindl.), <i>Néflier du Japon</i>	1. —	<i>Geranium intermedium</i> (Colla), Andes du Chili	2.50
<i>Eriogonum arborescens</i> (Greene), Californie	2.50	» <i>sessiliflorum</i> (Cav.), Nouvelle-Zélande	2.50
» <i>californicum</i> (Murr.)	2.50	» <i>Traversii</i> (Hook.), Nouvelle-Zélande	2.50
» <i>fasciculatum</i> (Benth.), Californie	2.50	<i>Geum chilense</i> (Balb.), Andes de l'Amérique du Sud	1. —
» <i>flavum</i> (Nutt.), Californie	2.50	» <i>parviflorum</i> (Commers), Nouvelle-Zélande	2.50
<i>Erodium chamædryoides</i> (L'Hér.), Corse	2.50	<i>Gilia aggregata</i> (Sprgl.), Californie	2.50
<i>Erpetion reniforme</i> (Spach), violette de Nouv.-Zélande	1. —	<i>Giraldia</i> (Gen. nov.) <i>Stapffii</i> (Baldwin), Chine	10 —
<i>Eryngium agavifolium</i> (Gris.), République Argentine	1.50	<i>Haplocarpha Leichtlini</i> (N. E. Br.), Afrique australe	1.50
» <i>serra</i> (Chem.), Andes du Brésil	1.50	<i>Hebenstretia comosa</i> (Hochstr.), Afrique australe	1.50
<i>Escallonia macrantha</i> (Hook.)	1.50	<i>Helianthemum formosum</i> (Dun.), Portugal (fl. jaune et rouge)	1.50
Très bel arbuste à fl. rose ardent, rustique ici au pied d'un mur.		» <i>Halimifolium</i> (Pers.), Midi	1.50
<i>Eucalyptus globulus</i> (Labil.), Australie	1. —	» <i>hirtum</i> (Mill.), Espagne	1.50
<i>Euphorbia atropurpurea</i> (Brouss.), <i>Ténériffe</i>	1. —	» <i>lavandulæfolium</i> (Mill.), Midi	1.50
» <i>caput Medusæ</i> (L.), Afrique australe	1. —	» <i>rosmarinifolium</i> (Kunth.), Midi	1.50
» <i>ceratocarpa</i> (Ten.), Sicile	1. —	» <i>umbellatum</i> (Mill.), Midi	1.50
» <i>Characias</i> (L.), Midi	1. —	<i>Helychris diosmæfolium</i> (Sweet), Australie	2.50
» <i>Dendroides</i> (L.), Midi. Très curieux	1. —	<i>Helxine Soleirolii</i> (Req.), Corse et Sardaigne	2.50
» <i>Epithymoides</i> (L.), v. <i>polychroma</i>	1. —	<i>Hibiscus mutabilis</i> (L.), Chine	2.50
» <i>Reginæ-Jubæ</i> (Webb.), <i>Ténériffe</i>	1. —	<i>Hypericum balearicum</i> (L.), Ile Majorque	2.50
<i>Euscaphis staphyloides</i> (S. et Z.), Japon	5. —	» <i>olympicum</i> (L.), Orient	2.50
<i>Evodia rutæcarpa</i> (Hook.), Himalaya, Chine, Japon	2.50	<i>Iberis gibraltarica</i> (L.), Espagne méridionale	0.50
<i>Excœcaria japonica</i> (Müll.)	2.50	» <i>semperflorens</i> (L.), Italie méridionale	0.50
<i>Falkia repens</i> (L.), Transvaal	2.50		
Gracieux convolvulus vivace à f. persistantes, à			

	fr. c.		fr. c.
<i>Inula viscosa</i> (Dryand), Midi	1.—	Paris; elles sont rustiques dans le Midi et l'Ouest de la France et dans le Sud de l'Angleterre.	
<i>Kleiniarepens</i> (Haw.), Afrique australe .	2.50	<i>Metaplexis Stauntoni</i> (Schult.), Chine . .	2.50
<i>Lathyrus splendens</i> (Kell.), Californie (superbe)	2.50	<i>Micrampelis</i> , v. <i>Sicyos fabacea</i>	
<i>Lavandula multifida</i> (L.), Midi	1.—	<i>Mimulus primuloides</i> (Benth.), Nouv.-Zél. .	1.50
» <i>Stœkas</i> (L.), Midi	1.—	» <i>repens</i> (R. Br.), Nouv.-Zél.	1.50
<i>Lavatera assurgentiflora</i> (Kell.), Californie	1.—	<i>Monanthes atlantica</i> (Ball.), Maroc . . .	2.50
» <i>maritima</i> (Gouan), Midi	1.—	» <i>brachycaulon</i> (Lowe), Ile Salvage . . .	2.50
<i>Leonitis Leonurus</i> (R. Br.), Cap	2.50	<i>Monardella villosa</i> (Benth.), Californie .	2.50
<i>Leptinella</i> (<i>Cotula</i>) <i>dioica</i> (Hook.), Nouv.-Zélande	0.50	<i>Muehlenbeckia adpressa</i> (Meissn.), Australie	1.—
» <i>potentillina</i> (Muell.), Australie	1.50	» <i>axillaris</i> (Meissn.), Nouv. Zél.	1.—
Petites Composées rampantes très propres à garnir les rochers; rustiques sous légère couverture.		» <i>complexa</i> (Meissn.), Australie	1.—
<i>Linaria hepaticæfolia</i> (Stend.), Corse et Sardaigne	0.50	» <i>nana</i> (Hort.)	1.—
<i>Linum campanulatum</i> (L.), Midi	1.—	Arbustes rampants et nains, de la famille des Polygonées, très curieux d'aspect, rustiques dans les endroits abrités.	
» <i>maritimum</i> (L.), Midi	1.—	<i>Nierenbergia rivularis</i> (Miers), La Plata .	0.50
» <i>narbonense</i> (L.), Midi	1.—	<i>Olea europæa</i> (L.), <i>Olivier</i>	2.50
<i>Lippia canescens</i> (H. B.), Andes du Pérou .	0.50	<i>Olearia obcordata</i> (Benth.), Australie . .	2.50
<i>Lithospermum graminifolium</i> (Viv.), Italie méridionale	2.50	» <i>stellulata</i> (D. C.), <i>O. Gunnii</i> , Australie .	2.50
» <i>intermedium</i> (Hort.)	5.—	Petits arbustes de la famille des Composées.	
» <i>rosmarinifolium</i> (Ten.), Italie mérid. .	5.—	<i>Origanum Dictamnus</i> (L.), Crête	2.50
<i>Loasa lateritia</i> (Gill.), Chili	1.—	» <i>pulchrum</i> (Boiss.), Grèce	2.50
<i>Luzuriaga</i> (<i>Callixène</i>) <i>erecta</i> (Kunth), Chili	5.—	» <i>sipyleum</i> (L.), Asie Mineure	2.50
<i>Lycium grevilleanum</i> (Gill.), République Argentine	2.50	<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> (Lindl.), Chine .	5.—
<i>Mallotus japonica</i> (Mull.)	5.—	<i>Othonna carnosa</i> (Less.), Afrique australe .	1.—
<i>Mandragora autumnalis</i> (Bert.), Sicile, etc. .	2.50	» <i>cheirifolia</i> (Batt.), Algérie	1.—
» <i>vernalis</i> (Bert.), Orient, Midi	2.50	» <i>crassifolia</i> (L.), Cap	1.—
<i>Margyricarpus setosus</i> (R. P.), Andes du Chili	1.—	<i>Oxalis cernua</i> (Thunb.), Afrique australe .	1.—
<i>Matricaria ambigua</i> (Mats.), Japon	2.50	» <i>enneaphylla</i> (Cav.), Iles Falkland . .	2.50
<i>Matthiola fenestralis</i> (R. Br.), Crête . . .	1.—	» <i>vespertilionis</i> (Zuc.), Mexique	2.50
» <i>sinuata</i> (R. Br.), Midi	1.—	<i>Passiflora cærulea</i> (L.), Brésil	1.—
» » var. à fl. blanches	1.—	<i>Peganum crythmifolium</i> (Retz), Sibérie .	1.50
<i>Mazus pumilio</i> (R. Br.), Nouv.-Zélande . .	0.50	<i>Pelargonium artemisiæfolium</i> (D. C.) . . .	2.50
<i>Mentha Requierii</i> (Benth.), Corse	0.50	» <i>carnosum</i> (Ait.), Cap	2.50
<i>Mesembrianthemum acinaciforme</i> (L.), <i>æquilaterale</i> (Haw.), <i>agninum</i> (Haw.), <i>aureum</i> (L.), <i>barbatum</i> (L.), <i>caulescens</i> (Mill.), <i>coccineum</i> (Haw.), <i>Cooperi</i> (Hook.), <i>cordifolium</i> (L.), <i>crassifolium</i> (L.), <i>curtum</i> (Haw.), <i>deltoides</i> (Mill.), <i>echinatum</i> (Lam.), <i>Echlonis</i> (Salm-Dyck), <i>edule</i> (L.), <i>elegans</i> (Jacq.), <i>felinum</i> (Lam.), <i>fulgens</i> (Hort.), <i>inclaudens</i> (Haw.), <i>Lehmanni</i> (Echl.), <i>linguæforme</i> (Haw.), <i>lupinum</i> (Haw.), <i>muricatum</i> (Haw.), <i>multiceps</i> (Salm-Dyck), <i>perfoliatum</i> (Haw.), <i>polyanthum</i> (Haw.), <i>rhomboideum</i> (Salm-Dyck), <i>rigidum</i> (Haw.), <i>rubricaulæ</i> (Willd.), <i>splendens</i> (L.), <i>tigrinum</i> (Haw.), <i>tuberosum</i> (L.), <i>uncinatum</i> (L.).		» <i>crispum</i> (L'Hér.), Cap	2.50
Toutes ces ficoides, origin. de l'Afrique du Sud, sont à 50 cts. la pl.; elles sont bonnes pour la décoration des rochers en plein soleil et fleurissant abondamment l'été, demandent à être rentrées l'hiver sous le climat de Genève et		» <i>Endlichrianum</i> (Fenzl.), Orient . . .	2.50
		Rustique sous couverture.	
		<i>Pentstemon antirrhinoides</i> (Benth.), Californie	2.50
		» <i>cordifolius</i> (Benth.), Californie	2.50
		» <i>heterophyllus</i> (Lindl.), »	2.50
		» <i>Lemmoni</i> (A. Gr.), »	2.50
		» <i>puniceus</i> (A. Gr.), »	2.50
		<i>Pernettya mucronata</i> (Gaud.), Magellan .	2.50
		<i>Petteria ramentacea</i> (Presl.), Dalmatie .	2.50
		<i>Philesia magellanica</i> (Gmel), <i>P. buxifolia</i> .	2.50
		<i>Phlomis fruticosa</i> (L.), Midi	1.—
		<i>Phygелиus capensis</i> (Meyer), Cap	1.—
		<i>Pistacia Lentiscus</i> (L.), Midi	2.50
		<i>Plagius ageratifolius</i> (L'Hérit.), <i>Chrysanthemum flosculosum</i>	1.—
		<i>Platycaria strobilacea</i> (S. Z.), Japon . .	2.50
		<i>Podocarpus affinis</i> (Seem.), Iles Fidji . .	5.—
		» <i>Nageia</i> (R. Br.), Japon	5.—
		<i>Polygonum capitatum</i> (Don), Himalaya .	0.50
		» <i>vacciniifolium</i> (Wall.), »	1.—
		<i>Potentilla fulgens</i> (Wall.), »	2.50
		» <i>Mooniana</i> (Wight), »	2.50
		» <i>peduncularis</i> (Don)	2.50
		<i>Pratia angulata</i> (Hook.), Nouvelle-Zélande .	1.—
		» <i>begoniifolia</i> (Lindl.) Himalaya	1.—

	fr. c.		fr. c.
<i>Primula Poissonni</i> (Franch.), Yun-Nan	0.50	<i>Salvia spathacea</i> (Greene), Californie	1.50
<i>Prosarthes Hookeri</i> , v. <i>Disporum</i>		<i>Samolus repens</i> (Pers.), Nouv.-Zél.	2.50
<i>Psoralea acaulis</i> (Stev.), Caucase	2.50	» <i>repens</i> , v. <i>littoralis</i> (Schrk.), »	2.50
» <i>bituminosa</i> (L.), Rég. méditerr.	1.—	<i>Santolina pinnata</i> (Viv.), Midi	0.50
» <i>glandulosa</i> (L.), Chili	2.50	» <i>rosmarinifolia</i> (L.), Midi	0.50
» <i>subacaulis</i> (Torr.), Andes américaines	2.50	<i>Sapindus marginatus</i> (Willd.), Amér. sept.	2.50
<i>Ptiloria californica</i> (Greene.)	1.50	» <i>Mukosowi</i> (Gærtn.), Japon	2.50
<i>Purshia tridentata</i> (D. C.), Californie	5.—	<i>Saxifraga Mederensis</i> (Don), Madère	5.—
<i>Quercus acuta</i> (Thunb.), Japon	5.—	<i>Sedum carneum</i> (Hort.)	0.50
» <i>Banisteri</i> (Mich.), Amér. septent.	5.—	» <i>farinosum</i> (Lowe), Madère	2.50
» <i>glauca</i> (Thunb.), Japon	5.—	» <i>Stahlia</i> (v. Solms), Mexique	2.50
» <i>Ilex</i> (L.), Rég. méditerranéennes	2.50	<i>Selliera radicans</i> (Cav.), Australie	2.50
» <i>Libani</i> (Oliv.), Orient	5.—	<i>Senecio compactus</i> (Keirk.), Nouv.-Zél.	2.50
» <i>lyrata</i> (Walt.), Amér. septent.	5.—	» <i>candidus</i> (D. C.), Sicile	2.50
» <i>phylliræoides</i> (A. Gr.), Japon	5.—	» <i>pulcher</i> (Hook.), Amérique méridionale	2.50
» <i>serrata</i> (Thunb.), Japon	5.—	» <i>cruentus</i> (D. C.), Canaries	2.50
» <i>Vibrayana</i> (Franchet), Japon	5.—	» <i>macrocephalus</i> (D. C.), Cap	2.50
<i>Ranunculus creticus</i> (L.)	2.50	» <i>palmarum</i> (Pall.), Sibérie	2.50
» <i>monspeliacus</i> (L.)	2.50	<i>Sibthorpia europæa</i> (L.), Europe occid.	1.—
<i>Raphiolepis indica</i> (Lindl.), Chine	2.50	» <i>peregrina</i> (L.), Ile Maurice	1.—
» <i>japonica</i> (S. Zucc.), Japon	2.50	<i>Sicyos fabacea</i> (Naud.), Californie	2.50
» <i>ovata</i> (Briot), Japon	2.50	<i>Sideritis montana</i> (L.), Orient	2.50
» <i>rubra</i> (Lindl.), Asie orientale	2.50	<i>Silene fruticosa</i> (L.), Sicile	2.50
<i>Rhamnus Alaternus</i> (L.), <i>Alaternes</i> , Midi	2.50	<i>Smilax aspera</i> (L.), Midi	2.50
» <i>alnifolia</i> (L'Hér.), Amér. septent.	2.50	» <i>China</i> (L.), Asie orientale	5.—
» <i>chlorophora</i> (Desne), Asie mineure	2.50	» <i>rotundifolia</i> (L.), Amérique septentr.	5.—
» <i>costata</i> (Maxim.), Japon	5.—	<i>Solanum Sainclairii</i> (Hort.)	2.50
» <i>crenata</i> (S. Zucc.), Japon	2.50	» <i>tuberosum</i> fol.-var., pomme de terre	
» <i>grandifolia</i> (Fisch.), Caucase	2.50	à f. panachées	1.—
» <i>japonica</i> (Maxim.), Japon	2.50	<i>Sophora affinis</i> (Torr. Gr.), Californie	2.50
» <i>Pallasii</i> (Fisch.), Caucase	5.—	» <i>galeoides</i> (Pall.), Japon	2.50
» <i>punctata</i> (Boiss.), Orient	2.50	<i>Stachys chrysantha</i> (Boiss.), Grèce	2.50
» <i>sinensis</i> (Ser.), Chine	2.50	» <i>coccinea</i> (Jacq.), Mexique	2.50
» <i>spatulæfolia</i> (Fisch.), Caucase	2.50	» <i>cretica</i> (S. S.), Orient	2.50
<i>Rhus Laurina</i> (Nutt.), Californie	2.50	» <i>Ehrenbergii</i> (Boiss.), Syrie	2.50
» <i>semi alata</i> (Murr.), v. <i>Osbeckii</i> , Japon	2.50	<i>Stanleya pinnatifida</i> (Nutt.), Amér. sept.	2.50
» <i>succedanea</i> (L.), v. <i>Japonica</i> , Japon	2.50	<i>Statice auriculæfolia</i> (Vahl.), Midi	1.—
» <i>sylvestris</i> (S. Zucc.), Japon	2.50	» <i>bellidifolia</i> (Gouan), Midi	1.—
» <i>trichocarpa</i> (Miquel.), Japon	2.50	» <i>caspia</i> (Willd.), Caucase, Orient	1.—
» <i>trilobata</i> (Nutt.), Californie	2.50	» <i>cordata</i> (L.), Midi	1.—
» <i>vermicifera</i> (D. C.), Japon	5.—	» <i>Girardiana</i> (Suss.), Espagne	1.—
<i>Ribes ciliatum</i> (Humb.), Mexique	2.50	» <i>globulariæfolia</i> (Desf.), Algérie	1.—
» <i>divaricatum</i> (Dougl.), Californie	2.50	» <i>incana</i> (L.), Orient, etc.	1.—
» <i>laxiflorum</i> (Dougl.), Californie	2.50	» <i>Limonium</i> (L.), Rég. méditerranéennes	1.—
» <i>Rœzli</i> (Rgl.), Californie	2.50	» <i>Sarephana</i> (Beck.), Orient	1.—
<i>Rubus australis</i> (Forst.), Nouv.-Zélande	2.50	» <i>tatarica</i> (L.), Orient	1.—
» <i>deliciosus</i> (Torr.), Californie	1.50	<i>Stephananda flexuosa</i> (S. Zucc.), Japon	2.50
» <i>fraxinifolius</i> (Poir.), Java	2.50	» <i>Tanakæ</i> (Franchet), Japon	2.50
» <i>nutans</i> (Wall.), Himalaya	2.50	<i>Sterculia platanifolia</i> (L.), Japon	2.50
» <i>Nutkanus</i> (Moc.), Californie	1.50	<i>Stobæa Radula</i> (Harw.), Afrique australe	2.50
» <i>parvus</i> (Buch.), Nouvelle-Zélande	2.50	<i>Stokesia cyanea</i> (L'Hér.), Etats-Unis	2.50
<i>Rosa bracteata</i> (Wendl.), Chine	2.50	<i>Styrax japonicum</i> (S. Zucc.), Japon	5.—
<i>Rumex flexuosus</i> (Sol.), Nouvelle-Zélande	1.50	» <i>Obassia</i> (S. Zucc.), Japon	5.—
<i>Ruscus hypoglossum</i> (L.), Midi	1.50	<i>Suæda fruticosa</i> (Torsk.), Midi	2.50
<i>Ruta angustifolia</i> (Pers.), Midi	1.—	<i>Talinum crassifolium</i> (Willd.), Andes	2.50
» <i>bracteosa</i> (D. C.), Midi	1.—	» <i>patens</i> (Willd.), Andes	2.50
» <i>Chalepensis</i> (L.), Midi	1.—	<i>Teucrium Arduini</i> (L.), Midi	1.—
» <i>divaricata</i> (Salzm.), Perse	1.—	» <i>flavum</i> (L.), Midi	1.—
» <i>montana</i> (L.), Midi	1.—	» <i>græcum</i> (Celak), Grèce	2.50
» <i>patavina</i> (L.), Midi	2.50	» <i>lucidum</i> (L.), Midi	1.—
<i>Salpichroa rhomboideum</i> (Miers), République Argentine	1.—	<i>Thymus carnosus</i> (Boiss.), Espagne	1.—
		» <i>Herba-Barone</i> (Lois.), Espagne	1.—


	fr. c.
Torreya grandis (Fort.), Chine	5. —
» myristica (Hook.), Californie.	5. —
» nucifera (S. Zucc.), Japon	5. —
Tournefortia Heliotropioides (Hook.), Amérique du Sud	2.50
Héliotrope vivace, presque rustique chez nous.	
Trachelospermum jasminoides (Lem.), Chine	2.50
Trichosanthes cucumeroides (Maxim.)	1. —
Tupa montana (Phil.), Chili	2.50
Umbellularia californica (Nutt.), Calif.	2.50
Vella pseudo cytisus (L.), Espagne	2.50
Verbena venosa (Gill.), Républ. Argent.	1.50
Veronica amplexicaulis (Armst.), N.-Zél.	1. —
» Andersonii (Lindl.), <i>Hybride</i> .	1. —
» angustifolia (Cunn.), Australie	1. —
» anomala (Armst.), Nouvelle-Zélande	1. —
» Bidwilli (Hook.), Nouvelle-Zélande	1. —
* » buxifolia (Benth.), Nouvelle-Zélande	1. —
» canescens (Kirk.), Nouvelle-Zélande, espèce minuscule.	2.50
* » carnosula (Hook.), Nouvelle-Zélande	1. —
* » Chathamica (Buch.), Nouvelle-Zélande, espèce rampante.	1. —
» Colensoi (Hook.), Nouvelle-Zélande.	1. —
» crispifolia	2.50
» diosmifolia (Cunn.), Nouvelle-Zélande	2.50
» elliptica (Forst.), id. et détroit Magellan	1. —
» epacridea (Hook.), Nouvelle-Zélande	1. —
» Fairfieldii (Hort.)	1. —
» formosa (Braun), Tasmanie	1. —
* » glaucocœrulea (Armstr.), Nouv.-Zél.	1. —
» Haastii (Hook.),	1. —
» Hectori (Hook.),	2.50
» Hulkeana (F. Muell.),	2.50
» Johanoracensis (Hort.)	1. —
» Kirkii (Armst.), Nouvelle-Zélande	1. —
* » Lewisii (Armst.),	1. —
» ligustrifolia (Cunn.),	1. —

	fr. c.
* Veronica Lyalli (Hook.), Nouvelle-Zél.	2.50
» Lycopodioides (Hook.),	1. —
» monticola (Armstr.),	1. —
» Newryensis (Hort.)	1. —
» pimeleoides (Hook.), Nouvelle-Zélande	1. —
* » pinguæfolia (Hook.),	1. —
» Pseudo-Traversi (Cockayne),	1. —
» Raoulii (Hook.),	2.50
» salicifolia (Forst.),	1. —
» salicornioides (Hook.),	2.50
* » telephiifolia (Vahl.), Orient	1. —
* » Traversii (Hook.), Nouvelle-Zélande	1. —
* » » <i>var. sessilifolia</i> ,	1. —
» vernica (Hook.),	1. —
» Whitalli (Hort.)	2.50

Les esp. marquées d'un * sont rustiques dans les endroits abrités de notre pays. Ces différ. Véron. de la Nouv.-Zél. sont de charmants arbustes à f. persistantes, à feuillage et à fl. d'ornement.


Viburnum Tinus (L.), <i>Laurier-Thym</i> , Midi	1. —
Vitex incisa (Lam.), Asie centrale	2.50
» Negundo (L.), Japon	2.50
» trifolia (L.), Asie centrale.	2.50
» » <i>var. unifoliata</i> , Japon.	2.50
Vitis antarctica (Benth.), Australie	2.50
Vittadinia australis (Kirk.), Nouv.-Zél.	1. —
» triloba (D. C.), Rég. antarctiques	0.50
Withania organifolia (Hort.)	2.50
Wyetia mollis (A. Gr.), Californie	2.50
Yucca angustifolia (Pursh.), Californie	2.50
» Whipplei (Torr.),	2.50
Zanthoxylum ailanthoides (S. Z.), Japon	2.50
» Bungei (Planchon), Chine	2.50
» piperitum (D. C.), Chine et Japon	2.50
» » <i>inermis</i> , Japon	2.50
» planispinum (S. Zucc.), Japon	2.50
» schinifolium (S. Zucc.), Chine et Japon	2.50
Zelkova crenata (Spach.), Caucase	2.50
Zizyphus sativa (Gærtn.), Rég. méditerranéennes	2.50

Cactées rustiques.



Opuntia Raffinesquiana.

Cereus viridiflorus (Engelm.) 5. —
Echinocactus Simpsoni (Engelm.) 5. —



Opuntia vulgaris.

Mamillaria missouriensis (Sweet.) 5. —
Opuntia arborescens (Engelm.) 2.50

	fr. c.
Opuntia arenaria (Engelm.)	2.50
» Arkansæ (Engelm.)	2.50
» brachyarthra (Engelm.)	2.50
» camanchica (Engelm.)	2.50
» » <i>v. gigantea</i>	5.—
» » <i>v. missouriensis</i>	5.—
» » <i>v. rubra</i> , fl. rouge vif	5.—
» » <i>v. salmonea</i> , fl. roses	5.—
» cymochila (Engelm.)	2.50
» fragilis (Haw.)	2.50
» fulgida (Engelm.), fl. d'un rouge vif	5.—
» humilis (Haw.)	2.50

	fr. c.
Opuntia mesacantha (Salm-Dyck)	2.50
» polycantha (Haw.)	2.50
» Raffinesquiana (Engelm.)	1.—
» spinocentra (Engelm.)	2.50
» vulgaris (Mill.), <i>Cactus du Tyrol</i>	1.—
» Xanthostemma (Engelm.)	5.—

Ces Cactées sont d'une grande beauté. Elles résistent à nos climats les plus rudes, même au nord de l'Allemagne, si l'on a soin, l'hiver, de les couvrir d'un toit en planches à une certaine hauteur, de manière à ce que l'air puisse jouer dessus sans que la pluie ou la neige les atteigne.

Plantes aquatiques et marécageuses.

Les espèces purement aquatiques qui veulent être plantées au fond de l'eau sont marquées d'un *; celles qui sont amphibies ont un ! et les espèces purement paludéennes qui réussissent dans tout sol marécageux imprégné d'eau, n'ont aucun signe.

	fr. c.
* Acorus Calamus (L.), <i>Roseau odorant</i>	0.50
*» » à feuilles panachées	1.—
» gramineus (Ait.), <i>A. pusillus</i>	0.50
» » à feuil. panachées	1.—
* Alisma natans (L.)	1.50
! » plantago (L.)	0.50
Anagallis tenella (L.), <i>mouron rose</i>	2.50
Anemone rivularis (Buch.)	0.50
Aponogeton distachyon (Thunb.)	1.—



Butomus umbellatus.

* Arundo Donax (L.)	0.50
Astilbe rivularis (Hamilt.)	0.50
Astrantia major (L.)	0.50
Butomus umbellatus (L.), <i>Jonc fleuri</i>	1.—
! Calla palustris (L.)	1.—
Caltha palustris (L.), <i>Populage</i>	0.50
» » à fleurs pleines	1.—

	fr. c.
Caltha parnassifolia (Raf.)	2.50
» purpurascens (Hort.)	2.50
» radicans (Forst.)	2.50
Cardamine pratensis (L.), <i>Cresson violet</i>	0.50
» » à fl. doubles	1.—



Acorus Calamus.

Carex Baldensis (L.), <i>Laîche à fl. blanches</i>	1.—
» flava (L.)	0.50
» maxima (Scop.)	0.50
» paludosa (Good.)	0.50
» paniculata (L.)	0.50
! » pseudocyperus (L.)	0.50
! » stricta (Good.)	1.—
Comarum palustre (L.)	0.50
! Cyperus longus (L.)	1.—



Un groupe de plantes aquatiques.

	fr. c.
Eomecon chionantha (Haw.)	1.50
Epilobium abyssinicum (Höchst.)	0.50
» hirsutum (L.)	0.50
» » à fleurs blanches	1.—
Epipactis gigantea (Dougl.)	2.50
» palustris (Sw.)	1.—
Equisetum palustre (L.), <i>Prêle des marais</i>	1.—
» hyemale (L.), <i>P. d'hiver</i>	1.—
» sylvaticum (L.), <i>P. des bois</i>	1.—
» variegatum (Schl.)	1.—
Eriophorum alpinum (L.)	1.—
» angustifolium (Roth.), <i>Line-aigrette</i>	1.—
» capitatum (Hort.)	1.—
» latifolium (Hoppe)	1.—
Gentiana Pneumonanthe (L.)	2.50
Gratiola officinalis (L.)	0.50
Glyceria aquatica (Wahl.)	0.50
fluitans (R. Br.)	0.50
Heleocharis palustris (R. Br.)	1.—
Hottonia palustris (L.)	2.50



Houttuynia cordata.

Houttuynia cordata (Thunb.)	2.50
Hydrocharis morsus ranæ (L.)	2.50
Hydrocotyle moschata (Forst.)	2.50
» rotundifolia (Roxb.), <i>H. sibthorpioides</i>	2.50
» vulgaris (L.)	0.50




Iris pseudo-acorus.

	fr. c.
Hippuris Rhætica (Zschok.)	2.50
vulgaris (L.)	1.—
Iris pseudo-acorus (L.), <i>Iris jaune</i>	0.50
V. en outre p. 88.	
Juncus conglomeratus (L.)	0.50
» glaucus (L.), <i>Jonc des jardiniers</i>	0.50
Limnanthemum nymphoides (Link.)	1.—
<i>Villarsia</i>	1.—
Lobelia syphilitica (L.)	0.50
Lotus tetragonolobus (L.)	1.—
» uliginosus (Schk.)	0.50
Lychnis flos-cuculi (L.)	0.50
» » à fl. blanches	1.50
Lysimachia clethroides (Duby)	0.50
» longifolia (Pursh.)	0.50
» nummularia (L.), <i>trainante</i>	0.50
» punctata (L.)	0.50
» thyrsiflora (L.)	0.50
» vulgaris (L.)	0.50
Lythrum , v. p. 89.	
Mentha , v. p. 41.	



Menyanthes trifoliata.

Menyanthes trifoliata (L.), <i>Trèfle d'eau</i>	0.50
Mimulus luteus (L.)	0.50
Myosotis palustris (With.)	0.50



Nuphar luteum.


	fr. c.
* Nuphar luteum (Sm.), <i>Nénufar jaune</i>	2.50
* Nymphaea alba (L.), <i>Nénufar blanc</i>	1.—
Onoclea germanica (Hook.), <i>Struthiopteris</i>	1.—
Osmunda regalis (L.), <i>Fougère royale</i>	1.50
Parnassia palustris (L.)	0.50



Phragmites communis et Nymphaea alba.

Phragmites communis (Trin.), <i>Roseau</i>	0.50
* Polygonum amphibium (L.), <i>Renouée aquatique</i>	1.50
!* Pontederia cordata (L.)	1.50
Potamogeton natans (L.), <i>Potamot</i>	1.—
Potentilla anserina (L.)	0.50
» <i>fruticosa</i> (L.)	1.—
Primula Poissoni (Franch.)	0.50
» <i>rosea</i> (Royle)	1.—
! Ranunculus Lingua (L.)	0.50
Rodgersia , v. p. 54.	
! Rumex hydrolapathum (L.), <i>Bananier des eaux</i>	1.50
!* Sagittaria alpina (Willd.), <i>très rare</i>	2.50
!* » <i>japonica</i> (Hort.)	2.50

	fr. c.
!* Sagittaria sagittifolia (L.)	2.50
* Salix , v. arbustes	
Saururus cernuus (L.)	1.50
! Saxifraga Hirculus (L.), <i>Saxifrage orangé</i>	1.50
!* Scirpus lacustris (L.), <i>Jonc des lacs</i>	1.50
» <i>maritimus</i> (L.)	1.50
» <i>sylvaticus</i> (L.)	1.50
! Sparganium ramosum (Hud.), <i>Rubanier</i>	1.—
! » <i>simplex</i> (Hud.)	1.—
Spiraea , v. pl.	
* Stratiotes aloides (L.), <i>Ananas d'eau</i>	2.50
Trollius , v. p. 70.	
!* Typha angustifolia (L.), <i>Massette à f. étroites</i>	1.—
!* » <i>latifolia</i> (L.), <i>M. à larges feuilles</i>	1.—
!* » <i>minima</i> (Hoppe), <i>M. miniature</i>	1.—
! Veronica Anagallis (L.)	0.50
! » <i>Beccabunga</i> (L.), <i>Beccabonde</i>	0.50
! Vaccinium Oxycoccus (L.)	1.50



Pontederia cordata.

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX :

100 plantes aquat. et palud.	fr. 50.—
50 » » » »	20.—
25 » » » »	10.—
12 » » » »	5.—

Plantes grimpantes

Les espèces marquées d'un * sont à feuilles persistantes.

	fr. c.
Actinidia callosa (Lindl.), <i>A. arguta</i>	2.50
» <i>polygama</i> (Franch. et Sav.)	2.50
* Akebia quinata (Desne)	1.—
* » <i>rosea</i> (Hort.)	1.—
Ampelopsis hederacea (Michx.), <i>Vierge</i>	0.50

	fr. c.
Ampelopsis hederacea , var. <i>muralis</i> , (var. plus fine et dont les rameaux fortement se grippent aux murailles)	0.50
» <i>heterophylla</i> (Blume)	1.—
» <i>serjaniæfolia</i> (Bunge), <i>Vitis serjan.</i>	1.50
» <i>Veitchi</i> (Hort.), <i>Vitis inconstans</i>	0.50

	fr. c.
Ampelopsis Veitchi var. <i>atropurpurea</i>	1.50
Apios tuberosa (Moench.)	1.—
Aristolochia Sipho (L'Hér.)	1.—
» <i>tomentosa</i> (Sims.)	2.50
Atragene , v. p. 10.	
Bignonia capreolata (L.), très belle esp. à fl. brun et jaune, à od. de café	1.50
V. en outre Tecoma.	
Bryonia dioica (Jacq.)	0.50
» <i>multiflora</i> (Boiss.)	1.50

Plantes très volubiles, propres à orner les buissons pauvres en verdure, les tonnelles, à l'ombre ou au soleil; leurs rameaux et leur feuillage sont gracieux; baies nombreuses, vermillon chez la première, jaunes chez la seconde, sont un bel ornement autumnal. Tubercule énorme.



Calystegia dahurica.

Calystegia dahurica (Fisch.), <i>Liseron vivace</i> à fl. roses	0.50
» <i>pubescens</i> fl. pl., <i>Liseron vivace</i> à fl. roses doubles	0.50
» <i>sylvatica</i> (Choisy), <i>Liseron vivace</i> à fl. blanches.	0.50
Celastrus scandens (L.),	1.—
Cucurbita perennis (A. Gray), <i>Courge vivace</i> du Mexique	5.—
Clematis æthusæfolia (Turcz.)	1.50
» <i>Buchaniana</i> (D. C.)	2.50
» <i>campaniflora</i> (Brot.)	1.50
» <i>coccinea</i> (Engelm.)	2.50
» <i>corymbosa</i> (Poir.)	1.50
* <i>flammula</i> (L.), <i>Clématite odorante</i>	1.—
» <i>fusca</i> (Turcz.)	2.50
» <i>glauca</i> (Willd.), à fleurs jaunes	1.50
» <i>graveolens</i> (Willd.), à fl. jaune citron	1.—
» <i>Heracleifolia</i> (D. C.)	2.50
» <i>Kousabotan</i> (Desne.)	2.50
» <i>lasiantha</i> (Fisch.)	2.50
» <i>ligusticifolia</i> (Nutt.)	1.—
» <i>montana</i> (Buch.), <i>Clématite odorante</i>	1.—
» » <i>v. grandiflora</i>	1.50
» <i>ochroleuca</i> (Ait.)	2.50
» <i>paniculata</i> (Thunb.)	2.50

	fr. c.
Clematis Pitcheri (Hort.)	1.50
» <i>Stans</i> (Sieb.-Zucc.)	2.50
» <i>verticillaris</i> (D. C.)	2.50
» <i>virginiana</i> (L.)	1.50
» <i>Vitalba</i> (L.), <i>Vouable</i> , <i>Vigne blanche</i>	0.50
» <i>viticella</i> (L.), à fl. violettes ou roses	0.50
» » <i>v. Kermesina</i> , à fl. rouges.	1.—

Les *Cl. montana* et *Vitalba*, à fl. blanches toutes deux, sont des pl. grimpantes de première valeur; elles croissent rapidement, surtout le *Vitalba* qui donne, tout l'été durant, de nombreuses fl. blanches, auxquelles succèdent de jolies graines plumeuses qui persistent en hiver. Elle atteint jusqu'à 10 m. de long.

Cocculus Thunbergii (D. C.)	2.50
Dioscoræa Batatas (Desne), <i>Igname de la Chine</i>	0.50

Pl. volubile à petites fl. très odorantes (juillet-sept.) et à très gros tubercule comestible.

Dioscoræa caucasica (Lipsky et Alboff)	5.—
---	-----

Pl. rarissime, très élégante, découverte dans les bois de l'Abchasie par Alboff, qui nous en a donné les graines; ombre ou mi-ombre.

» <i>japonica</i> (Thunb.)	2.50
» <i>pentaphylla</i> (L.)	2.50
» <i>quinqueloba</i> (Thunb.)	2.50
» <i>villosa</i> (L.)	2.50

* Euonymus radicans (S. Z.)	0.50
--	------

Fusain du Japon rampant, se prêtant parfaitement à l'usage des pl. grimpantes.

Glycine , v. <i>Wistaria</i>	
---	--

Hablitzia tamnoides (Bieb.)	1.50
--	------

* Hedera Helix (L.), <i>Lierre commun</i> (les douze 5 fr.)	0.50
--	------

» » <i>algeriensis</i> , <i>Lierre d'Alger</i>	0.50
--	------

Belle var. à très grandes feuilles, à croissance rapide.

» » <i>v. arborescens</i> , <i>Lierre en arbre</i>	1.50
--	------

» » <i>v. chrysocarpa</i> , à fruits jaunes	1.50
---	------

» » <i>v. conglomerata</i> , <i>Lierre aggloméré</i>	1.50
--	------

Petite pl. de rocailles, très curieuse, au port artistiquement ratatiné et au f. crispées.

» » <i>v. dentata</i>	1.50
---------------------------------	------

» » <i>v. digitata</i> , feuilles très fortement incisées	0.50
---	------

» » <i>v. gracilis</i> . F. prof. trilobées; tiges grêles	0.50
---	------

» » <i>v. hibernica</i> . <i>Lierre d'Irlande</i> , la douz. 5 fr.	0.50
--	------

» » <i>v. lobata</i> . F. découpées en 3-5 lobes	0.50
--	------

» » <i>v. luteola</i> . F. vert foncé, marginé jaune.	1.50
---	------

» » <i>v. marginata</i> . F. marginées de blanc et striées de rose et de rouge	1.50
--	------

» » <i>v. marmorata</i> . F. irrégul. maculées blanc.	1.50
---	------

» » <i>v. palmata</i> . F. profond. découpées en 3-5 lobes	0.50
--	------

» » <i>Rægneriana</i> . <i>Lierre du Caucase</i>	1.—
--	-----

F. très grandes, très belles; esp. très vigoureuse, à croissance rapide.

» » <i>v. sagittæfolia</i> . F. en forme de flèches	1.—
---	-----

» » <i>scutifolia</i> . F. arrondies-triangulaires	
--	--

» » <i>variegata</i> . <i>Lierre d'Irlande</i> à f. panachées	1.—
---	-----

	fr. c.
Humulus Lupulus (L.), Houblon	0 50
Ipomœa pandurata (Mey.), Volubilis vivace	5.—
C'est l'une des plus belles et des plus rares d'entre les pl. grimpantes; gros tubercule.	
Jasminum humile (L.)	1.—
» officinale (L.), Jasmin blanc	0 50
» v. affinis	1.—
Superbe jasmin à très grandes fl., à 5 ou 6 lobes, rose pourpre extér., très odor. et excessivement nombreuses; cette pl., qui atteint 7 et 8 mètres de haut, est infiniment supér. au type et mérite d'être cultivée partout; elle refleurit en août-sept. et constitue l'une des meill. décor. contre les murs. Soleil ou mi-soleil.	
Jasminum nudiflorum (L.), Jasmin jaune d'hiver	0 50
Fleurit tout l'hiver durant.	
Lathyrus latifolius (L.), Pois de senteur vivace	0 50
Lonicera aureo-reticulata (Hort.)	0 50
» Caprifolium (L.), Chèvrefeuille	0 50
» Chinensis (Wats.)	0 50
» ciliosa (Poir.)	2 50
» flava (Sims.)	1 50
» flexuosa (Thunb.), L. brachypoda	0 50
» gigantea (Hort.)	1 50
» Griffithii (Hook.)	2 50
» implexa (Ait.)	0 50
» japonica (Thunb.), voisin de Chinensis	0 50
» parviflora (Lam.)	1 50
» Periclymenum (L.), Chèvref. des bois	0 50
* sempervirens (L.), à fl. rouge vif	1.—
» v. Fuchsioides	1.—
» speciosa (Wendert)	0 50
Lycium barbarum (L.), Lyciet	0 50
» chinense (Mill.)	0 50
» v. inermis	0 50
» europæum (L.), Lyciet commun	0 50
Menispermum canadense (L.)	0 50
» dahuricum (D. C.)	0 50
Muehlenbeckia complexa (Meissn.)	1.—
Passiflora cœrulea (L.), Fleur de la Passion	1 50
Periplocca græca (L.), Vigne de soie	1.—
Pl. très volubile, à croissance rapide, à fl. brunes.	
Polygonum Baldschuanicum (Rgl.)	2 50
Pueraria Thunbergiana (Benth.), Kudzu des Japonais	2 50
Pl. superbe du Turkestan, parfaitement rustique et pouvant atteindre 5 ou 6 m. de haut.	
Rosa Alberti (Rgl.)	1 50
» arvensis (Huds.), Eglantine blanche	0 50
» Banksiæ (R. Br.), R. Banks à fl. simples, rare	2 50
» à fl. jaunes doubles	1.—
» Beggeriana (Schr.)	1.—
» blanda (Ait.), Eglantine d'Amérique	1.—
» canina (L.), Eglantine rose	0 50
» carolina (L.)	1.—
» centifolia (L.), Rose à cent feuilles	1.—
» cinnamomea (L.), Rose cannelle	1.—
» damascena (Mill.), Rose de Damas	1.—

	fr. c.
Rosa Eglanteria (L.), Rose capucine, Egl. rouge et jaune	1 50
» lutea, Eglantine jaune	1 50
» v. Harrisoni	2 50
» Fortuneana (Lam.), Eglantine du Japon	1 50
» Fortuniana (Hort. non Lam.), Rose de Fortune	1 50
» gallica (L.)	0 50
» lucida (Eberh.)	1.—
» lutea, v. R. Eglanteria	
» macrantha (Desf.), Eglantine à très grandes fl. roses; la plus belle de toutes	1.—
» moschata (Mill.), Rose mousseuse	1.—
» à fl. blanches	1.—
» multiflora (Thunb.), innombrables fl. blanches, auxquelles succèdent de très petits fruits rouge vif qui forment d'immenses panicules, du plus bel effet l'hiver	0 50
» Nutkana (Presl.)	1.—
» pomifera (L.)	1.—
» provincialis (Mill.), Rose de Provins	0 50
» repens (Scop.)	0 50
» rubiginosa (L.), Sweet briar des Anglais, feuillage fortement odorant et balsamique	0 50
» var. Crimson, à fl. vermillon	1.—
» rubrifolia (Vill.), à fl. violettes	1.—
» sempervirens (L.)	1.—
» sericea (Lindl.)	0 50
» Wichuriana (Crép.)	0 50

Tous ces Rosiers sont excellents pour établir des tonnelles ou garnir des murs.

Esp. très sarmenteuse, à croissance rapide, à longs sarments extrêmement élégants.

Variétés horticoles à 1 fr. la plante :

Aimé Vibert, Belle Lyonnaise, Céline Forestier, Chromatalla, Climbing Devoniensis (superbe var. américaine qui vaut le Maréchal Niel), Crimson Rambler, Gloire de Dijon, Lamarque, Mad. Alfred Carrière, Maréchal Niel, Reine Marie-Henriette, Rêve d'or	1 50
Rubus biflorus (Buch.)	1 50
» fœnicularius (Maxim.), Ronce du Japon	1.—
» hesperinus, nouvelle	2 50
* laciniatus (Hort.), Ronce à fl. lilas	0 50
Feuillage très fortement incisé.	
» leucodermis (Dougl.), à écorce bleu clair	0 50
» nutans (Wall.)	1.—
» spectabilis (Nutt.)	1.—

Var. horticoles fl. albo pl. et fl. roseo pleno, 1 fr.

Schizophragma hydrangeoides (S. et Z.)	1 50
* Smilax aspera (L.), Salsepareille	2 50
* excelsa (L.), Sals. du Caucase	2 50

	fr. c.
* <i>Smilax pseudosarsa</i> (Viv.)	2.50
* <i>sagittæfolia</i> (Lodd.)	2.50
Ces pl. sont d'entre les meill. des pl. grimp., à feuill. décoratif; elles sont superbes l'hiver; exposit. plutôt chaude; croissance rapide.	
<i>Tamus communis</i> (L.), <i>Tamier</i>	1.50
<i>Tecoma</i> (Bignonia) <i>grandiflora</i> (Lois.), <i>Bignone de Chine</i>	1.—
» <i>grandiflora</i> , v. <i>coccinea</i>	1.—
» <i>radicans</i> (Juss), <i>Jasmin trompette</i>	0.50
Excell. pl. grimp., aux fl. rouge vif (juillet-oct., très propres à garnir les murs des maisons ou les tonnelles.	
<i>Vitis æstivalis</i> (L.)	1.—

	fr. c.
<i>Vitis Coignetiae</i> (Pugnat)	1.—
» <i>cordifolia</i> (Lam.)	0.50
» <i>orientalis</i>	0.50
<i>Wistaria chinensis</i> (D. C.), <i>Glycine</i>	1.50
» à fl. blanches.	2.50
» à fl. doubles.	2.50
» <i>frutescens</i> (D. C.), <i>Glycine en arbre</i>	2.50
» <i>multijuga</i> (Sieb.)	2.50

A NOTRE CHOIX :

100 pl. grimpantes, fr. 40.—	
50	20.—
25	10.—
12	5.—

Arbustes et arbres d'ornement rustiques sous le climat de Genève.

Nous avons commencé, dans notre propriété de *Floraire*, à établir une pépinière d'arbustes rares ou peu connus et même d'arbustes et d'arbres ordinaires. Nous en publierons la liste plus tard. Celle que nous donnons ici comprend plus spécialement les espèces propres à décorer les jardins pittoresques et les grands rochers. Elle comprend aussi un certain nombre d'espèces rares que nous collectionnons depuis quelques années et avons reçu des sources les plus autorisées. D'ailleurs nos espèces sont contrôlées et identifiées dès qu'elles fleurissent.

Les espèces basses et propres à garnir les rochers sont marquées d'un * et celles dont les feuilles sont persistantes sont marquées d'un !.

	fr. c.
<i>Abelia triflora</i> (R. Br.), à f. caduques	1.50
*! » <i>uniflora</i> (R. Br.), à f. persistantes	1.50
Le premier est un arbre de 2 à 3 m., se couvrant littéral., de mai à fin juillet, de fl. roses et très odorantes.	
<i>Acanthopanax ricinifolia</i> (Planch.)	1.50
<i>Acer cratægifolium</i> (S. Zucc.)	2.50
» <i>Ginnale</i> (Maxim.)	1.50
» <i>japonicum</i> (Thunb.), <i>Erable du Japon</i>	2.50
» <i>negundo californicum</i>	2.50
» <i>rufinerve</i> (S. Zucch.)	2.50
» <i>saccharinum</i> (L.), <i>Erable à sucre</i>	1.50
<i>Alnus glutinosa</i> (Medic.), <i>Aulne gluti-</i> <i>neux</i>	1.50
» <i>incana</i> (Willd.)	1.—
» <i>Oregana</i> (Nutt.)	1.50
» <i>rhombifolia</i> (Nutt.)	1.50
» <i>rubra</i> (Boug.)	2.50
» <i>serrulata</i> (Willd.), <i>Aulne du Canada</i>	2.50
» <i>viridis</i> (D. C.), <i>Aulne commun</i>	1.—
<i>Amelanchier alnifolia</i> (Nutt.), <i>Aronia</i> <i>alnif.</i>	2.50
» <i>canadensis</i> (Medik.), <i>Amélanchier à</i> <i>grappes</i>	1.50
» <i>vulgaris</i> (D. C.), <i>Aronia rotundifolia</i> ; <i>Arbre aux Edelweiss</i>	1.—
<i>Amorpha fruticosa</i> (L.)	0.50
* <i>Amygdalus nana</i> (L.) <i>Pêcher nain de Tar-</i> <i>tarie</i>	2.50
<i>Anona triloba</i> (L.)	2.50

	fr. c.
<i>Arctostaphylos</i> (<i>Arbutus</i>) <i>alpina</i> (Sprgl.)	2.50
*! » <i>Uva Ursi</i> (Sprgl.), <i>Raisin d'ours</i>	1.50
* <i>Artemisia abrotanum</i> (L.), <i>Aurone</i>	0.50
<i>Atraphaxis</i> (<i>Polygonum</i>) <i>buxifolia</i> (Jaub.)	2.50
* » <i>Billardieri</i> (Jaub.)	2.50
*! <i>Atriplex canescens</i> (James), <i>Arroche</i> <i>grisâtre</i>	2.50
! » <i>halinus</i> (L.), <i>Pourpier de mer</i>	1.—
! <i>Aucuba himalaica</i> (Hook.)	1.50
! » <i>japonica</i> (L.), plantes d'ombre	1.50
Les variétés horticoles à 1 fr. 50.	
! <i>Baccharis halimifolia</i> (L.), <i>Senecion en</i> <i>arbre</i>	1.—
*! » <i>patagonica</i> (H. G.) <i>Senecion patagon</i>	1.—
*! » <i>salicina</i> (Torr. Gr.)	1.50
! <i>Berberis aquifolium</i> (Pursh), <i>Mahonia</i> » <i>aristata</i> (D. C.)	1.—
» <i>buxifolia</i> (Lam.), <i>B. dulcis</i>	2.50
! » <i>Darwini</i> (Hook.)	2.50
*! » <i>ilicifolia</i> (Forst.)	2.50
» <i>Lycium</i> (Royle)	2.50
» <i>Neuberti</i> (Hort.)	1.—
! » <i>pruinosa</i> (Franch.)	2.50
*! » <i>stenophylla</i> (Hort.)	1.—
* » <i>Thunbergii</i> (D. C.)	2.50
» <i>umbellata</i> (Wall.)	2.50
» <i>virescens</i> (Hook.), <i>Epine vinette de</i> <i>l'Himalaya</i>	1.—
» <i>vulgaris</i> (L.), <i>Epine vinette</i>	1.—

	fr. c.
Betula alba (L.), <i>Bouleau blanc</i>	1.—
» alpestris (Fries.), <i>B. du Groënland</i>	2.50
» carpathica (W. K.)	2.50
» corilifolia (Rgl.), <i>B. du Japon</i>	2.50
» fruticosa (Pall.), <i>B. de Sibérie</i>	2.50
» lenta (L.)	2.50
» lutea (Mich.)	2.50
» microphylla (Bunge)	2.50
* nana (L.), <i>Bouleau nain</i>	1.50

L'un des meill. et des plus gracieux arbustes de rocailles.

» occidentalis (Hook.)	2.50
» papyracea (Ait.), <i>B. à canots</i>	1.—
» pubescens (Ehrh.)	2.50
» pumila (L.), <i>Bouleau bas</i>	2.50
» ulmifolia (S. Zucch.)	2.50
» utilis (Don.)	2.50
» verrucosa (Ehrh.)	2.50
Budleya japonica (Hemsl.), <i>B. curviflora</i>	0.50
» Lindleyana (Fort.)	0.50
» variabilis (Hemsl.)	0.50

Très bel arbuste à fl. lilas, violet et or ou bronze, en grappes allongées, très parfumé et fleurissant de juin jusqu'en hiver.



Budleya variabilis.

!* Bupleurum fruticosum (L.), <i>Oreille de lièvre</i>	1.—
!* Buxus sempervirens (L.), <i>Buis</i>	1.—
Cæsalpinia japonica (S. Zucc.)	2.50
* Calycanthus floridus (L.), <i>Arbre aux Anémones</i>	1.—
» occidentalis (Hook.)	1.—
» præcox , v. <i>Chimonanthus</i>	1.—
Caragana altagana (Poir.)	1.—
» aurantiaca (Kœne.)	1.—
» Chamlagu (Lam.)	1.50
* pygmæa (D. C.)	1.—
Carpinus caroliniana (Walt.), <i>Charme d'Amérique</i>	1.50

* Carpinus japonica (Blume)	1.50
* Caryopteris mastacanthus (Schauer)	0.50

Charm. arbuste chinois, se couvrant, en automne, de fl. bleues.



Cassia marylandica.

Cassia marylandica (L.)	1.50
Celtis Audibertiana (Spach.)	2.50
» Caucasica (Willd.), <i>Micoucoulier du Caucase</i>	2.50
» sinensis (Pers.), <i>M. de Chine</i>	2.50
» Tournefortii (Lam.)	2.50
Cephalanthus occidentale (L.)	1.50
Cerasus Padus (L.), <i>Cerisier à grappes</i>	0.50
* Cercidiphyllum japonicum (S. Zucc.)	2.50
Cercis canadensis (L.), <i>Gainier du Canada</i>	1.50
» siliquastrum (L.), <i>Arbre de Judée</i>	1.—
* Cercocarpus parvifolius (Nutt.)	2.50
Chænomeles japonica (Lindl.), <i>Poirier du Japon</i>	1.—
* Chamæbathiararia millefolium (Maxim.)	5.—
Chamæcerasus , v. <i>Lonicera</i>	
!* Choisya ternata (H. B.)	1.50
!* Cistus ladaniferus (L.)	1.50
!* laurifolius (L.)	1.50

Les seuls Cistes rustiques chez nous ; très belles fleurs.

Citrus trifoliata (L.), <i>C. triptera</i> , <i>Citronier du Japon</i>	1.—
Cladrastis amurensis (Bent. Hook.)	2.50
» Tashiroi (Jatabe)	5.—
Clematis Davidiana (Decne)	0.50
* tubulosa (Turcz.)	0.50
Clerodendron foetidum (Bunge)	1.—
» trichotomum (Thunb.)	2.50
Colutea arborescens (L.), <i>Baguenaudier</i>	1.—
» cruenta (Ait.)	1.—
» melenocalyx (Boiss.)	2.50
» orientalis (Lam.)	1.—
Corchorus , v. <i>Kerrya</i>	
* Coriaria japonica (A. Gr.)	2.50
* myrtifolia (L.), <i>Redoul., Corroyère</i>	1.—
» nepalensis (Wall.)	2.50

	fr. c.
Cornus Amomum (Mill.)	2.50
» Baylei	2.50
» canadensis (L.)	2.50
» candidissima (Mill.)	2.50
» sanguinea (L.)	0.50
» sibirica (Lodd.)	1.—
» stolonifera (Mich.)	1.—
» » v. à bois jaune (très beau)	2.50
Coronilla Emeroides (Boiss.)	2.50
» Emerus (L.), <i>Coronille Scorpion</i>	0.50
Corylopsis spicata (S. Zucc.)	2.50
Cotoneaster acuminata (Lindl.)	1.—
» bacillaris (Wall.)	1.—
! » buxifolia (Wall.)	1.—
! » frigida (Wall.)	1.—
* » horizontalis (Desne), <i>C. Davidiana</i>	1.—
L'un des meill. arbust. de rocailles; branches étalées et se couvrant de baies rouges l'hiver.	
! » microphylla (Wall.)	1.—
» nummularia (Fisch.)	1.—
* » pannosa (Franch.)	1.—
! » rotundifolia (Lindl.)	1.—
! » thymifolia (Hort.)	1.—
* » tomentosa (Lindl.), <i>Cotonier</i>	1.—
* » vulgaris (Lindl.), <i>Cotonier commun</i>	1.—
Crataegus Crus Galli (L.), <i>Ergot de coq.</i>	1.—
» melanocarpa (Bieb.)	1.—
» pyracantha (Pers.), <i>Buisson ardent</i>	1.—
» rivularis (Nutt.)	1.—
Cytisus Adami (Hort.), <i>Cytise rose</i>	1.—
» albus (Link.)	1.—
» alpinus (Mill.), <i>Cytise des Alpes</i>	1.—
» » v. <i>autumnalis</i>	2.50
» austriacus (L.)	1.—
» biflorus (L'Hér.)	1.—
» capitatus (Jacq.), <i>Cytise en bouquets</i>	1.—
» caramanicum (Hook.)	2.50
» ciliatus (Wahl.), <i>C. des Carpathes</i>	1.—
» hirsutus (L.)	1.—
» Laburnum (L.), <i>Cytise; pluie d'or</i>	1.—
* » purpureus (Scop.)	1.50
* » » à fl. blanches	2.50
* » Schickænsis (Dieck), <i>C. de Schipka</i>	1.50
Esp. naine à fl. blanches.	
* » sessilifolius (L.)	2.50
» triflorus (L'Hér.)	1.50
* » Watereri (Wetst.)	2.50
» Weldenii (Vis.)	1.—
Daphne alpina (L.)	1.50
* » Blagayana (Frey.)	1.50
* » caucasica (Pall.)	2.50
! » cneorum (L.), <i>Daphne du Marchairuz</i> ou <i>Thymélée des Alpes</i>	2.50
C'est le plus bel arbuste rampant qu'il soit possible de cultiver; touffes serrées et toujours vertes; fl. rose vif, nombreuses (avril-mai) et très parfumées; soleil; rocaille ou pl. t. dans un sol lourd et compact.	
» » v. pl. <i>major</i> (Hort)	5.—
» » v. à fl. blanches	10.—
! » collina (Smith.)	2.50
* » Genkwa (S. Zucc.), <i>Thymélée du Japon</i>	5.—
» Gnidium (L.), <i>Garou; sainbois</i>	2.50

	fr. c.
! » Gnidium Fortunei (Benth.)	2.50
! » Laureola (L.), <i>Laurier des bois; Lauréole</i>	1.—
* » Mezereum (L.), <i>Bois-gentil</i>	1.—
» » à fl. blanches	2.50
» » à fl. doubles	2.50
! » odora (Thunb.)	2.50
! » oleoides (L.)	5.—
! » petraea (Leyb.), <i>D. rupestris</i>	5.—
! » pontica (L.), <i>Lauréole d'Orient</i>	2.50
* » Sophia (Kolen.), rare esp. ouralienne	10.—
! » striata (Tratt.)	5.—
! » Verloti (Gren. Godr.)	5.—
Daphniphyllum macropodium (Miq.)	5.—
Desmodium canadense (D. C.)	1.—
» laburnifolium (D. C.)	2.50
» penduliflorum , v. <i>Lepedeza bicolor</i>	
Deutzia corymbosa (R. Br.)	2.50
» crenata (Sieb.)	1.50
» » v. <i>plenissima</i>	1.50
» discolor (Heubl.), v. <i>purpurascens</i> (Franch.)	2.50
* » gracilis (Sieb.)	1.50
* » parviflora (Bunge)	1.50
» straminea (R. Br.)	2.50
Diervillea japonica (D. C.)	2.50
» sessilifolia (Buckl.)	2.50
» trifida (Moench), <i>D. canadensis</i>	2.50
Diospyros Lotus (L.)	1.—
» virginiana (L.)	1.—
! » Diplaccus glutinosus (Nutt.)	2.50
Dirca palustris (L.), <i>Bois de cuir; b. de plomb</i>	2.50
* » Discaria longispina (Miers.)	5.—
* » Dorycnium gracile (Jord.)	2.50
* » latifolium Willd.)	2.50
* » suffruticosum (Vill.)	1.—
* » Edgeworthia Gardneri (Meissn.), <i>E. chrysantha</i>	5.—
Elæagnus angustifolia (L.), <i>Olivier de Bohême; Chalef</i>	1.—
» argenteus (Pursh.), <i>Gatillier argenté</i>	1.50
» longipes (A. Gr.), <i>Chalef américain</i>	2.50
» reflexa (Morr.)	1.50
» umbellata (Thunb.)	1.50
! » Empetrum nigrum (L.), <i>Camarine</i>	1.50
! » » rubrum (Wahl.)	2.50
! » Epheda altissima (Desf.)	2.50
! » » americana (H. B.)	2.50
! » » andina (Poepp)	2.50
! » » distachya (L.)	2.50
! » » fragilis (L.)	2.50
! » » helvetica (C.-A. May)	2.50
! » » monostachya (L.)	2.50
! » » viridis (Coville)	5.—
! » Epigæa repens (L.)	2.50
Erica , v. p. 22.	
! » Eriobothrya japonica (Lindl.), <i>Néflier du Japon</i>	1.—
! » Escalonia macrantha (Hook.)	1.50
Eurybia , v. <i>Olearia</i>	
! » Euonymus Bungeanus (Maxim.)	2.50

	fr. c.
Euonymus europæus (L.), <i>Bois carré</i> ;	
<i>Fusain d'Europe</i>	1. —
» » à fruits blancs	2. 50
!* filiformis (Wall.), <i>Fusain effilé</i>	1. —
Excellent pour les rocailles.	
! » japonicus (L.), <i>Fusain du Japon</i>	0. 50
» » var. diverses	1. —
!* nanus (Bieb.)	1. —
» » v. <i>pulchellus</i>	1. —
!* oxyphyllus (Miq.)	2. 50
!* radicans (S. Zucc.)	1. —
Exochorda Alberti (Rgl.)	1. —
» grandiflora (Lindl.)	1. 50
Fagus americana (Sweet), <i>Hêtre d'Amérique</i>	1. 50
» asiatica (D. C.), <i>Hêtre asiatique</i>	5. —
!* Fontanesia Fortunei (Carr.)	1. 50
!* phylliræoides (Labill.)	1. 50
» » v. <i>nana</i>	2. 50
* Forsythia europæa (Baldacci)	2. 50
Espèce nouvelle, du Montenegro, très intéressante.	
Fraxinus americana (L.), <i>Frêne d'Amérique</i>	1. 50
» Bungeana (D. C.), <i>F. de Chine</i>	1. 50
» dimorpha (Coss.), <i>F. de l'Himalaya</i>	2. 50
» platycarpa (Mich.), <i>F. de la Caroline</i>	1. 50
» pubescens (Lam.)	1. 50
» velutina (Torr.), <i>F. de Californie</i>	1. 50
» viridis (Mich.)	1. 50
! Garrya elliptica (Dougl.)	5. —
Gaultheria , v. p. 25.	
!* Genista anglica (L.)	2. 50
* » decumbens (Ait.), <i>G. Halleri</i>	2. 50
!* » germanica (L.), <i>Genêt d'Allemagne</i>	1. —
!* » horrida (D. C.), <i>G. hérisson</i>	1. 50
» » junceae (Lam.), <i>Genêt à balais</i>	1. —
!* » pilosa (L.), <i>G. velu</i>	1. —
* » » radiata (Scop.), <i>G. rayonné</i>	1. —
!* » sagittalis (L.), <i>G. ailé</i>	0. 50
» Scoparia (Lam.)	1. 50
» » var. <i>Andreana</i>	1. 50
Très belle var., à fl. rouge et jaune, trouvée il y a quelques années dans le jardin d'une cure de Bretagne.	
» sibirica (L.), <i>G. de Sibérie</i>	1. —
!* tinctoria (L.), <i>G. épineux ou des teinturiers</i>	1. —
» » à fl. pleines	2. 50
!* triquetra (Lam.), <i>très rare</i>	5. —
Ces Genêts sont des pl. excell. pour la décor. des grands rochers et des jardins; leurs fl. extrêmement voyantes, d'un jaune ardent, se succèdent pendant tout l'été. Il leur faut le soleil. Le G. Scoparius (<i>Sarothamnus Scop.</i>) craint la chaux.	
Gleditschia japonica (Miq.)	2. 50
Gymnocladus canadensis (Lam.), <i>Bonduc</i>	2. 50
Glycyrrhiza foetida (L.)	1. —
» glabra (L.), <i>Régisse officinale</i>	1. —
Halesia corymbosa (Nichols.), <i>Flocons de neige</i>	2. 50
» tetraptera (L.)	2. 50

	fr. c.
Halimodendron argenteum (Fisch.)	2. 50
* Hedysarum multijugum (Maxim.)	1. —
L'une des plus belles introductions de ces dernières années; fl. carmin très vif, en grappes (juin-octobre); arbuste formant une touffe de 1 m. 50.	
Heimia , v. <i>Nesæa</i> .	
!* Helianthemum (<i>Rock rose</i> des Anglais, <i>Rose des Rocailles</i> .)	0. 50
Ce sont les plus gracieux, les plus jolis, les plus saxatiles d'entre les arbustes traînants et les meilleurs pour garnir les rochers; ils étalent leurs rameaux élég., garnis de f. persistantes, et qui se couvrent, de mai en juillet, puis de sept. en oct., de fleurs à l'aspect de petites Eglantines, blanches, jaune vif ou pâle, rose, rouge vif, carmin, vermillon, jaune et rouge, etc., à corolle simple ou pleine. Ce sont les plus solides d'entre les sous-arbrisseaux; ils réussissent partout, mais préf. le soleil, vont à la haute montagne comme au Midi de la France et sont de la meilleure composition possible. On ne saurait trop les recommander soit comme pl. de rochers soit pour des bordures ou pour garnir des talus arides et ensoleillés. V. pl.	
Hippophaë rhamnoides (L.), <i>Argousier, Grisot</i>	1. —
Arbuste touffu, à verd. grisâtre-argentée, à baies rouge brique, très artistique dans ses formes et élégant dans ses couleurs.	
Hydrangea arborescens (L.)	1. 50
» paniculata (Sieb.)	2. 50
* Hypericum Androsæum (L.), <i>Toute sainte</i>	0. 50
* » aureum (Bart.)	1. 50
Très bel arbuste bas se couvrant de milliers de fl. jaunes tout l'été.	
*! » calycinum (L.), <i>Barbe d'Aaron</i>	0. 50
* » densiflorum (Pursh)	1. —
* » elatum (Ait.)	1. 50
* » galioides (Lam.)	1. 50
* » Hookerianum (Arnh.)	1. 50
* » Hircinum (L.)	0. 50
* » Kalmianum (L.)	1. 50
* » Moserianum (Hort.), fl. jaunes, grandes, à anthères rouges	1. —
* » patulum (Thunb.)	1. —
* » prolificum (L.)	1. 50
Hyssopus , v. p. 33.	
Idesia polycarpa (Maxim.)	2. 50
Ilex crenata (Thunb.), <i>Houx du Japon</i>	5. —
! » monticola (A. Gr.)	5. —
! Illicium anisatum (L.)	5. —
* Indigofera decora (Lindl.)	2. 50
» dosua (Ham.)	1. —
Itea virginica (L.)	2. 50
Jasminum , v. p. 122.	
Juglans Sieboldiana (Maxim.), <i>Noyer du Japon</i>	5. —
!* Juniperus communis (L.), <i>Genièvre</i>	1. —
!* » nana (Willd.)	1. 50
!* » sabina (L.), <i>Sabine de Zermatt</i>	1. 50
L'une des plus belles décor. de roc., très solide et rampant sur le sol ou entre les pierres.	
Kadsura japonica (Juss.)	2. 50

	fr. c
* Kerria japonica (D. C.), <i>Corète; Chorchorus</i>	0.50
Le type, à fl. simples, d'un jaune orangé vif, que nous offrons ici, est une pl. rare dans les jardins et très belle.	
Kœhlreuteria paniculata (Laxm.), <i>Savonnier</i>	1.—
» japonica (Hassk.)	2.50
Lagerstrœmia indica (L.)	2.50
Très bel arbriss. à fl. rose-carmin vif.	
Larix dahurica (Lam.), <i>Mélèze de Chine</i>	1.50
» leptolepis (Endl.), <i>M. du Japon</i>	1.50
» occidentalis (Nutt.), <i>M. d'Amérique</i>	1.50
Laurus nobilis (L.)	1.—
Lavandula , v. p. 37.	
Lespedeza bicolor (Turcz.), <i>Desmodium penduliflorum</i>	1.50
» Buergeri (Miq.)	1.50
» junceae (Pers.), v. <i>sericea</i>	2.50
» trichocarpa (Pers.)	2.50
» virgata (D. C.)	2.50
Leycesteria formosa (Wall.)	2.50
Ligustrina amourensensis (Rupr.), <i>Syringa Amurensis</i>	2.50
» Pekinensis (Rgl.), <i>S. Pekinensis</i>	2.50
Ligustrum Iboia (Sieb.)	1.50
*! » japonicum (Thunb.)	1.50
! » lucidum (Ait.)	1.50
» medium (Franch.)	1.50
» Quihoni (Carr.)	1.50
! » obtusifolium (S. Zucc.)	1.50
! » ovalifolium (Hauusk.)	1.50
! » sinense (Lour.)	1.50
Limonia , v. <i>Citrus</i> .	
! Lindera Benzoin (Meissn.)	2.50
! » strychnifolia (Villar.)	5.—
Liquidambar styraciflora (L.)	1.50
Lithospermum , v. p. 39.	
* Lonicera alpigena (L.), <i>Chèvrefeuille des Alpes</i>	1.—
» » v. <i>nana</i>	2.50
* » cærulea (L.), <i>Ch. bleu</i>	1.—
» chrysantha (Turcz.), <i>Ch. doré</i>	1.—
» depressa (Royle), <i>Ch. de l'Himalaya</i>	1.—
» fragrantissima (Lindl.), <i>Ch. très odorant</i>	1.—
» gibbosa (Willd.)	1.—
» hispida (Pall.)	1.—
* » involucrata (Banks), <i>L. Ledebouri</i>	1.—
» Karelini (Bunge)	1.—
» Kirilowi (Hort.)	1.—
» macrantha (Spreng)	1.—
» Morrowi (A. Gr.)	1.—
» nigra (L.)	1.—
* » pyrenaica (L.), très rare	2.50
* » rupicola (Hook.)	1.—
» tatarica (L.), <i>Ch. de Tartarie</i>	1.—
» » à fl. blanches	1.—
» translucens (Zabel).	1.—
Pour les esp. grimpantes, v. p. 122.	
Lycium , v. p. 122.	
Maclura aurantiaca (Nutt.), <i>Oranger des Osages</i>	1.—

	fr. c.
Mahonia , v. <i>Berberis</i> .	
Milletia japonica (A. Gr.)	5.—
Muehlenbeckia , v. p. 114.	
! » Myrica carolinensis (Mill.)	2.50
! » Californica (Chem.)	2.50
! » Cerifera (L.), <i>Cirier, arbre à cire</i>	2.50
* » Myricaria dahurica (Ehrb.), <i>Tamarix de Sibérie</i>	1.50
* » germanica (Desv.), <i>Myricaire</i>	1.50
Neillia (Spiræa) amurensis (Benth.)	0.50
» Torreyi (Watts.)	0.50
* Nesaea (Heimia) myrtifolia (Schl.)	1.50
* » salicifolia (H. B. et K.)	1.50
* » syphilitica (Steud.)	1.50
Nevusia alabamensis (A. Gr.)	1.50
Nuttallia cerasiformis (Torr. Gr.)	1.50
Nyssa aquatica (Curt.)	2.50
» multiflora (Wangenh.)	2.50
» uniflora (Wangenh.)	2.50
! » Olearia Gunniana (Hook.)	2.50
! » Haasti (Hook.)	2.50
* Ononis cenisia (L.)	2.50
* » fruticosa (L.)	1.50
* » Natrix (L.)	1.—
* » rotundifolia (L.)	1.—
! » Osmanthus aquifolius (Sieb.)	1.50
Ostrya carpinifolia (Scop.), <i>Ostrier</i>	1.50
» virginica (Willd.)	1.50
Pachysandra , v. p.	
Paliurus aculeatus (Lam.), <i>Argalou</i>	1.50
Pavia macrostachya (Lois.), <i>Pavie blanc</i>	1.50
Peraphyllum ramosissimum (Nutt.)	1.50
* Petalostemon candidus (Mich.)	1.50
* » tenuifolius (A. Gr.)	1.50
Phellodendron amurense (Rupr.)	2.50
» Japonicum (Maxim.)	5.—
Philadelphus grandiflorus (Willd.), <i>Citronnelle à gr. fleurs</i>	1.50
» Lewisii (Pursh.)	1.50
» microphyllus (A. Gr.)	1.50
» Satzumi (Sieb.)	1.50
» tomentosus (Don)	1.50
! Photinia glabra (Desn.)	2.50
! » Phillyrea angustifolia (L.)	2.50
* » latifolia (L.)	2.50
! Pinus Cembro (L.), <i>Pin d'Arole, de 1 à 5 fr.</i>	
! » Pumilio (Hænke)	5.—
Platycaria strobilacea (S. Zucc.)	5.—
Polygala , v. p. 48.	
Potentilla fruticosa (L.), <i>Potentille en arbre</i>	1.—
» Fridrichseni (dahurica × fruticosa)	5.—
Prunus maritima (Wangenh.)	2.50
» serotina (Ehrh.)	2.50
» virginiana (L.)	2.50
Psoralea , v. p. 115.	
Pterocarya caucasica (C.-A. Mey.)	1.50
» rhoifolia (S. Zucc.)	5.—
Nouvelle introduction du Japon.	
* Purshia tridentata (D. C.)	5.—
Pyrus alpina (Willd.)	1.—
» arbutifolia (L.), f. écarlates à l'automne	1.—
» Aria , v. <i>Græca</i> et <i>P.-A.</i> , v. <i>latifolia</i>	1.—



Pin d'Arole dans les Alpes.

	fr. c.		fr. c.
Pyrus baccata (L.)	1. —	Rhamnus carniolica (Kern.)	1. —
» » v. <i>aurantiaca</i> , <i>costata</i> , <i>lutea</i> , <i>macrocarpa</i> et <i>sanguinea</i>	1. —	» Chlorophora (Desne)	2 50
» betulæfolia (Bunge)	1. —	» costata (Maxim.)	2 50
» canescens (Spach)	1. —	» crenatus (S. Zucc.)	2 50
» floribunda (Lindl.)	1. —	» dahuricus (Pall.)	1. —
» longipes (Coss.)	1. —	» Erythroxylum (Pall.)	1. —
» Maulei (Mast.)	1. —	» Frangula (L.)	1. —
» Michauxi (Bosc.)	1. —	» grandifolia (Fisch.)	1. —
» nigra (Sargent)	1. —	» japonica (Maxim.)	2 50
» parviflora (Desf.)	1. —	» lanceolata (Pursh.)	1. —
» prunifolia (Willd.)	1. —	» Pallasii (Fisch.)	1. —
» Ringo (Wenzig)	1. —	* » pumila (L.)	1. —
» salicifolia (Pall.)	1. —	» punctata (Boiss.)	1. —
» Sieboldi (Rgl.), <i>P. Toringo</i>	1. —	» rupestris (Scop.)	1. —
» Sikkimensis (Hook.)	1. —	» sinensis (Ser.)	1. —
» sinensis (Lindl.)	1. —	» tinctoria (W. K.)	1. —
» sinaica (Dum.)	1. —	» utilis (Desne)	1. —
» Sudetica (Tausch.)	1. —	Rhododendron , v. p 54.	
» suecica (Rehl.)	1. —	Rhodotypos Kerrioides (S. Zucc.)	0 50
Ces poiriers sauvages ont leurs feuillages rougissant plus ou moins à l'automne; chez les esp. américaines ce phénomène est très accusé et dure plus d'un mois.		Rhus aromatica (Ait.)	1. —
Punica Granatum (L.), <i>Grenadier</i>	2 50	» Cotinus (L.), v. <i>atropurpureus</i>	1 50
Quercus , v. p 115.		» radicans (L.)	1. —
! Rhamnus alaternus (L.)	1. —	» semialata (Murr.), v. <i>Osbeckii</i>	2 50
» alnifolia (L'Hér.)	1. —	» succedanea (L.), v. <i>Japonica</i>	2 50
» alpina (L.)	1. —	» sylvestris (S. Zucc.)	2 50
		» Toxicodendron (L.)	0 50
		» trichocarpa (Miq.)	2 50
		» trilobata (Nutt.)	1. —
		» vernificera (D. C.)	2 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Ribes alpinum</i> (L.), <i>Groseille des Alpes</i>	0.50	<i>Ruscus Hypophyllum</i> (L.), <i>Myrte épineux</i>	
» <i>aureum</i> (Pursh.), <i>G. dorée</i>	0.50	» <i>racemosus</i>	1.—
» <i>Burajense</i> (Schmidt.)	5.—	* <i>Salix cæsia</i> (Vill.)	1.—
» <i>cereum</i> (Dougl.)	1.—	* » <i>glabra</i> (Scop.), <i>Saule glabre</i>	1.—
» <i>ciliatum</i> (H. B.)	2.50	* » <i>glaucæ</i> (L.)	1.—
» <i>diacantha</i> (Pall.)	1.—	* » <i>Grahami</i> (Borr.)	1.—
» <i>divaricatum</i> (Dougl.)	2.50	* » <i>Helvetica</i> (Vill.)	1.—
» <i>glutinosum</i> (Benth.)	2.50	* » <i>Herbacea</i> (L.), <i>Saule nain</i>	1.—
» <i>gracile</i> (Michx.)	1.—	* » <i>Herbacea</i> × <i>maxima</i>	1.—
» <i>heterotrichum</i> (C. A. Mey.)	1.—	* » <i>lanata</i> (L.)	1.—
» <i>laxiflorum</i> (Dougl.)	1.—	» <i>phyllicifolia</i> (L.)	1.—
» <i>Menziesii</i> (Pursh.)	1.—	* » <i>polaris</i> (Wahl.)	1.—
» <i>mogolicum</i> (Greene), nouveau	2.50	» <i>purpurea</i> (L.)	1.—
» <i>niveum</i> (Lindl.)	1.—	* » <i>reticulata</i> (L.), <i>Saule rampant</i>	1.—
» <i>petræum</i> (L.)	1.—	* » <i>retusa</i> (L.), <i>Saule des Alpes</i>	1.—
» <i>Rœzlii</i> (Rgl.)	2.50	* » <i>serpyllifolia</i> (Scop.)	1.—
» <i>rotundifolium</i> (Michx.)	1.—	Les S. herbacea, reticulata et retusa sont les plus délicieuses miniatures de Saules qu'il soit possible de s'imaginer; leurs rameaux étalés et plaqués sur le sol ou les pierres sont garnis d'un élégant feuillage qui est une jolie décoration pour les rocailles.	
» <i>sanguineum</i> (Pursh.), <i>Ribes rose</i>	1.—	<i>Sambucus canadensis</i> (L.)	1.—
<i>Robinia neo-mexicana</i> (A. Gr.)	1.—	» <i>Ebulus</i> (L.), <i>Hièble</i>	1.—
<i>Rosa Alberti</i> (Rgl.)	1.—	» <i>nigra</i> (L.), <i>Sureau commun</i>	0.50
» <i>alpina</i> (L.), <i>Eglantine des Alpes</i> ; <i>Rose sans épines</i>	1.—	» <i>púbens</i> (Michx.)	1.—
Fl. carmin très vif, très odorantes; tiges dépourvues d'aiguillons.		» <i>racemosa</i> (L.), <i>Sureau corail</i>	1.—
» <i>altaica</i> (Willd.)	1.—	<i>Santolina</i> , v. p. 55.	
» <i>Beggeriana</i> (Schrenk.)	1.—	<i>Sarcobatus vermiculatus</i> (Torr.)	2.50
» <i>cinnamomea</i> × <i>rugosa</i>	1.—	<i>Sarthamnus</i> , v. <i>Genista</i> .	
» <i>dalmatica</i> (L.)	1.—	* <i>Schizophragma hydrangeoides</i> (S. Zucc.)	2.50
» <i>Eglanteria</i> (L.), <i>Rose capucine</i> ; <i>Austrian briar des Anglais</i>	1.—	<i>Securinega fluggeoides</i> (Mull.)	2.50
» » v. <i>Harissonii</i>	2.50	» <i>japonica</i> (Miq.)	2.50
» <i>Iberica</i> (Ster.)	1.—	» <i>ramiflora</i> (Mull.)	2.50
» <i>indica</i> (L.), type à fl. simples	2.50	* <i>Skimmia fragrans</i> (Lindl.)	1.—
» <i>Lawrenciana</i> (Hort.), à fl. minuscules	1.—	* » <i>japonica</i> (Sieb.)	1.—
» <i>macrantha</i> (Desf.), <i>Eglantine à très grandes fl.</i>	1.—	* » <i>oblata</i> (Lindl.)	1.—
* » <i>microphylla</i> (Roxb.), vrai	1.—	* » <i>rubella</i> (Hort.)	2.50
* » <i>pimpinellifolia</i> (L.), <i>Eglantine blanche</i>	1.—	<i>Smilax</i> , v. p. 66.	
» » à fl. semi doubles	1.—	<i>Sophora flavescens</i> (Ait.)	2.50
» <i>polyantha</i> (Roess.)	1.—	» » v. <i>galegoides</i>	2.50
» <i>pyrenaica</i> (Gouan.)	1.—	» <i>japonica</i> (L.), type	1.—
* » <i>repens</i> (Scop.)	0.50	<i>Sorbus aucuparia</i> (L.), <i>Sorbier des oiseaux</i>	0.50
» <i>rubiginosa</i> (L.), « <i>Sweet briar</i> » des Anglais	0.50	» <i>chamæmespilus</i> (Crz.)	1.—
» <i>rugosa</i> (Thunb.)	1.—	» <i>nepalensis</i> (Prain.)	2.50
Et les var. Belle Poitevine, fl. pl., parviflora à 1 fr.		<i>Spartium junceum</i> , v. <i>Genista</i> .	
» <i>Webbiana</i> (Wall.)	1.—	<i>Spiræa betulifolia</i> , v. <i>betulifolia</i> (Maxim.)	2.50
V. en outre pl. grimpantes.		* » <i>bullata</i> (Maxim.)	2.50
<i>Rosmarinus officinalis</i>	0.50	* » <i>Bumalda</i> (Hort.)	1.—
» » à fl. blanches	2.50	* » <i>canescens</i> (Don.)	1.—
<i>Rubus deliciosus</i> (Torr.)	1.50	* » <i>decumbens</i> (Koch.)	1.—
» <i>discolor</i> (Weihe)	1.50	» <i>Douglasii</i> (Hook.)	1.—
» <i>hesperinus</i>	2.50	» <i>japonica</i> (L.)	1.—
* » <i>hybridus</i> , <i>Rose-framboise</i>	0.50	» <i>Lindleyana</i> (Wall.)	1.—
* » <i>laciniatus</i> , v. <i>minor</i>	1.50	* » <i>pumiliorum</i> (Hort.)	2.50
* » <i>nutans</i> (Wall.)	1.50	» <i>salicifolia</i> , v. <i>lanceolata</i>	2.50
» <i>odoratus</i> (L.), <i>Framboise à grandes fleurs</i>	0.50	» <i>sorbifolia</i> (L.)	1.—
» <i>spectabilis</i> (Nutt.)	1.50	» <i>ulmifolia</i> (Scop.)	1.—
V. en outre p.		<i>Staphylea Bumalda</i> (D. C.)	1.50
<i>Ruscus aculeatus</i> (L.), <i>Fragon</i> ; <i>buis ardent</i>	0.50	» <i>colchica</i> (Ster.)	1.50
		» <i>trifolia</i> (L.)	1.50
		<i>Styrax</i> , v. p. 115.	

	fr. c.		fr. c.
Symphoricarpos acutus (A. Gr.)	1.—	*Triosteum pinnatifidum (Maxim.)	2.50
» Heyeri (Hort.)	1.—	!Ulex europæus (L.), <i>Ajone</i>	1.—
» occidentalis (Hook.)	1.—	» » à fl. doubles	2.50
» racemosus (L.), <i>arbre aux perles</i>	1.—	Cette var., dont la fl. sent la noix de Coco, fleurit constam., hiver comme été.	
» rotundifolius (A. Gr.)	1.—	Vaccinium , v. p. 70.	
Syringa Emodi (Wall.), <i>Lilas de l'Himalaya</i>	1.50	Vella , v. p. 75.	
oblata (Forst.), <i>Lilas précoc</i>	1.50	Veronica , v. p. 116.	
Esp. très distincte, basse et fleurissant 15 jours avant les autres lilas.		Viburnum cassinoides (L.)	2 50
» var. « <i>Lilas varin</i> »	1.50	» Lantana (L.)	1.—
Tamarix indica (Willd.), <i>Tamarix des Indes</i>	1.—	*Opulus nanus	2 50
» plumosa (Hort.)	1.—	» Tinus , v. p. 116.	
!Taxus baccata (L.), <i>If</i>	1.—	Vitex , v. p. 116.	
!Trachelospermum jasminoides (Lam.)	2.50	Xanthoceras sorbifolia (Bunge)	2.50
		Zanthoxylum , v. p. 116.	
		Zelkova crenata (Spach.)	2.50

INSECTICIDE AMBROSO

Cet insecticide, que nous avons expérimenté au jardin alpin et qui a été vendu sous le nom d'insecticide universel, est d'un effet foudroyant sur les insectes qui s'attaquent aux végétaux. Il est utilisé en grand, en Italie, pour le traitement de la vigne et de plusieurs autres plantes de grande culture. Il n'est composé que de substances non corrosives et ne fait aucun tort aux plantes, même les plus délicates.

Il est inodore et stérilise promptement jusqu'aux œufs des insectes nuisibles.

Prix des boîtes de :

750 grammes **Fr. 1 75**

1 k. 500 grammes **3 —**

7 k. 500 **15 —**

Au Dépôt du Jardin Alpin,

FLORAIRE

— près Genève. —

La collection des ouvrages de M. H. CORREVON a obtenu le prix d'honneur offert par la Société d'Horticulture de Neuchâtel à l'Exposition nationale Suisse, en 1896 et plusieurs médailles d'or, de vermeil et d'argent dans les expositions françaises et italiennes.

En vente à „FLORAIRE“ :

ALBUM DES ORCHIDÉES

DE L'EUROPE CENTRALE ET SEPTENTRIONALE

C'est une collection de 60 planches coloriées et 60 pages de texte contenant la description des espèces représentées, des détails sur leur fécondation par les insectes, sur leur histoire, leur géographie botanique et leur culture dans nos jardins, par H. CORREVON.

Prix 20 fr. (port en plus).

ATLAS DE LA FLORE ALPINE

Edition française par H. CORREVON.

Edité par le Club Alpin allemand et autrichien. 500 planches coloriées, admirablement exécutées, en 5 volumes et un volume de texte. — **Prix : 75 francs.**

FLEURS ET MONTAGNES

Un volume de poésies par H. CORREVON, avec illustrations par M^{lle} Adèle CORREVON. Genève 1902 — **Prix fr. 2.50.**

Ce petit volume de vers dédiés aux amis des fleurs et des montagnes a eu un très grand succès et l'édition paraît devoir en être rapidement épuisée.

Les plantes des Alpes.

Genève 1884. Epuisé.

Les Fougères rustiques.

Ouvrage couronné par la Société d'Horticulture de Genève, la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault, le Jury de l'Exposition internationale de Paris 1890, la Société Régionale d'Horticulture de l'Ain, la Société d'Horticulture de Nancy, par des médailles d'or ou d'argent et les félicitations de plusieurs jurys. — **Prix 5 fr.** (45 gravures).

Les Orchidées rustiques.

Cet ouvrage a été couronné par plusieurs Jurys.
Ouvrage de 250 pages, illustré de 34 gravures. **Prix : 4 francs.**

Flore coloriée de poche,

A L'USAGE DU TOURISTE

dans les montagnes de la Suisse, de la Savoie, du Dauphiné et des Pyrénées.

Un volume de 160 pages de texte avec environ 188 figures coloriées, dans le texte même, représentant les plantes de montagnes les plus répandues. Ouvrage d'un format facile à mettre en poche, cartonnage souple avec coins arrondis. — **Prix : 6 fr. 50.**

Ouvrage très pratique qui a obtenu un grand succès dans le public alpiniste et touriste.

Les plantes alpines et de rocailles.

leur culture et leur acclimatation dans nos jardins.

Un volume relié toile, de 200 pages avec plusieurs illustrations. — Prix : 2 fr. 50.

Les Fougères de pleine terre, les Prêles, Lycopodes et Sélaginelles rustiques.

Un volume relié toile, de 140 pages avec illustrations. — Prix : 2 fr. 50.

Le Jardin de l'Herboriste.

Nouvelle édition avec index très complet.

110 gravures. — Propriétés et culture des simples et plantes officinales.

Prix : 3 fr. 50.

Les frais de ports sont à la charge du destinataire.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Plantes alpines, montagnardes et saxatiles.	1
Plantes vivaces	75
Plantes bulbeuses rustiques	98
Orchidées rustiques	106
Fougères rustiques	108
Plantes exotiques, méditerranéennes ou orientales, mi-rustiques ou rustiques dans l'Ouest et au Midi	111
Cactées rustiques	116
Plantes aquatiques et marécageuses.	117
Plantes grimpantes	120
Arbustes et arbres d'ornement rustiques sous le climat de Genève	123
Publications et volumes en vente au Jardin alpin	131

CONDITIONS DE VENTE

La vente se fait au comptant ou à trois mois. — Nos prix sont fixes pour les espèces choisies par l'acheteur mais nous faisons les rabais suivants sur les commandes importantes :

5 %	à partir de	50 francs
10 %	»	100 »
20 %	au-dessus	200 »
25 %	au delà	500 »

Nos clients peuvent nous régler par chèques ou mandats postaux internationaux.

EXPÉDITIONS

Une collection de 12 plantes alpines, à notre choix et coûtant 5 francs (50 cent. à 1 franc d'emballage), pèse environ 3 kilos.

Pour les colis postaux de 5 kilos (Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Danemark, France, Hollande, Italie, Luxembourg et Russie) nous pouvons emballer 25 plantes dans la caisse.

Les tarifs pour l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche étant peu élevés, nous envoyons par la voie des messageries les colis qui dépassent le poids du « colis postal » ; quand ce poids est trop élevé pour le transport postal nous choisissons la grande vitesse.

La livre sterling vaut 25 francs.

Le shelling 1 fr. 25 cent.

COLIS POSTAUX POUR L'ÉTRANGER :

		Fr. C.
De Genève en	Allemagne	5 kilos. Port : 1 —
»	Autriche-Hongrie	5 » » 1 —
»	Belgique	5 » » 1 50
»	Danemark	5 » » 1 50
»	Espagne	3 » » 1 50
»	France	5 » » 1 —
»	»	10 » » 1 50
»	Grande-Bretagne et Irlande	1 » » 1 85
»	»	3 » » 2 35
»	»	5 » » 3 30
»	»	10 » » 6 70
»	pour Londres	3 » » 2 20
»	»	5 » » 3 30
»	»	10 » » 4 70
»	»	15 » » 6 25
»	Hollande	5 » » 1 50
»	Italie	5 » » 1 25
»	Luxembourg	5 » » 1 25
»	Norvège et Suède	5 » » 2 25
»	Portugal	5 » » 2 25
»	Russie	5 » » 2 25
»	Serbie	5 » » 1 75

